

Temas de “Lógica informática” (2004–05)

José A. Alonso Jiménez




Grupo de Lógica Computacional
Dpto. de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
Universidad de Sevilla
Sevilla, 30 de Junio de 2005

Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento–NoComercial–CompartirIgual 2.5 Spain de Creative Commons.

Se permite:

- copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra
- hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:

-  **Reconocimiento.** Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor.
-  **No comercial.** No puede utilizar esta obra para fines comerciales.
-  **Compartir bajo la misma licencia.** Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.
 - Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.
 - alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor-

Esto es un resumen del texto legal (la licencia completa). Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/> o envíe una carta a Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.

Índice general

| | |
|--|-----|
| 1. Sintaxis y semántica de la lógica proposicional | 5 |
| 2. Deducción natural proposicional | 19 |
| 3. Formas normales | 37 |
| 4. Tableros semánticos | 47 |
| 5. Resolución proposicional | 55 |
| 6. Sintaxis y semántica de la lógica de primer orden | 65 |
| 7. Deducción natural en lógica de primer orden | 99 |
| 8. Formas normales. Cláusulas | 113 |
| 9. Resolución en lógica de primer orden | 125 |

Capítulo 1

Sintaxis y semántica de la lógica proposicional

Tema 1: Sintaxis y semántica de la lógica proposicional

José A. Alonso Jiménez
Andrés Cordon Franco

Grupo de Lógica Computacional
Dpto. de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Lógica

- **Objetivos** de la lógica:
 - La formalización del lenguaje natural.
 - Los métodos de razonamiento.
- **Sistemas lógicos**:
 - Lógica proposicional.
 - Lógica de primer orden.
 - Lógicas modales.
- **Aplicaciones** de la lógica en computación:
 - Programación lógica.
 - Verificación y síntesis automática de programas.
 - Representación del conocimiento y razonamiento.
 - Modelización y razonamiento sobre sistemas.

Argumentos y formalización

- Ejemplos de argumentos:

- Ejemplo 1: *Si el tren llega a las 7 y no hay taxis en la estación, entonces Juan llegará tarde a la reunión. Juan no ha llegado tarde a la reunión. El tren llegó a las 7. Por tanto, habían taxis en la estación.*
- Ejemplo 2: *Si hay corriente y la lámpara no está fundida, entonces está encendida. La lámpara no está encendida. Hay corriente. Por tanto, la lámpara está fundida.*

- Formalización:

| Símbolo | Ejemplo 1 | Ejemplo 2 |
|---------|---------------------------------|-----------------------------|
| p | “el tren llega a las 7” | “hay corriente” |
| q | “hay taxis en la estación” | “la lámpara está fundida” |
| r | “Juan llega tarde a la reunión” | “la lámpara está encendida” |

- Si p y no q , entonces r . No r . p . Por tanto, q .
- $p \wedge \neg q \rightarrow r, \neg r, p \models q$.

Sintaxis proposicional: Fórmulas proposicionales

- Alfabeto proposicional:

- variables proposicionales: p, q, r, p_0, p_1, \dots
- conectivas lógicas:
 - monaria: \neg (negación),
 - binarias: \wedge (conjunción), \vee (disyunción), \rightarrow (condicional), \leftrightarrow (bicondicional).
- símbolos auxiliares: “(” y “)”.

- Fórmulas proposicionales:


- Definición:
 - Las variables proposicionales son fórmulas.
 - Si F y G son fórmulas, entonces $\neg F$, $(F \wedge G)$, $(F \vee G)$, $(F \rightarrow G)$, $(F \leftrightarrow G)$ son fórmulas.
- Ejemplos:
 - Fórmulas: p , $(p \vee \neg q)$, $\neg(p \vee p)$, $((p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p))$
 - No fórmulas: (p) , $p \vee \neg q$, $(p \vee \wedge q)$

Sintaxis proposicional: Fórmulas proposicionales (BNF)

- **Notaciones:**
 - p, q, r, \dots representarán variables proposicionales.
 - F, G, H, \dots representarán fórmulas.
 - VP representa el conjunto de los variables proposicionales.
 - $PROP$ representa el conjunto de las fórmulas.
 - $*$ representa una conectiva binaria.
- **Forma de Backus Naur (BNF) de las fórmula proposicionales:**
 - $F ::= p \mid \neg G \mid (F \wedge G) \mid (F \vee G) \mid (F \rightarrow G) \mid (F \leftrightarrow G)$

Sintaxis proposicional: Árboles de análisis

- **Árboles de análisis (o de formación).**



Sintaxis proposicional: Omisión de paréntesis

- Criterios de reducción de paréntesis:

- Pueden eliminarse los paréntesis externos.

$F \wedge G$ es una abreviatura de $(F \wedge G)$.

- Precedencia de asociación de conectivas: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$.

$F \wedge G \rightarrow \neg F \vee G$ es una abreviatura de $((F \wedge G) \rightarrow (\neg F \vee G))$.

- Cuando una conectiva se usa repetidamente, se asocia por la derecha.

$F \vee G \vee H$ es una abreviatura de $(F \vee (G \vee H))$.

$F \wedge G \wedge H \rightarrow \neg F \vee G$ es una abreviatura de $((F \wedge (G \wedge H)) \rightarrow (\neg F \vee G))$.

Sintaxis proposicional: Subfórmulas

- Subfórmulas:

- Def: El conjunto de las subfórmulas de F se define recursivamente por:

$$\text{Subf}(F) = \begin{cases} \{F\}, & \text{si } F \text{ es una variable;} \\ \{F\} \cup \text{Subf}(G), & \text{si } F = \neg G; \\ \{F\} \cup \text{Subf}(G) \cup \text{Subf}(H), & \text{si } F = G * H \end{cases}$$

- Ejemplos:

1. $\text{Subf}(p) = \{p\}$

2. $\text{Subf}(q) = \{q\}$

3. $\text{Subf}(\neg q) = \{\neg q, q\}$

4. $\text{Subf}(\neg q \vee p) = \{\neg q \vee p, \neg q, q, p\}$

5. $\text{Subf}(p \rightarrow \neg q \vee p) = \{p \rightarrow \neg q \vee p, p, \neg q \vee p, \neg q, q\}$

Semántica proposicional: valores y funciones de verdad

- **Valores de verdad:** (\mathbb{B}):

- **1:** verdadero.
- **0:** falso.

- **Funciones de verdad:**

- $H_{\neg} : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$ t.q. $H_{\neg}(i) = \begin{cases} 1, & \text{si } i = 0; \\ 0, & \text{si } i = 1. \end{cases}$
- $H_{\wedge} : \{0, 1\}^2 \rightarrow \{0, 1\}$ t.q. $H_{\wedge}(i, j) = \begin{cases} 1, & \text{si } i = j = 1; \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$
- $H_{\vee} : \{0, 1\}^2 \rightarrow \{0, 1\}$ t.q. $H_{\vee}(i, j) = \begin{cases} 0, & \text{si } i = j = 0; \\ 1, & \text{en otro caso.} \end{cases}$
- $H_{\rightarrow} : \{0, 1\}^2 \rightarrow \{0, 1\}$ t.q. $H_{\rightarrow}(i, j) = \begin{cases} 0, & \text{si } i = 1, j = 0; \\ 1, & \text{en otro caso.} \end{cases}$
- $H_{\leftrightarrow} : \{0, 1\}^2 \rightarrow \{0, 1\}$ t.q. $H_{\leftrightarrow}(i, j) = \begin{cases} 1, & \text{si } i = j; \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$

Semántica proposicional: valoración de fórmulas

- **Funciones de verdad mediante tablas de verdad:**

| i | $\neg i$ | i | j | $i \wedge j$ | $i \vee j$ | $i \rightarrow j$ | $i \leftrightarrow j$ |
|-----|----------|-----|-----|--------------|------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

- **Valoración de verdad:**

- **Def.:** v es una **valoración de verdad** si es una aplicación de VP en \mathbb{B} .
- **Prop:** Para cada valoración de verdad v existe una única aplicación $\hat{v} : \text{PROP} \rightarrow \mathbb{B}$ tal que:

$$\hat{v}(F) = \begin{cases} v(F), & \text{si } F \text{ es una variable;} \\ H_{\neg}(\hat{v}(G)), & \text{si } F = \neg G; \\ H_{*}(\hat{v}(G), \hat{v}(H)), & \text{si } F = G * H \end{cases}$$

Se dice que $\hat{v}(F)$ es el **valor de verdad de F respecto de v** .

Semántica proposicional: valoración de fórmulas

- Ejemplo: Sea $F = (p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)$

– valor de F en una valoración v_1 tal que $v_1(p) = v_1(r) = 1, v_1(q) = 0$

$$\begin{array}{l} (p \vee q) \wedge (\neg q \vee r) \\ (1 \vee 0) \wedge (\neg 0 \vee 1) \\ 1 \quad \wedge (1 \vee 1) \\ 1 \quad \wedge \quad 1 \\ 1 \end{array}$$

– valor de F en una valoración v_2 tal que $v_2(r) = 1, v_2(p) = v_2(q) = 0$

$$\begin{array}{l} (p \vee q) \wedge (\neg q \vee r) \\ (0 \vee 0) \wedge (\neg 0 \vee 1) \\ 0 \quad \wedge (1 \vee 1) \\ 0 \quad \wedge \quad 1 \\ 0 \end{array}$$

- Prop.: Sea F una fórmula y v, v' dos valoraciones. Si $v(p) = v'(p)$ para todas las variables proposicionales de F , entonces $\hat{v}(F) = \hat{v}'(F)$.
- Notación: Se escribe $v(F)$ en lugar de $\hat{v}(F)$.

Semántica proposicional: modelos y satisfacibilidad

- Modelo de una fórmula:

• Def.: v es modelo de F si $v(F) = 1$.

• Notación: $v \models F$.

• Ejemplo (continuación del anterior):

- si $v_1(p) = v_1(r) = 1, v_1(q) = 0$, entonces $v_1 \models (p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)$
- si $v_2(r) = 1, v_2(p) = v_2(q) = 0$, entonces $v_2 \not\models (p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)$

- Fórmulas satisfacibles e insatisfacibles:

• Def.: F es satisfacible si F tiene algún modelo.

• Ejemplo: $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$ es satisfacible.

$$v(p) = v(q) = v(r) = 0$$

• Def.: F es insatisfacible si F no tiene ningún modelo.

• Ejemplo: $p \wedge \neg p$ es insatisfacible.

| p | $\neg p$ | $p \wedge \neg p$ |
|-----|----------|-------------------|
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |

Semántica proposicional: tautologías y contradicciones

- Tautologías y contradicciones:

- Def.: F es una tautología (o válida) si toda valoración es modelo de F . Se representa por $\models F$.

- Def.: F es una contradicción si ninguna valoración es modelo de F .

- Def.: F es contingente si no es tautología ni contradicción.

- Ejemplos:

1. $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$ es una tautología.

2. $(p \rightarrow q) \wedge \neg(p \rightarrow q)$ es una contradicción.

3. $p \rightarrow q$ es contingente.

| p | q | $p \rightarrow q$ | $q \rightarrow p$ | $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$ | $\neg(p \rightarrow q)$ | $(p \rightarrow q) \wedge \neg(p \rightarrow q)$ |
|-----|-----|-------------------|-------------------|--|-------------------------|--|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Semántica proposicional: Clasificaciones de fórmulas

- Clasificaciones de fórmulas:

| Todas las fórmulas | | |
|---|--|---|
| <i>Tautologías</i> | <i>Contingentes</i> | <i>Contradicciones</i> |
| Verdadera en todas las valoraciones (ej. $p \vee \neg p$) | Verdadera en algunas valoraciones y falsa en otras (ej. $p \rightarrow q$) | Falsa en todas las valoraciones (ej. $p \wedge \neg p$) |
| <i>Satisfacibles</i> | | <i>Insatisfacibles</i> |
| Todas las fórmulas | | |

Semántica proposicional: Satisfacibilidad y tautologicidad

- Los problemas SAT y TAUT:
 - Problema SAT: Dada F determinar si es satisfacible.
 - Problema TAUT: Dada F determinar si es una tautología.
 - Relaciones entre satisfacibilidad y tautologicidad:
 - F es tautología $\iff \neg F$ es insatisfacible.
 - F es tautología $\implies F$ es satisfacible.
 - F es satisfacible $\not\implies \neg F$ es insatisfacible.
- $p \rightarrow q$ es satisfacible.
 $v(p) = v(q) = 1$
- $\neg(p \rightarrow q)$ es satisfacible.
 $v(p) = 1, v(q) = 0$

Semántica proposicional: Algoritmos para SAT y TAUT

- Tablas de verdad para $\models (p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$:

| p | q | $(p \rightarrow q)$ | $(q \rightarrow p)$ | $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$ |
|-----|-----|---------------------|---------------------|--|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

| p | q | $(p \rightarrow q)$ | \vee | $(q \rightarrow p)$ |
|-----|-----|---------------------|--------|---------------------|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

- Método de Quine para $\models (p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$:

$(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$

| |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |

- Método de Quine para $\models (p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$:

$(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1* | | | | | | |

Semántica proposicional: Algoritmos para SAT y TAUT

- **Tablas de verdad** para $\not\equiv (p \leftrightarrow q) \vee (q \leftrightarrow p)$:

| p | q | $(p \leftrightarrow q)$ | $(q \leftrightarrow p)$ | $(p \leftrightarrow q) \vee (q \leftrightarrow p)$ |
|-----|-----|-------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

- **Método de Quine** para $\not\equiv (p \leftrightarrow q) \vee (q \leftrightarrow p)$:

$(p \leftrightarrow q) \vee (q \leftrightarrow p)$

0 0 1 0 1 0 0

1 0 0 0 0 0 1

Semántica proposicional: selección de tautologías

- **Selección de tautologías:**
 - 1. $F \rightarrow F$ (ley de identidad).
 - 2. $F \vee \neg F$ (ley del tercio excluso).
 - 3. $\neg(F \wedge \neg F)$ (principio de no contradicción).
 - 4. $(\neg F \rightarrow F) \rightarrow F$ (ley de Clavius).
 - 5. $\neg F \rightarrow (F \rightarrow G)$ (ley de Duns Scoto).
 - 6. $((F \rightarrow G) \rightarrow F) \rightarrow F$ (ley de Peirce).
 - 7. $(F \rightarrow G) \wedge F \rightarrow G$ (modus ponens).
 - 8. $(F \rightarrow G) \wedge \neg G \rightarrow \neg F$ (modus tollens).

Semántica proposicional: Modelo de conjuntos de fórmulas

• Notación:

- S, S_1, S_2, \dots representarán conjuntos de fórmulas.

• Modelo de un conjunto de fórmulas:

- Def.: v es modelo de S si para toda $F \in S$ se tiene que $v \models F$.

- Representación: $v \models S$.

- Ejemplo: Sea $S = \{(p \vee q) \wedge (\neg q \vee r), q \rightarrow r\}$

La valoración v_1 tal que $v_1(p) = 1, v_1(q) = 0, v_1(r) = 1$ es modelo de S ($v_1 \models S$).

$$\begin{array}{cccccccc} \{(p \vee q) \wedge (\neg q \vee r), & q \rightarrow r\} \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array}$$

La valoración v_2 tal que $v_2(p) = 0, v_2(q) = 1, v_2(r) = 0$ no es modelo de S ($v_2 \not\models S$).

$$\begin{array}{cccccccc} \{(p \vee q) \wedge (\neg q \vee r), & q \rightarrow r\} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}$$

Semántica proposicional: Consistencia

• Conjunto consistente de fórmulas:

- Def.: S es consistente si S tiene algún modelo.
- Def.: S es inconsistente si S no tiene ningún modelo.

• Ejemplos:

– $\{(p \vee q) \wedge (\neg q \vee r), p \rightarrow r\}$ es consistente (con modelos v_4, v_6, v_8)

– $\{(p \vee q) \wedge (\neg q \vee r), p \rightarrow r, \neg r\}$ es inconsistente

| | p | q | r | $(p \vee q)$ | $(\neg q \vee r)$ | $(p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)$ | $p \rightarrow r$ | $\neg r$ |
|-------|-----|-----|-----|--------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------|
| v_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| v_2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| v_3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| v_4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| v_5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| v_6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| v_7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| v_8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Semántica proposicional: Consecuencia lógica

- Def.: F es consecuencia de S si todos los modelos de S son modelos de F .
- Representación: $S \models F$.
- Ejemplo: $\{p \rightarrow q, q \rightarrow r\} \models p \rightarrow r$

| | p | q | r | $p \rightarrow q$ | $q \rightarrow r$ | $p \rightarrow r$ |
|-------|-----|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| v_1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| v_2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| v_3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| v_4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| v_5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| v_6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| v_7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| v_8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Ejemplo: $\{p\} \not\models p \wedge q$

| p | q | $p \wedge q$ |
|-----|-----|--------------|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |

Semántica: propiedades de la consecuencia

- Propiedades básicas de la relación de consecuencia:
 - Reflexividad: $S \models S$.
 - Monotonía: Si $S_1 \models F$ y $S_1 \subseteq S_2$, entonces $S_2 \models F$.
 - Transitividad: Si $S \models F$ y $\{F\} \models G$, entonces $S \models G$.
- Relación entre consecuencia, validez, satisfacibilidad y consistencia:
 - Las siguientes condiciones son equivalentes:
 1. $\{F_1, \dots, F_n\} \models G$.
 2. $\models F_1 \wedge \dots \wedge F_n \rightarrow G$.
 3. $\neg(F_1 \wedge \dots \wedge F_n \rightarrow G)$ es insatisfacible.
 4. $\{F_1, \dots, F_n, \neg G\}$ es inconsistente.

Semántica proposicional: argumentaciones

- Ejemplo de argumentación:

- Problema de los animales: Se sabe que
 1. Los animales con pelo que dan leche son mamíferos.
 2. Los mamíferos que tienen pezuñas o que rumian son ungulados.
 3. Los ungulados de cuello largo son jirafas.
 4. Los ungulados con rayas negras son cebras.

Se observa un animal que tiene pelos, pezuñas y rayas negras. Por consiguiente, se concluye que el animal es una cebra.

- Formalización:

$$\{ \text{tiene_pelos} \vee \text{da_leche} \rightarrow \text{es_mamífero},$$

$$\text{es_mamífero} \wedge (\text{tiene_pezuñas} \vee \text{rumia}) \rightarrow \text{es_ungulado},$$

$$\text{es_ungulado} \wedge \text{tiene_cuello_largo} \rightarrow \text{es_jirafa},$$

$$\text{es_ungulado} \wedge \text{tiene_rayas_negras} \rightarrow \text{es_cebra},$$

$$\text{tiene_pelos} \wedge \text{tiene_pezuñas} \wedge \text{tiene_rayas_negras} \}$$

$$\models \text{es_cebra}$$

Problemas lógicos

- El problema de los veraces y los mentirosos:

- Enunciado: En una isla hay dos tribus, la de los veraces (que siempre dicen la verdad) y la de los mentirosos (que siempre mienten). Un viajero se encuentra con tres isleños A, B y C y cada uno le dice una frase

1. A dice “B y C son veraces syss C es veraz”
2. B dice “Si A y C son veraces, entonces B y C son veraces y A es mentiroso”
3. C dice “B es mentiroso syss A o B es veraz”

Determinar a qué tribu pertenecen A, B y C.

- Simbolización: a : “A es veraz”, b : “B es veraz”, c : “C es veraz”

- Formalización:

$$F_1 = a \leftrightarrow (b \wedge c \leftrightarrow c), F_2 = b \leftrightarrow (a \wedge c \rightarrow b \wedge c \wedge \neg a) \text{ y } F_3 = c \leftrightarrow (\neg b \leftrightarrow a \vee b)$$

- Modelos de $\{F_1, F_2, F_3\}$:

Si v es modelo de $\{F_1, F_2, F_3\}$, entonces $v(a) = 1, v(b) = 1, v(c) = 0$

- Conclusión: A y B son veraces y C es mentiroso.

Bibliografía

- C. Badesa, I. Jané y R. Jansana *Elementos de lógica formal*. (Ariel, 2000)
Cap. 0 (Introducción), 6 (Sintaxis de la lógica proposicional), 7 (Semántica de la lógica proposicional), 9 (Consecuencia lógica) y 11 (Lógica proposicional y lenguaje natural).
- M. Ben-Ari, *Mathematical logic for computer science (2nd ed.)*. (Springer, 2001)
Cap. 1 (Introduction) y 2 (Propositional calculus: formulas, models, tableaux).
- M. Huth y M. Ryan *Logic in computer science: modelling and reasoning about systems*. (Cambridge University Press, 2000)
Cap. 1 (Propositional logic).
- E. Paniagua, J.L. Sánchez y F. Martín *Lógica computacional* (Thomson, 2003)
Cap. 1 (La sintaxis de la Lógica) y Cap. 2 (La semántica de la Lógica).

Capítulo 2

Deducción natural proposicional

Tema 2: Deducción natural proposicional

José A. Alonso Jiménez
Andrés Cordon Franco

Grupo de Lógica Computacional
Dpto. de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

DN: Reglas de la conjunción

- Reglas de la conjunción:

- Regla de introducción de la conjunción: $\frac{F \quad G}{F \wedge G} \wedge i$

- Reglas de eliminación de la conjunción: $\frac{F \wedge G}{F} \wedge e_1$ $\frac{F \wedge G}{G} \wedge e_2$

- Ejemplo: $p \wedge q, r \vdash q \wedge r$:

1 : $p \wedge q, r$ premisas

2 : q $\wedge e$ 1.1

3 : $q \wedge r$ $\wedge i$ 2,1.2

- Adecuación de las reglas de la conjunción:

* $\wedge i : \{F, G\} \models F \wedge G$

* $\wedge e_1 : F \wedge G \models F$

* $\wedge e_2 : F \wedge G \models G$

DN: Reglas de la doble negación

• Reglas de la doble negación

• Regla de eliminación de la doble negación: $\frac{\neg\neg F}{F} \neg\neg\text{e}$

• Regla de introducción de la doble negación: $\frac{F}{\neg\neg F} \neg\neg\text{i}$

• Ejemplo: $p, \neg\neg(q \wedge r) \vdash \neg\neg p \wedge r$:

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1 : $p, \neg\neg(q \wedge r)$ | premisas |
| 2 : $q \wedge r$ | $\neg\neg\text{e}$ 1.2 |
| 3 : r | $\wedge\text{e}$ 2 |
| 4 : $\neg\neg p$ | $\neg\neg\text{i}$ 1.1 |
| 5 : $\neg\neg p \wedge r$ | $\wedge\text{i}$ 4,3 |

• Adecuación de las reglas de la doble negación:

* $\neg\neg\text{e} : \{\neg\neg F\} \models F$

* $\neg\neg\text{i} : \{F\} \models \neg\neg F$

DN: Regla de eliminación del condicional

• Regla de eliminación del condicional:

• Regla de eliminación del condicional: $\frac{F \quad F \rightarrow G}{G} \rightarrow\text{e}$

• Ejemplo: $\neg p \wedge q, \neg p \wedge q \rightarrow r \vee \neg p \vdash r \vee \neg p$:

| | |
|--|-------------------------------|
| 1 : $\neg p \wedge q, \neg p \wedge q \rightarrow r \vee \neg p$ | premisas |
| 2 : $r \vee \neg p$ | $\rightarrow\text{e}$ 1.2,1.1 |

• Ejemplo: $p, p \rightarrow q, p \rightarrow (q \rightarrow r) \vdash r$:

| | |
|---|-------------------------------|
| 1 : $p, p \rightarrow q, p \rightarrow (q \rightarrow r)$ | premisas |
| 2 : $q \rightarrow r$ | $\rightarrow\text{e}$ 1.3,1.1 |
| 3 : q | $\rightarrow\text{e}$ 1.2,1.1 |
| 4 : r | $\rightarrow\text{e}$ 2,3 |

• Adecuación de la regla de eliminación del condicional: $\{F, F \rightarrow G\} \models G$

DN: Regla derivada de modus tollens (MT)

- Regla derivada de modus tollens (MT)

- Regla derivada de modus tollens (MT): $\frac{F \rightarrow G \quad \neg G}{\neg F} MT$

- Ejemplo: $p \rightarrow (q \rightarrow r), p, \neg r \vdash \neg q$:

1 : $p \rightarrow (q \rightarrow r)$, p , $\neg r$ premisas
 2 : $q \rightarrow r$ $\rightarrow e$ 1.1,1.2
 3 : $\neg q$ MT 1.3,2

- Ejemplo: $\neg p \rightarrow q, \neg q \vdash p$:

1 : $\neg p \rightarrow q$, $\neg q$ premisas
 2 : $\neg \neg p$ MT 1.2,1.1
 3 : p $\neg \neg e$ 2

- Ejemplo: $p \rightarrow \neg q, q \vdash \neg p$:

DN: Regla de introducción del condicional

- Regla de introducción del condicional

- Regla de introducción del condicional:

$$\frac{\boxed{\begin{array}{c} F \\ \vdots \\ G \end{array}}}{F \rightarrow G} \rightarrow i$$

- Ejemplo: $p \rightarrow q \vdash \neg q \rightarrow \neg p$:

1 : $p \rightarrow q$ premisa
 2 : $\neg q$ supuesto
 3 : $\neg p$ MT 2,1
 4 : $\neg q \rightarrow \neg p$ $\rightarrow i$ 2-3

- Adecuación de la regla de introducción del condicional:

Si $F \models G$, entonces $\models F \rightarrow G$.

DN: Regla de introducción del condicional

- Ejemplo: $\neg q \rightarrow \neg p \vdash p \rightarrow \neg \neg q$:

| | | |
|-----|-----------------------------|---------------------|
| 1 : | $\neg q \rightarrow \neg p$ | premisa |
| 2 : | p | supuesto |
| 3 : | $\neg \neg p$ | $\neg \neg$ i 2 |
| 4 : | $\neg \neg q$ | MT 3,1 |
| 5 : | $p \rightarrow \neg \neg q$ | \rightarrow i 2–4 |

- Ejemplo (de teorema): $\vdash p \rightarrow p$:

| | | |
|-----|-------------------|---------------------|
| 1 : | p | supuesto |
| 2 : | $p \rightarrow p$ | \rightarrow i 1–1 |

DN: Regla de introducción del condicional

- Ejemplo: $\vdash (q \rightarrow r) \rightarrow ((\neg q \rightarrow \neg p) \rightarrow (p \rightarrow r))$:

| | | |
|------|---|---------------------|
| 1 : | $q \rightarrow r$ | supuesto |
| 2 : | $\neg q \rightarrow \neg p$ | supuesto |
| 3 : | p | supuesto |
| 4 : | $\neg \neg p$ | $\neg \neg$ i 3 |
| 5 : | $\neg \neg q$ | MT 4,2 |
| 6 : | q | $\neg \neg$ e 5 |
| 7 : | r | \rightarrow e 1,6 |
| 8 : | $p \rightarrow r$ | \rightarrow i 3–7 |
| 9 : | $(\neg q \rightarrow \neg p) \rightarrow (p \rightarrow r)$ | \rightarrow i 2–8 |
| 10 : | $(q \rightarrow r) \rightarrow ((\neg q \rightarrow \neg p) \rightarrow (p \rightarrow r))$ | \rightarrow i 1–9 |

DN: Regla de introducción del condicional

- Ejemplo: $p \wedge q \rightarrow r \vdash p \rightarrow (q \rightarrow r)$:

| | | |
|-----|-----------------------------------|---------------------|
| 1 : | $p \wedge q \rightarrow r$ | premisa |
| 2 : | p | supuesto |
| 3 : | q | supuesto |
| 4 : | $p \wedge q$ | $\wedge i$ 2,3 |
| 5 : | r | $\rightarrow e$ 1,4 |
| 6 : | $q \rightarrow r$ | $\rightarrow i$ 3-5 |
| 7 : | $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ | $\rightarrow i$ 2-6 |

DN: Regla de introducción del condicional

- Ejemplo: $p \rightarrow (q \rightarrow r) \vdash (p \wedge q) \rightarrow r$:

| | | |
|-----|-----------------------------------|---------------------|
| 1 : | $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ | premisa |
| 2 : | $p \wedge q$ | supuesto |
| 3 : | p | $\wedge e1$ 2 |
| 4 : | q | $\wedge e2$ 2 |
| 5 : | $q \rightarrow r$ | $\rightarrow e$ 1,3 |
| 6 : | r | $\rightarrow e$ 5,4 |
| 7 : | $(p \wedge q) \rightarrow r$ | $\rightarrow i$ 2-6 |

DN: Regla de introducción del condicional

- Ejemplo: $p \rightarrow q \vdash p \wedge r \rightarrow q \wedge r$:

| | | |
|-----|-------------------------------------|---------------------|
| 1 : | $p \rightarrow q$ | premisa |
| 2 : | $p \wedge r$ | supuesto |
| 3 : | p | $\wedge e$ 2 |
| 4 : | r | $\wedge e$ 2 |
| 5 : | q | $\rightarrow e$ 1,3 |
| 6 : | $q \wedge r$ | $\wedge i$ 5,4 |
| 7 : | $p \wedge r \rightarrow q \wedge r$ | $\rightarrow i$ 2–6 |

DN: Reglas de la disyunción

- Reglas de la disyunción:

- Reglas de introducción de la disyunción: $\frac{F}{F \vee G} \vee i_1$ $\frac{G}{F \vee G} \vee i_2$

- Regla de eliminación de la disyunción:

$$\frac{F \vee G \quad \begin{array}{|c|} \hline F \\ \hline \vdots \\ \hline H \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline G \\ \hline \vdots \\ \hline H \\ \hline \end{array}}{H} \vee e$$

- Ejemplo: $p \vee q \vdash q \vee p$:

| | | |
|-----|------------|--------------------|
| 1 : | $p \vee q$ | premisa |
| 2 : | p | supuesto |
| 3 : | $q \vee p$ | $\vee i_2$ 2 |
| 4 : | q | supuesto |
| 5 : | $q \vee p$ | $\vee i_1$ 4 |
| 6 : | $q \vee p$ | $\vee e$ 1,2–3,4–5 |

DN: Reglas de la disyunción

- Ejemplo: $q \rightarrow r \vdash p \vee q \rightarrow p \vee r$:

| | | |
|-----|---------------------------------|---------------------|
| 1 : | $q \rightarrow r$ | premisa |
| 2 : | $p \vee q$ | supuesto |
| 3 : | p | supuesto |
| 4 : | $p \vee r$ | $\vee i1$ 3 |
| 5 : | q | supuesto |
| 6 : | r | $\rightarrow e$ 1,5 |
| 7 : | $p \vee r$ | $\vee i2$ 6 |
| 8 : | $p \vee r$ | $\vee e$ 2,3–4,5–7 |
| 9 : | $p \vee q \rightarrow p \vee r$ | $\rightarrow i$ 2–8 |

DN: Reglas de la disyunción

- Ejemplo: $(p \vee q) \vee r \vdash p \vee (q \vee r)$:

| | | |
|------|---------------------|---------------------|
| 1 : | $(p \vee q) \vee r$ | premisa |
| 2 : | $p \vee q$ | supuesto |
| 3 : | p | supuesto |
| 4 : | $p \vee (q \vee r)$ | $\vee i1$ 3 |
| 5 : | q | supuesto |
| 6 : | $q \vee r$ | $\vee i1$ 5 |
| 7 : | $p \vee (q \vee r)$ | \vee intro 6 |
| 8 : | $p \vee (q \vee r)$ | $\vee e$ 2,3–4,5–7 |
| 9 : | r | supuesto |
| 10 : | $q \vee r$ | $\vee i2$ 9 |
| 11 : | $p \vee (q \vee r)$ | \vee intro 10 |
| 12 : | $p \vee (q \vee r)$ | $\vee e$ 1,2–8,9–11 |

DN: Reglas de la disyunción

- Ejemplo (distributiva): $p \wedge (q \vee r) \vdash (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$:

| | | |
|------|----------------------------------|--------------------|
| 1 : | $p \wedge (q \vee r)$ | premisa |
| 2 : | p | $\wedge e1$ 1 |
| 3 : | $q \vee r$ | $\wedge e2$ 1 |
| 4 : | q | supuesto |
| 5 : | $p \wedge q$ | $\wedge i$ 2,4 |
| 6 : | $(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ | \vee intro 5 |
| 7 : | r | supuesto |
| 8 : | $p \wedge r$ | $\wedge i$ 2,7 |
| 9 : | $(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ | \vee intro 8 |
| 10 : | $(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ | $\vee e$ 3,4–6,7–9 |

DN: Regla de copia

- Ejemplo (usando la regla hyp): $\vdash p \rightarrow (q \rightarrow p)$:

| | | |
|-----|-----------------------------------|---------------------|
| 1 : | p | supuesto |
| 2 : | q | supuesto |
| 3 : | p | hyp 1 |
| 4 : | $q \rightarrow p$ | $\rightarrow i$ 2–3 |
| 5 : | $p \rightarrow (q \rightarrow p)$ | $\rightarrow i$ 1–4 |

DN: Reglas de la negación

- Extensiones de la lógica para usar falso:
 - Extensión de la sintaxis: \perp es una fórmula proposicional.
 - Extensión de la semántica: $v(\perp) = 0$ en cualquier valoración.
- Reglas de la negación:
 - Regla de eliminación de lo falso: $\frac{\perp}{F} \perp e$
 - Regla de eliminación de la negación: $\frac{F \quad \neg F}{\perp} \neg e$
 - Adecuación de las reglas de la negación:
 - * $\perp \models F$
 - * $\{F, \neg F\} \models \perp$

DN: Reglas de la negación

- Ejemplo $\neg p \vee q \vdash p \rightarrow q$:

| | | |
|-----|-------------------|---------------------|
| 1 : | $\neg p \vee q$ | premise |
| 2 : | p | supuesto |
| 3 : | $\neg p$ | supuesto |
| 4 : | \perp | $\neg e$ 2,3 |
| 5 : | q | $\perp e$ 4 |
| 6 : | q | supuesto |
| 7 : | q | $\vee e$ 1,3-5,6-6 |
| 8 : | $p \rightarrow q$ | $\rightarrow i$ 2-7 |

DN: Reglas de la negación

- Regla de introducción de la negación:

$$\frac{\begin{array}{c} F \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{\neg F} \neg i$$

- Adecuación: Si $F \models \perp$, entonces $\models \neg F$.
- Ejemplo: $p \rightarrow q, p \rightarrow \neg q \vdash \neg p$:

| | | |
|-----|---|-----------------------|
| 1 : | $p \rightarrow q, p \rightarrow \neg q$ | premisas |
| 2 : | p | supuesto |
| 3 : | $\neg q$ | $\rightarrow e$ 1,2,2 |
| 4 : | q | $\rightarrow e$ 1,1,2 |
| 5 : | \perp | $\neg e$ 4,3 |
| 6 : | $\neg p$ | $\neg i$ 2–5 |

DN: Reglas de la negación

- Ejemplo: $p \rightarrow \neg p \vdash \neg p$:

| | | |
|-----|------------------------|---------------------|
| 1 : | $p \rightarrow \neg p$ | premisa |
| 2 : | p | supuesto |
| 3 : | $\neg p$ | $\rightarrow e$ 1,2 |
| 4 : | \perp | $\neg e$ 2,3 |
| 5 : | $\neg p$ | $\neg i$ 2–4 |

DN: Reglas de la negación

- Ejemplo $p \wedge \neg q \rightarrow r, \neg r, p \vdash q$:

| | | |
|-----|---------------------------------|-----------------------|
| 1 : | $p \wedge \neg q \rightarrow r$ | premisas |
| 2 : | $\neg q$ | supuesto |
| 3 : | $p \wedge \neg q$ | $\wedge i$ 1,3,2 |
| 4 : | r | $\rightarrow e$ 1.1,3 |
| 5 : | \perp | $\neg e$ 4,1.2 |
| 6 : | $\neg \neg q$ | $\neg i$ 2-5 |
| 7 : | q | $\neg \neg e$ 6 |

- Ejemplo: $p \rightarrow (q \rightarrow r), p, \neg r \vdash \neg q$:

| | | |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 : | $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ | premisas |
| 2 : | $q \rightarrow r$ | $\rightarrow e$ 1.1,1.2 |
| 3 : | $\neg q$ | MT 1.3,2 |

DN: Reglas del bicondicional

- Regla de introducción del bicondicional: $\frac{F \rightarrow G \quad G \rightarrow F}{F \leftrightarrow G} \leftrightarrow i$

- Ejemplo: $p \wedge q \leftrightarrow q \wedge p$:

| | | |
|------|---|--------------------------|
| 1 : | $p \wedge q$ | supuesto |
| 2 : | p | $\wedge e1$ 1 |
| 3 : | q | $\wedge e2$ 1 |
| 4 : | $q \wedge p$ | $\wedge i$ 3,2 |
| 5 : | $p \wedge q \rightarrow q \wedge p$ | $\rightarrow i$ 1-4 |
| 6 : | $q \wedge p$ | supuesto |
| 7 : | q | $\wedge e1$ 6 |
| 8 : | p | $\wedge e2$ 6 |
| 9 : | $p \wedge q$ | $\wedge i$ 8,7 |
| 10 : | $q \wedge p \rightarrow p \wedge q$ | $\rightarrow i$ 6-9 |
| 11 : | $p \wedge q \leftrightarrow q \wedge p$ | $\leftrightarrow i$ 5,10 |

DN: Reglas del bicondicional

- Reglas de eliminación del bicondicional: $\frac{F \leftrightarrow G}{F \rightarrow G} \leftrightarrow e_1$ $\frac{F \leftrightarrow G}{G \rightarrow F} \leftrightarrow e_2$

- Ejemplo: $p \leftrightarrow q, p \vee q \vdash p \wedge q$:

| | | |
|------|---------------------------------|-------------------------|
| 1 : | $p \leftrightarrow q, p \vee q$ | premisas |
| 2 : | p | supuesto |
| 3 : | $p \rightarrow q$ | $\leftrightarrow e$ 1.1 |
| 4 : | q | $\rightarrow e$ 3,2 |
| 5 : | $p \wedge q$ | $\wedge i$ 2,4 |
| 6 : | q | supuesto |
| 7 : | $q \rightarrow p$ | $\leftrightarrow e$ 1.1 |
| 8 : | p | $\rightarrow e$ 7,6 |
| 9 : | $p \wedge q$ | $\wedge i$ 8,6 |
| 10 : | $p \wedge q$ | $\vee e$ 1.2,2–5,6–9 |

DN: Reglas derivadas: modus tollens

- Regla derivada de modus tollens (MT): $\frac{F \rightarrow G \quad \neg G}{\neg F} \text{MT}$

- Derivación:

| | | |
|-----|---------------------------|-----------------------|
| 1 : | $F \rightarrow G, \neg G$ | premisas |
| 2 : | F | supuesto |
| 3 : | G | $\rightarrow e$ 1.1,2 |
| 4 : | \perp | $\neg e$ 3,1,2 |
| 5 : | $\neg F$ | $\neg i$ 2–4 |

DN: Reglas derivadas: introducción de doble negación

- Regla de introducción de la doble negación: $\frac{F}{\neg\neg F} \neg\neg i$

- Derivación:

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 1 : | F | premisa |
| 2 : | $\neg F$ | supuesto |
| 3 : | \perp | $\neg e$ 1,2 |
| 4 : | $\neg\neg F$ | $\neg i$ 2-3 |

DN: Reglas derivadas: reducción al absurdo (RAA)

- Regla de reducción al absurdo (RAA):

$$\frac{\begin{array}{|c|} \hline \neg F \\ \vdots \\ \perp \\ \hline \end{array}}{F} \text{ RAA}$$

- Derivación:

| | | |
|-----|----------------------------|---------------------|
| 1 : | $\neg F \rightarrow \perp$ | premisa |
| 2 : | $\neg F$ | supuesto |
| 3 : | \perp | $\rightarrow e$ 1,2 |
| 4 : | $\neg\neg F$ | $\neg i$ 2-3 |
| 5 : | F | $\neg\neg e$ 4 |

DN: Reglas derivadas: ley del tercio excluido (LEM)

• Ley del tercio excluido (LEM): $\frac{}{F \vee \neg F} \text{LEM}$

• Derivación:

| | | |
|-----|---------------------------|----------------|
| 1 : | $\neg(F \vee \neg F)$ | supuesto |
| 2 : | F | supuesto |
| 3 : | $F \vee \neg F$ | $\vee i$ 2 |
| 4 : | \perp | $\neg e$ 3,1 |
| 5 : | $\neg F$ | $\neg i$ 2–4 |
| 6 : | $F \vee \neg F$ | \vee intro 5 |
| 7 : | \perp | $\neg e$ 6,1 |
| 8 : | $\neg\neg(F \vee \neg F)$ | $\neg i$ 1–7 |
| 9 : | $F \vee \neg F$ | $\neg\neg e$ 8 |

DN: Reglas derivadas: ley del tercio excluido (LEM)

• Ejemplo: $p \rightarrow q \vdash \neg p \vee q$:

| | | |
|-----|-------------------|---------------------|
| 1 : | $p \rightarrow q$ | premisa |
| 2 : | $p \vee \neg p$ | LEM |
| 3 : | p | supuesto |
| 4 : | q | $\rightarrow e$ 1,3 |
| 5 : | $\neg p \vee q$ | \vee intro 4 |
| 6 : | $\neg p$ | supuesto |
| 7 : | $\neg p \vee q$ | \vee intro 6 |
| 8 : | $\neg p \vee q$ | $\vee e$ 2,3–5,6–7 |

DN: Reglas de deducción natural

- Reglas de deducción natural:

| | Introducción | Eliminación |
|---|--|---|
| ∧ | $\frac{F \quad G}{F \wedge G} \wedge i$ | $\frac{F \wedge G}{F} \wedge e_1 \quad \frac{F \wedge G}{G} \wedge e_2$ |
| ∨ | $\frac{F}{F \vee G} \vee i_1 \quad \frac{G}{F \vee G} \vee i_2$ | $\frac{F \vee G \quad \begin{array}{ c } \hline F \\ \vdots \\ H \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{ c } \hline G \\ \vdots \\ H \\ \hline \end{array}}{H} \vee e$ |
| → | $\frac{\begin{array}{ c } \hline F \\ \vdots \\ G \\ \hline \end{array}}{F \rightarrow G} \rightarrow i$ | $\frac{F \quad F \rightarrow G}{G} \rightarrow e$ |

DN: Reglas de deducción natural

- Reglas de deducción natural:

| | Introducción | Eliminación |
|----|--|---|
| ¬ | $\frac{\begin{array}{ c } \hline F \\ \vdots \\ \perp \\ \hline \end{array}}{\neg F} \neg i$ | $\frac{F \quad \neg F}{\perp} \neg e$ |
| ⊥ | | $\frac{\perp}{F} \perp e$ |
| ¬¬ | | $\frac{\neg \neg F}{F} \neg \neg e$ |
| ↔ | $\frac{F \rightarrow G \quad G \rightarrow F}{F \leftrightarrow G} \leftrightarrow i$ | $\frac{F \leftrightarrow G}{F \rightarrow G} \leftrightarrow e_1 \quad \frac{F \leftrightarrow G}{G \rightarrow F} \leftrightarrow e_2$ |

- Adecuación y completitud del cálculo de deducción natural.

Bibliografía

- C. Badesa, I. Jané y R. Jansana *Elementos de lógica formal*. (Ariel, 2000) Cap. 16: Cálculo deductivo.
- R. Bornat *Using ItL Jape with X* (Department of Computer Science, QMW, 1998)
- J.A. Díez *Iniciación a la Lógica*, (Ariel, 2002) Cap. 4: Cálculo deductivo. Decidibilidad.
- M. Huth y M. Ryan *Logic in computer science: modelling and reasoning about systems*. (Cambridge University Press, 2000) Cap. 1: Propositional logic.
- M. Fitting *First-Order Logic and Automated Theorem Proving (2nd ed.)* (Springer, 1995) Cap. 4.2: Natural deduction.
- E. Paniagua, J.L. Sánchez y F. Martín *Lógica computacional* (Thomson, 2003) Cap. 3.6: El método de la deducción natural.

Capítulo 3

Formas normales

Tema 3: Formas normales

José A. Alonso Jiménez
Andrés Cordon Franco

Grupo de Lógica Computacional
Dpto. de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Equivalencia lógica

- Fórmulas equivalentes

- Def.: F y G son **equivalentes** si $v(F) = v(G)$ para toda valoración v .
- Representación: $F \equiv G$.
- Ejemplos de equivalencias notables:
 1. Idempotencia: $F \vee F \equiv F$; $F \wedge F \equiv F$.
 2. Conmutatividad: $F \vee G \equiv G \vee F$; $F \wedge G \equiv G \wedge F$.
 3. Asociatividad: $F \vee (G \vee H) \equiv (F \vee G) \vee H$; $F \wedge (G \wedge H) \equiv (F \wedge G) \wedge H$.
 4. Absorción: $F \wedge (F \vee G) \equiv F$; $F \vee (F \wedge G) \equiv F$.
 5. Distributividad: $F \wedge (G \vee H) \equiv (F \wedge G) \vee (F \wedge H)$;
 $F \vee (G \wedge H) \equiv (F \vee G) \wedge (F \vee H)$.
 6. Doble negación: $\neg\neg F \equiv F$.
 7. Leyes de De Morgan: $\neg(F \wedge G) \equiv \neg F \vee \neg G$; $\neg(F \vee G) \equiv \neg F \wedge \neg G$.
 8. Leyes de tautologías: Si F es una tautología, $F \wedge G \equiv G$; $F \vee G \equiv F$.
 9. Leyes de contradicciones: Si F es una contradicción $F \wedge G \equiv F$; $F \vee G \equiv G$.

Equivalencia lógica: propiedades

- Relación entre equivalencia y bicondicional:
 - $F \equiv G \text{ sys} \models F \leftrightarrow G$.
- Propiedades básicas de la equivalencia lógica:
 - Reflexiva: $F \equiv F$.
 - Simétrica: Si $F \equiv G$, entonces $G \equiv F$.
 - Transitiva: Si $F \equiv G$ y $G \equiv H$, entonces $F \equiv H$.
- Principio de sustitución de fórmulas equivalentes:
 - Prop.: Si en la fórmula F se sustituye una de sus subfórmulas G por una fórmula G' lógicamente equivalente a G , entonces la fórmula obtenida, F' , es lógicamente equivalente a F .
 - Ejemplo:

$$\begin{aligned} F &= \neg(p \wedge q) \rightarrow \neg(p \wedge \neg\neg r) \\ G &= \neg(p \wedge q) \\ G' &= \neg p \vee \neg q \\ F' &= (\neg p \vee \neg q) \rightarrow \neg(p \wedge \neg\neg r) \end{aligned}$$

Formas normales: Forma normal conjuntiva

- Átomos y literales:
 - Def.: Un **átomo** es un variable proposicional (p.e. p, q, \dots).
 - Def.: Un **literal** es un átomo o su negación (p.e. $p, \neg p, q, \neg q, \dots$).
 - Notación: L, L_1, L_2, \dots representarán literales.
- Forma normal conjuntiva:
 - Def.: Una fórmula está en **forma normal conjuntiva (FNC)** si es una conjunción de disyunciones de literales; es decir, es de la forma

$$(L_{1,1} \vee \dots \vee L_{1,n_1}) \wedge \dots \wedge (L_{m,1} \vee \dots \vee L_{m,n_m}).$$
 - Ejemplos: $(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)$ está en FNC.
 $(\neg p \vee q) \wedge (q \rightarrow p)$ no está en FNC.
 - Def.: Una fórmula G es una **forma normal conjuntiva (FNC)** de la fórmula F si G está en forma normal conjuntiva y es equivalente a F .
 - Ejemplo: Una FNC de $\neg(p \wedge (q \rightarrow r))$ es $(\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg r)$.

Formas normales: Cálculo de forma normal conjuntiva

- **Algoritmo de cálculo de forma normal conjuntiva:**

- **Algoritmo:** Aplicando a una fórmula F los siguientes pasos se obtiene una forma normal conjuntiva de F , $\text{FNC}(F)$:

1. Eliminar los bicondicionales usando la equivalencia

$$A \leftrightarrow B \equiv (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A) \quad (1)$$

2. Eliminar los condicionales usando la equivalencia

$$A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B \quad (2)$$

3. Interiorizar las negaciones usando las equivalencias

$$\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B \quad (3)$$

$$\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B \quad (4)$$

$$\neg\neg A \equiv A \quad (5)$$

4. Interiorizar las disyunciones usando las equivalencias

$$A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C) \quad (6)$$

$$(A \wedge B) \vee C \equiv (A \vee C) \wedge (B \vee C) \quad (7)$$

Formas normales: Cálculo de forma normal conjuntiva

- Ejemplo de cálculo de una FNC de $\neg(p \wedge (q \rightarrow r))$:

$$\begin{aligned} & \neg(p \wedge (q \rightarrow r)) \\ \equiv & \neg(p \wedge (\neg q \vee r)) && [\text{por (2)}] \\ \equiv & \neg p \vee \neg(\neg q \vee r) && [\text{por (3)}] \\ \equiv & \neg p \vee (\neg\neg q \wedge \neg r) && [\text{por (4)}] \\ \equiv & \neg p \vee (q \wedge \neg r) && [\text{por (5)}] \\ \equiv & (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg r) && [\text{por (6)}] \end{aligned}$$

- Ejemplo de cálculo de una FNC de $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$:

$$\begin{aligned} & (p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p) \\ \equiv & (\neg p \vee q) \vee (\neg q \vee p) && [\text{por (2)}] \\ \equiv & \neg p \vee q \vee \neg q \vee p \end{aligned}$$

Formas normales: Cálculo de forma normal conjuntiva

- Ejemplo de cálculo de una FNC de $(p \leftrightarrow q) \rightarrow r$:

$$\begin{aligned}
 & (p \leftrightarrow q) \rightarrow r \\
 \equiv & (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \rightarrow r && [\text{por (1)}] \\
 \equiv & \neg((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)) \vee r && [\text{por (2)}] \\
 \equiv & \neg((\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)) \vee r && [\text{por (2)}] \\
 \equiv & (\neg(\neg p \vee q) \vee \neg(\neg q \vee p)) \vee r && [\text{por (3)}] \\
 \equiv & ((\neg\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg\neg q \wedge \neg p)) \vee r && [\text{por (4)}] \\
 \equiv & ((p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p)) \vee r && [\text{por (5)}] \\
 \equiv & (((p \wedge \neg q) \vee q) \wedge ((p \wedge \neg q) \vee \neg p)) \vee r && [\text{por (6)}] \\
 \equiv & (((p \vee q) \wedge (\neg q \vee q)) \wedge ((p \vee \neg p) \wedge (\neg q \vee \neg p))) \vee r && [\text{por (7)}] \\
 \equiv & (((p \vee q) \wedge (\neg q \vee q)) \vee r) \wedge (((p \vee \neg p) \wedge (\neg q \vee \neg p)) \vee r) && [\text{por (7)}] \\
 \equiv & (((p \vee q) \vee r) \wedge ((\neg q \vee q) \vee r)) \wedge (((p \vee \neg p) \vee r) \wedge ((\neg q \vee \neg p) \vee r)) && [\text{por (7)}] \\
 \equiv & (p \vee q \vee r) \wedge (\neg q \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee \neg p \vee r) \\
 \equiv & (p \vee q \vee r) \wedge (\neg q \vee \neg p \vee r)
 \end{aligned}$$

Formas normales: Forma normal disyuntiva

- Forma normal disyuntiva:

- Def.: Una fórmula está en **forma normal disyuntiva (FND)** si es una disyunción de conjunciones de literales; es decir, es de la forma

$$(L_{1,1} \wedge \dots \wedge L_{1,n_1}) \vee \dots \vee (L_{m,1} \wedge \dots \wedge L_{m,n_m}).$$

- Ejemplos: $(\neg p \wedge q) \vee (\neg q \wedge p)$ está en FND.
 $(\neg p \wedge q) \vee (q \rightarrow p)$ no está en FND.
- Def.: Una fórmula G es una **forma normal disyuntiva (FND)** de la fórmula F si G está en forma normal disyuntiva y es equivalente a F .
- Ejemplo: Una FND de $\neg(p \wedge (q \rightarrow r))$ es $\neg p \vee (q \wedge \neg r)$.

Formas normales: Cálculo de forma normal disyuntiva

- **Algoritmo de cálculo de forma normal disyuntiva:**

- **Algoritmo:** Aplicando a una fórmula F los siguientes pasos se obtiene una forma normal disyuntiva de F , $\text{FND}(F)$:

1. Eliminar los bicondicionales usando la equivalencia

$$A \leftrightarrow B \equiv (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A) \quad (1)$$

2. Eliminar los condicionales usando la equivalencia

$$A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B \quad (2)$$

3. Interiorizar las negaciones usando las equivalencias

$$\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B \quad (3)$$

$$\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B \quad (4)$$

$$\neg\neg A \equiv A \quad (5)$$

4. Interiorizar las conjunciones usando las equivalencias

$$A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C) \quad (6)$$

$$(A \vee B) \wedge C \equiv (A \wedge C) \vee (B \wedge C) \quad (7)$$

Formas normales: Cálculo de forma normal disyuntiva

- Ejemplo de cálculo de una FND de $\neg(p \wedge (q \rightarrow r))$:

$$\begin{aligned} & \neg(p \wedge (q \rightarrow r)) \\ \equiv & \neg(p \wedge (\neg q \vee r)) \quad [\text{por (2)}] \\ \equiv & \neg p \vee \neg(\neg q \vee r) \quad [\text{por (3)}] \\ \equiv & \neg p \vee (\neg\neg q \wedge \neg r) \quad [\text{por (4)}] \\ \equiv & \neg p \vee (q \wedge \neg r) \quad [\text{por (5)}] \end{aligned}$$

- Ejemplo de cálculo de una FND de $\neg(\neg p \vee \neg q \rightarrow \neg(p \wedge q))$:

$$\begin{aligned} & \neg(\neg p \vee \neg q \rightarrow \neg(p \wedge q)) \\ \equiv & \neg(\neg(\neg p \vee \neg q) \vee \neg(p \wedge q)) \quad [\text{por (2)}] \\ \equiv & \neg\neg(\neg p \vee \neg q) \wedge \neg\neg(p \wedge q) \quad [\text{por (4)}] \\ \equiv & (\neg p \vee \neg q) \wedge (p \wedge q) \quad [\text{por (5)}] \\ \equiv & (\neg p \wedge (p \wedge q)) \vee (\neg q \wedge (p \wedge q)) \quad [\text{por (7)}] \\ \equiv & (\neg p \wedge p \wedge q) \vee (\neg q \wedge p \wedge q) \end{aligned}$$

Decisión de validez mediante FNC

- Literales complementarios:
 - El **complementario** de un literal L es $L^c = \begin{cases} \neg p & \text{si } L = p; \\ p & \text{si } L = \neg p. \end{cases}$
- Propiedades de reducción de tautologías:
 - $F_1 \wedge \dots \wedge F_n$ es una tautología syss F_1, \dots, F_n lo son.
 - $L_1 \vee \dots \vee L_n$ es una tautología syss $\{L_1, \dots, L_n\}$ contiene algún par de literales complementarios (i.e. existen i, j tales que $L_i = L_j^c$).
- Algoritmo de decisión de tautologías mediante FNC
 - Entrada: Una fórmula F .
 - Procedimiento:
 1. Calcular una FNC de F .
 2. Decidir si cada una de las conjunciones de la FNC tiene algún par de literales complementarios.

Decisión de validez mediante FNC

- Ejemplos de decisión de tautologías mediante FNC
 - $\neg(p \wedge (q \rightarrow r))$ no es tautología:

$$\text{FNC}(\neg(p \wedge (q \rightarrow r))) = (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg r)$$
 Contramodelos de $\neg(p \wedge (q \rightarrow r))$:
 - v_1 tal que $v_1(p) = 1$ y $v_1(q) = 0$
 - v_2 tal que $v_2(p) = 1$ y $v_2(r) = 1$
 - $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$ es tautología:

$$\text{FNC}((p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)) = \neg p \vee q \vee \neg q \vee p$$
 - $(p \leftrightarrow q) \rightarrow r$ no es tautología:

$$\text{FNC}((p \leftrightarrow q) \rightarrow r) = (p \vee q \vee r) \wedge (\neg q \vee \neg p \vee r)$$
 Contramodelos de $(p \leftrightarrow q) \rightarrow r$:
 - v_1 tal que $v_1(p) = 0, v_1(q) = 0$ y $v_1(r) = 0$
 - v_2 tal que $v_2(p) = 1, v_2(q) = 1$ y $v_2(r) = 0$

Decisión de satisfacibilidad mediante FND

- **Propiedades de reducción de satisfacibilidad:**
 - $F_1 \vee \dots \vee F_n$ es satisfacible syss alguna de las fórmulas F_1, \dots, F_n lo es.
 - $L_1 \wedge \dots \wedge L_n$ es satisfacible syss $\{L_1, \dots, L_n\}$ no contiene ningún par de literales complementarios.
- **Algoritmo de decisión de satisfacibilidad mediante FND:**
 - **Entrada:** Una fórmula F .
 - **Procedimiento:**
 1. Calcular una FND de F .
 2. Decidir si alguna de las disyunciones de la FND no tiene un par de literales complementarios.

Decisión de satisfacibilidad mediante FND

- **Ejemplos de decisión de satisfacibilidad mediante FND:**
 - $\neg(p \wedge (q \rightarrow r))$ es satisfacible:

$$\mathbf{FND}(\neg(p \wedge (q \rightarrow r))) = \neg p \vee (q \wedge \neg r)$$
 Modelos de $\neg(p \wedge (q \rightarrow r))$:
 - v_1 tal que $v_1(p) = 0$
 - v_2 tal que $v_2(q) = 1$ y $v_2(r) = 0$
 - $\neg(\neg p \vee \neg q \rightarrow \neg(p \wedge q))$ es insatisfacible:

$$\mathbf{FND}(\neg(\neg p \vee \neg q \rightarrow \neg(p \wedge q))) = (\neg p \wedge p \wedge q) \vee (\neg q \wedge p \wedge q)$$

Bibliografía

- C. Badesa, I. Jané y R. Jansana *Elementos de lógica formal*. (Ariel, 2000)
Cap. 8 (Equivalencia lógica) y 10 (Formas normales).
- M. Ben–Ari, *Mathematical logic for computer science (2nd ed.)*. (Springer, 2001)
Cap. 2 (Propositional calculus: formulas, models, tableaux).
- J.A. Díez *Iniciación a la Lógica*, (Ariel, 2002)
Cap. 3 (Semántica formal. Consecuencia lógica).
- M. Huth y M. Ryan *Logic in computer science: modelling and reasoning about systems*. (Cambridge University Press, 2000)
Cap. 1 (Propositional logic).
- E. Paniagua, J.L. Sánchez y F. Martín *Lógica computacional* (Thomson, 2003)
Cap. 4.4 (Formas normales).

Capítulo 4

Tableros semánticos

Tema 4: Tableros semánticos

José A. Alonso Jiménez
Andrés Cordón Franco

Grupo de Lógica Computacional
Dpto. de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Demostración por tableros semánticos

- Demostración de fórmula tautológica:

- Demostración:

- $\neg p \vee \neg q \rightarrow \neg(p \wedge q)$ es una tautología

- $\text{syss } \{\neg(\neg p \vee \neg q \rightarrow \neg(p \wedge q))\}$ es inconsistente

- $\text{syss } \{\neg p \vee \neg q, \neg\neg(p \wedge q)\}$ es inconsistente

- $\text{syss } \{\neg p \vee \neg q, p \wedge q\}$ es inconsistente


- $\text{syss } \{p, q, \neg p \vee \neg q\}$ es inconsistente

- $\text{syss } \{p, q, \neg p\}$ es inconsistente y

- $\{p, q, \neg q\}$ es inconsistente

Demostración por tableros semánticos

- Tablero semántico cerrado:



Refutación por tableros semánticos

- Refutación de fórmula no tautológica:

- Refutación:

$\neg p \vee \neg q \rightarrow \neg(p \wedge r)$ es una tautología
syss $\{\neg(\neg p \vee \neg q \rightarrow \neg(p \wedge r))\}$ es inconsistente
syss $\{\neg p \vee \neg q, \neg\neg(p \wedge r)\}$ es inconsistente
syss $\{\neg p \vee \neg q, p \wedge r\}$ es inconsistente
syss $\{p, r, \neg p \vee \neg q\}$ es inconsistente
syss $\{p, r, \neg p\}$ es inconsistente y
 $\{p, r, \neg q\}$ es inconsistente

- Contramodelos de $\neg p \vee \neg q \rightarrow \neg(p \wedge r)$:


Las valoraciones v tales que $v(p) = 1$, $v(q) = 0$ y $v(r) = 1$.

- Una forma normal disyuntiva de $\neg(\neg p \vee \neg q \rightarrow \neg(p \wedge r))$:

$p \wedge r \wedge \neg q$

Refutación por tableros semánticos

- Tablero semántico:



Notación uniforme: Literales y dobles negaciones

- Literales
 - Un **literal** es un átomo o la negación de un átomo (p.e. $p, \neg p, q, \neg q, \dots$).
- Dobles negaciones
 - F es una **doble negación** si es de la forma $\neg\neg G$.
 - Ley de doble negación: Si F es $\neg\neg G$, entonces $F \equiv G$.

Notación uniforme: fórmulas alfa y beta

• Fórmulas alfa

- Las **fórmulas alfa**, junto con sus componentes, son

| F | F_1 | F_2 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| $A_1 \wedge A_2$ | A_1 | A_2 |
| $\neg(A_1 \rightarrow A_2)$ | A_1 | $\neg A_2$ |
| $\neg(A_1 \vee A_2)$ | $\neg A_1$ | $\neg A_2$ |
| $A_1 \leftrightarrow A_2$ | $A_1 \rightarrow A_2$ | $A_2 \rightarrow A_1$ |

- Si F es una fórmula alfa y sus componentes son F_1 y F_2 , entonces $F \equiv F_1 \wedge F_2$.

• Fórmulas beta

- Las **fórmulas beta**, junto con sus componentes, son

| F | F_1 | F_2 |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| $B_1 \vee B_2$ | B_1 | B_2 |
| $B_1 \rightarrow B_2$ | $\neg B_1$ | B_2 |
| $\neg(B_1 \wedge B_2)$ | $\neg B_1$ | $\neg B_2$ |
| $\neg(B_1 \leftrightarrow B_2)$ | $\neg(B_1 \rightarrow B_2)$ | $\neg(B_2 \rightarrow B_1)$ |

- Si F es una fórmula beta y sus componentes son F_1 y F_2 , entonces $F \equiv F_1 \vee F_2$.

Completación de tableros

• Procedimiento de completación de tableros:

Un **tablero** de un conjunto de fórmulas S es un árbol construido mediante las reglas:

- * El árbol cuyo único nodo tiene como etiqueta S es un tablero de S .
- * Sea \mathcal{T} un tablero de S y S_1 la etiqueta de una hoja de \mathcal{T} .
 1. Si S_1 es **cerrado** (es decir, es un conjunto de literales que contiene una fórmula y su negación), entonces el árbol obtenido añadiendo como hijo de S_1 el nodo etiquetado con cerrado es un tablero de S .
 2. Si S_1 es **abierto** (es decir, es un conjunto de literales que no contiene una fórmula y su negación), entonces el árbol obtenido añadiendo como hijo de S_1 el nodo etiquetado con abierto es un tablero de S .
 3. Si S_1 contiene una **doble negación** $\neg\neg F$, entonces el árbol obtenido añadiendo como hijo de S_1 el nodo etiquetado con $(S_1 \setminus \{\neg\neg F\}) \cup \{F\}$ es un tablero de S .
 4. Si S_1 contiene una **fórmula alfa** F de componentes F_1 y F_2 , entonces el árbol obtenido añadiendo como hijo de S_1 el nodo etiquetado con $(S_1 \setminus \{F\}) \cup \{F_1, F_2\}$ es un tablero de S .
 5. Si S_1 contiene una **fórmula beta** F de componentes F_1 y F_2 , entonces el árbol obtenido añadiendo como hijos de S_1 los nodos etiquetados con $(S_1 \setminus \{F\}) \cup \{F_1\}$ y $(S_1 \setminus \{F\}) \cup \{F_2\}$ es un tablero de S .

Teorema por tableros

- Def.: Un **tablero completo** de S es un tablero de S al que no se le puede aplicar ninguna de las reglas de expansión; es decir, todas sus hojas son abiertas o cerradas.
- Def.: Un tablero es **cerrado** si todas sus hojas están etiquetadas con cerrado.
- Def.: Una fórmula F es un **teorema** (mediante tableros semánticos) si tiene una prueba mediante tableros; es decir, si $\{\neg F\}$ tiene un tablero completo cerrado. Se representa por $\vdash_{Tab} F$.
- Ejemplos:

$$\vdash_{Tab} \neg p \vee \neg q \rightarrow \neg(p \wedge q)$$


$$\not\vdash_{Tab} \neg p \vee \neg q \rightarrow \neg(p \wedge r)$$
- Teor.: El cálculo de tableros semánticos es adecuado y completo; es decir,

$$\text{Adecuado: } \vdash_{Tab} F \implies \models F$$

$$\text{Completo: } \models F \implies \vdash_{Tab} F$$
- Tableros y formas normales disyuntivas: Si $\{L_{1,1}, \dots, L_{1,n_1}\}, \dots, \{L_{m,1}, \dots, L_{m,n_m}\}$ son los nodos abiertos del tablero completo de F , entonces una forma normal disyuntiva de F es $(L_{1,1} \wedge \dots \wedge L_{1,n_1}) \vee \dots \vee (L_{m,1} \wedge \dots \wedge L_{m,n_m})$.

Deducción por tableros


- Def.: La fórmula F es **deducible** (mediante tableros semánticos) a partir del conjunto de fórmulas S si existe una prueba mediante tableros de F a partir de S ; es decir, existe un tablero completo cerrado de $S \cup \{\neg F\}$. Se representa por $S \vdash_{Tab} F$.
- Ejemplo: $\{p \rightarrow q, q \rightarrow r\} \vdash_{Tab} p \rightarrow r$



- Teor.: $S \vdash_{Tab} F$ syss $S \models F$.

Deducción por tableros

- Ejemplo: $\{p \vee q\} \not\vdash_{Tab} p \wedge q$



- Contramodelos de $\{p \vee q\} \not\vdash_{Tab} p \wedge q$
 - las valoraciones v_1 tales que $v_1(p) = 1$ y $v_1(q) = 0$
 - las valoraciones v_2 tales que $v_2(p) = 0$ y $v_2(q) = 1$

Bibliografía

- Ben–Ari, M. *Mathematical Logic for Computer Science (2nd ed.)* (Springer, 2001)
 - Cap. 2: Propositional calculus: formulas, models, tableaux
- Fitting, M. *First-Order Logic and Automated Theorem Proving (2nd ed.)* (Springer, 1995)
 - Cap. 3: Semantic tableaux and resolution
- Hortalá, M.T.; Leach, J. y Rogríguez, M. *Matemática discreta y lógica matemática* (Ed. Complutense, 1998)
 - Cap. 7.9: Tableaux semánticos par la lógica de proposiciones
- Nerode, A. y Shore, R.A. *Logic for Applications* (Springer, 1997)
 - Cap. 1.4: Tableau proofs in propositional calculus
- E. Paniagua, J.L. Sánchez y F. Martín *Lógica computacional* (Thomson, 2003)
 - Cap. 4.3: Métodos de las tablas semánticas

Capítulo 5

Resolución proposicional

Tema 5: Resolución proposicional

José A. Alonso Jiménez
Andrés Cordon Franco

Grupo de Lógica Computacional
Dpto. de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Lógica clausal: sintaxis

- **Sintaxis de la lógica clausal**
 - Un **átomo** es una variable proposicional.
Variables sobre átomos: $p, q, r, \dots, p_1, p_2, \dots$
 - Un **literal** es un átomo (p) o la negación de un átomo ($\neg p$).
Variables sobre literales: L, L_1, L_2, \dots
 - Una **cláusula** es un conjunto finito de literales.
Variables sobre cláusulas: C, C_1, C_2, \dots
 - La **cláusula vacía** es el conjunto vacío de literales.
La cláusula vacía se representa por \square .
 - **Conjuntos finitos de cláusulas**.
Variables sobre conjuntos finitos de cláusulas: S, S_1, S_2, \dots

Lógica clausal: semántica

- Semántica de la lógica clausal

- Def.: Una **valoración de verdad** es una aplicación $v : \mathbf{VP} \rightarrow \mathbb{B}$.
- Def.: El **valor de un literal positivo** p en una valoración v es $v(p)$.
- Def.: El **valor de un literal negativo** $\neg p$ en una valoración v es

$$v(\neg p) = \begin{cases} 1, & \text{si } v(p) = 0; \\ 0, & \text{si } v(p) = 1. \end{cases}$$

- Def.: El **valor de una cláusula** C en una valoración v es

$$v(C) = \begin{cases} 1, & \text{si existe un } L \in C \text{ tal que } v(L) = 1; \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

- Def.: El **valor de un conjunto de cláusulas** S en una valoración v es

$$v(S) = \begin{cases} 1, & \text{si para toda } C \in S, v(C) = 1 \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

- Prop.: En cualquier valoración v , $v(\square) = 0$.

Cláusulas y fórmulas

- Equivalencias entre cláusulas y fórmulas

- Def.: Una cláusula C y una fórmula F son **equivalentes** si $v(C) = v(F)$ para cualquier valoración v .
- Def.: Un conjunto de cláusulas S y una fórmula F son **equivalentes** si $v(S) = v(F)$ para cualquier valoración v .
- Def.: Un conjunto de cláusulas S y un conjunto de fórmulas $\{F_1, \dots, F_n\}$ son **equivalentes** si, para cualquier valoración v , $v(S) = 1$ si y sólo si v es un modelo de $\{F_1, \dots, F_n\}$.

- De cláusulas a fórmulas

- Prop.: La cláusula $\{L_1, L_2, \dots, L_n\}$ es equivalente a la fórmula $L_1 \vee L_2 \vee \dots \vee L_n$.
- Prop.: El conjunto de cláusulas $\{\{L_{1,1}, \dots, L_{1,n_1}\}, \dots, \{L_{m,1}, \dots, L_{m,n_m}\}\}$ es equivalente a la fórmula $(L_{1,1} \vee \dots \vee L_{1,n_1}) \wedge \dots \wedge (L_{m,1} \vee \dots \vee L_{m,n_m})$.

Cláusulas y fórmulas

- De fórmulas a cláusulas (forma clausal)
 - Def.: Una **forma clausal** de una fórmula F es un conjunto de cláusulas equivalente a F .
 - Prop.: Si $(L_{1,1} \vee \dots \vee L_{1,n_1}) \wedge \dots \wedge (L_{m,1} \vee \dots \vee L_{m,n_m})$ es una forma normal conjuntiva de la fórmula F . Entonces, una forma clausal de F es $\{\{L_{1,1}, \dots, L_{1,n_1}\}, \dots, \{L_{m,1}, \dots, L_{m,n_m}\}\}$.
 - Ejemplos:
 - * Una forma clausal de $\neg(p \wedge (q \rightarrow r))$ es $\{\{\neg p, q\}, \{\neg p, \neg r\}\}$.
 - * Una forma clausal de $p \rightarrow q$ es $\{\{\neg p, q\}\}$.
 - * La cláusula $\{\{\neg p, q\}, \{r\}\}$ es una forma clausal de las fórmulas $(p \rightarrow q) \wedge r$ y $\neg \neg r \wedge (\neg q \rightarrow \neg p)$.
 - Def.: Una **forma clausal** de un conjunto de fórmulas S es un conjunto de cláusulas equivalente a S .
 - Prop.: Si S_1, \dots, S_n son formas clausales de F_1, \dots, F_n , entonces $S_1 \cup \dots \cup S_n$ es una forma clausal de $\{F_1, \dots, F_n\}$.

Modelos, consistencia y consecuencia

- Modelos, consistencia y consecuencia
 - Def.: Una valoración v es **modelo** de un conjunto de cláusulas S si $v(S) = 1$.
 - Ej.: La valoración v tal que $v(p) = v(q) = 1$ es un modelo de $\{\{\neg p, q\}, \{p, \neg q\}\}$.
 - Def.: Un conjunto de cláusulas es **consistente** si tiene modelos e **inconsistente**, en caso contrario.
 - Ejemplos:
 - * $\{\{\neg p, q\}, \{p, \neg q\}\}$ es consistente.
 - * $\{\{\neg p, q\}, \{p, \neg q\}, \{p, q\}, \{\neg p, \neg q\}\}$ es inconsistente.
 - Prop.: Si $\square \in S$, entonces S es inconsistente.
 - Def.: $S \models C$ si para todo modelo v de S , $v(C) = 1$.

Reducción de consecuencia a inconsistencia de cláusulas

- Reducción de consecuencia a inconsistencia de cláusulas:
 - Prop: Sean S_1, \dots, S_n formas clausales de las fórmulas F_1, \dots, F_n .
 - * $\{F_1, \dots, F_n\}$ es consistente syss $S_1 \cup \dots \cup S_n$ es consistente.
 - * Si S es una forma clausal de $\neg G$, entonces son equivalentes
 1. $\{F_1, \dots, F_n\} \models G$.
 2. $\{F_1, \dots, F_n, \neg G\}$ es inconsistente.
 3. $S_1 \cup \dots \cup S_n \cup S$ es inconsistente.
 - Ejemplo: $\{p \rightarrow q, q \rightarrow r\} \models p \rightarrow r$ syss $\{\{\neg p, q\}, \{\neg q, r\}, \{p\}, \{\neg r\}\}$ es inconsistente.

Regla de resolución

- Reglas de inferencia:
 - Reglas habituales:

| | | |
|-----------------|--|--|
| Modus Ponens: | $\frac{p \rightarrow q, \quad p}{q}$ | $\frac{\{\neg p, q\}, \quad \{p\}}{\{q\}}$ |
| Modus Tollens: | $\frac{p \rightarrow q, \quad \neg q}{\neg p}$ | $\frac{\{\neg p, q\}, \quad \{\neg q\}}{\{\neg p\}}$ |
| Encadenamiento: | $\frac{p \rightarrow q, \quad q \rightarrow r}{p \rightarrow r}$ | $\frac{\{\neg p, q\}, \quad \{\neg q, r\}}{\{\neg p, r\}}$ |
 - Regla de resolución proposicional:

$$\frac{\{p_1, \dots, r, \dots, p_m\}, \quad \{q_1, \dots, \neg r, \dots, q_n\}}{\{p_1, \dots, p_m, q_1, \dots, q_n\}}$$

Regla de resolución

- **Resolventes**

- Def.: Sean C_1 una cláusula, L un literal de C_1 y C_2 una cláusula que contiene el complementario de L . La **resolvente de C_1 y C_2 respecto de L** es

$$\text{Res}_L(C_1, C_2) = (C_1 \setminus \{L\}) \cup (C_2 \setminus \{L^c\})$$

- Ejemplos: $\text{Res}_q(\{p, q\}, \{\neg q, r\}) = \{p, r\}$
 $\text{Res}_q(\{q, \neg p\}, \{p, \neg q\}) = \{p, \neg p\}$
 $\text{Res}_p(\{q, \neg p\}, \{p, \neg q\}) = \{q, \neg q\}$
 $\text{Res}_p(\{q, \neg p\}, \{q, p\}) = \{q\}$
 $\text{Res}_p(\{p\}, \{\neg p\}) = \square$

- **Resolventes de dos cláusulas:**

- Def.: $\text{Res}(C_1, C_2)$ es el conjunto de las resolventes entre C_1 y C_2

- Ejemplos: $\text{Res}(\{\neg p, q\}, \{p, \neg q\}) = \{\{p, \neg p\}, \{q, \neg q\}\}$
 $\text{Res}(\{\neg p, q\}, \{p, q\}) = \{\{q\}\}$
 $\text{Res}(\{\neg p, q\}, \{q, r\}) = \emptyset$

- Nota: $\square \notin \text{Res}(\{p, q\}, \{\neg p, \neg q\})$

Demostraciones por resolución

- **Ejemplo de refutación por resolución:**

- Refutación de $\{\{p, q\}, \{\neg p, q\}, \{p, \neg q\}, \{\neg p, \neg q\}\}$:

- | | | |
|---|----------------------|---------------------|
| 1 | $\{p, q\}$ | Hipótesis |
| 2 | $\{\neg p, q\}$ | Hipótesis |
| 3 | $\{p, \neg q\}$ | Hipótesis |
| 4 | $\{\neg p, \neg q\}$ | Hipótesis |
| 5 | $\{q\}$ | Resolvente de 1 y 2 |
| 6 | $\{\neg q\}$ | Resolvente de 3 y 4 |
| 7 | \square | Resolvente de 5 y 6 |

Demostraciones por resolución

- **Definiciones**

- Sea S un conjunto de cláusulas.
- La sucesión (C_1, \dots, C_n) es una **demostración por resolución** de la cláusula C a partir de S si $C = C_n$ y para todo $i \in \{1, \dots, n\}$ se verifica una de las siguientes condiciones:
 - * $C_i \in S$;
 - * existen $j, k < i$ tales que C_i es una resolvente de C_j y C_k
- La cláusula C es **demostrable por resolución** a partir de S si existe una demostración por resolución de C a partir de S .
- Una **refutación por resolución** de S es una demostración por resolución de la cláusula vacía a partir de S .
- Se dice que S es **refutable por resolución** si existe una refutación por resolución a partir de S .

Demostraciones por resolución

- **Demostraciones por resolución**

- Def.: Sean S_1, \dots, S_n formas clausales de las fórmulas F_1, \dots, F_n y S una forma clausal de $\neg F$
Una **demostración por resolución** de F a partir de $\{F_1, \dots, F_n\}$ es una refutación por resolución de $S_1 \cup \dots \cup S_n \cup S$.
- Def.: La fórmula F es **demostrable por resolución** a partir de $\{F_1, \dots, F_n\}$ si existe una demostración por resolución de F a partir de $\{F_1, \dots, F_n\}$.
Se representa por $\{F_1, \dots, F_n\} \vdash_{Res} F$.
- Ejemplo: Demostración por resolución de $p \wedge q$ a partir de $\{p \vee q, p \leftrightarrow q\}$

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| 1 | { p, q } | Hipótesis |
| 2 | { $\neg p, q$ } | Hipótesis |
| 3 | { $p, \neg q$ } | Hipótesis |
| 4 | { $\neg p, \neg q$ } | Hipótesis |
| 5 | { q } | Resolvente de 1 y 2 |
| 6 | { $\neg q$ } | Resolvente de 3 y 4 |
| 7 | □ | Resolvente de 5 y 6 |

Adecuación y completitud de la resolución

- **Propiedades:**

- Si C es una resolvente de C_1 y C_2 , entonces $\{C_1, C_2\} \models C$.
- Si $\square \in S$, entonces S es inconsistente.
- Si el conjunto de cláusulas S es refutable, entonces S es inconsistente.
- Teor.: El cálculo de resolución es adecuado y completo; es decir,

$$\begin{array}{ll} \text{Adecuado:} & S \vdash_{Res} F \implies S \models F \\ \text{Completo:} & S \models F \implies S \vdash_{Res} F \end{array}$$

Argumentación y resolución

- **Problema de los animales:** Se sabe que
 1. Los animales con pelo y los que dan leche son mamíferos.
 2. Los mamíferos que tienen pezuñas o que rumian son ungulados.
 3. Los ungulados de cuello largo son jirafas.
 4. Los ungulados con rayas negras son cebras.

Se observa un animal que tiene pelos, pezuñas y rayas negras. Por consiguiente, se concluye que el animal es una cebra.

- **Formalización:**

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{tiene_pelos} \vee \text{da_leche} \rightarrow \text{es_mamífero}, \\ \text{es_mamífero} \wedge (\text{tiene_pezuñas} \vee \text{rumia}) \rightarrow \text{es_ungulado}, \\ \text{es_ungulado} \wedge \text{tiene_cuello_largo} \rightarrow \text{es_jirafa}, \\ \text{es_ungulado} \wedge \text{tiene_rayas_negras} \rightarrow \text{es_cebra}, \\ \text{tiene_pelos} \wedge \text{tiene_pezuñas} \wedge \text{tiene_rayas_negras} \end{array} \right\} \vdash_{Res} \text{es_cebra}$$

Argumentación y resolución

- Resolución:

| | | |
|----|---|-----------------------|
| 1 | { \neg tiene_pelos, es_mamífero} | Hipótesis |
| 2 | { \neg da_leche, es_mamífero} | Hipótesis |
| 3 | { \neg es_mamífero, \neg tiene_pezuñas, es_ungulado} | Hipótesis |
| 4 | { \neg es_mamífero, \neg rumia, es_ungulado} | Hipótesis |
| 5 | { \neg es_ungulado, \neg tiene_cuello_largo, es_jirafa} | Hipótesis |
| 6 | { \neg es_ungulado, \neg tiene_rayas_negras, es_cebra} | Hipótesis |
| 7 | {tiene_pelos} | Hipótesis |
| 8 | {tiene_pezuñas} | Hipótesis |
| 9 | {tiene_rayas_negras} | Hipótesis |
| 10 | { \neg es_cebra} | Hipótesis |
| 11 | {es_mamifero} | Resolvente de 1 y 7 |
| 12 | { \neg tiene_pezuñas, es_ungulado} | Resolvente de 11 y 3 |
| 13 | {es_ungulado} | Resolvente de 12 y 8 |
| 14 | { \neg tiene_rayas_negras, es_cebra} | Resolvente de 13 y 6 |
| 15 | {es_cebra} | Resolvente de 14 y 9 |
| 16 | □ | Resolvente de 15 y 10 |

Bibliografía

1. M. Ben–Ari, *Mathematical logic for computer science (2nd ed.)*. (Springer, 2001).
Cap. 4: Propositional calculus: resolution and BDDs.
2. C.–L. Chang y R.C.–T. Lee *Symbolic Logic and Mechanical Theorem Proving* (Academic Press, 1973).
Cap. 5.2: The resolution principle for the propositional logic.
3. N.J. Nilsson *Inteligencia artificial (Una nueva síntesis)* (McGraw–Hill, 2001).
Cap. 14: La resolución en el cálculo proposicional.
4. E. Paniagua, J.L. Sánchez y F. Martín *Lógica computacional* (Thomson, 2003).
Cap. 5.7: El principio de resolución en lógica proposicional.
5. U. Schöning *Logic for Computer Scientists* (Birkäuser, 1989).
Cap. 1.5: Resolution.

Capítulo 6

Sintaxis y semántica de la lógica de primer orden

Tema 6: Sintaxis y semántica de la lógica de primer orden

José A. Alonso Jiménez
Andrés Cordon Franco

Grupo de Lógica Computacional
Dpto. de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Limitación expresiva de la lógica proposicional


- Ejemplo 1: *Si Sevilla es vecina de Cádiz, entonces Cádiz es vecina de Sevilla. Sevilla es vecina de Cádiz. Por tanto, Cádiz es vecina de Sevilla*
- Representación en lógica proposicional:

$$\{SvC \rightarrow CvS, SvC\} \models CvS$$
- Ejemplo 2: *Si una ciudad es vecina de otra, entonces la segunda es vecina de la primera. Sevilla es vecina de Cádiz. Por tanto, Cádiz es vecina de Sevilla*
- Representación en lógica proposicional: Imposible
- Representación en lógica de primer orden:

$$\{(\forall x)(\forall y)[vecina(x, y) \rightarrow vecina(y, x)], vecina(Sevilla, Cadiz)\} \\ \models vecina(Cadiz, Sevilla)$$

Potencia expresiva de la lógica de primer orden

- Mundo de los bloques



- $sobre(x, y)$ se verifica si el bloque x está colocado sobre el bloque y
- $sobre_mesa(x)$ se verifica si el bloque x está sobre la mesa
- Situación del ejemplo:

$sobre(a, b), sobre(b, c), sobre_mesa(c), sobre(d, e), sobre_mesa(e)$

Potencia expresiva de la lógica de primer orden

- $bajo(x, y)$ se verifica si el bloque x está debajo del bloque y

$$(\forall x)(\forall y)[bajo(x, y) \leftrightarrow sobre(y, x)]$$
- $encima(x, y)$ se verifica si el bloque x está encima del bloque y pudiendo haber otros bloques entre ellos

$$(\forall x)(\forall y)[encima(x, y) \leftrightarrow sobre(x, y) \vee (\exists z)[sobre(z, x) \wedge encima(z, y)]]$$
- $libre(x)$ se verifica si el bloque x no tiene bloques encima

$$(\forall x)[libre(x) \leftrightarrow \neg(\exists y)sobre(y, x)]$$
- $pila(x, y, z)$ se verifica si el bloque x está sobre el y , el y sobre el z y el z sobre la mesa

$$(\forall x)(\forall y)(\forall z)[pila(x, y, z) \leftrightarrow sobre(x, y) \wedge sobre(y, z) \wedge sobre_mesa(z)]$$
- Prop.: Si z, y, z es una pila entonces y no está libre

$$(\forall x)(\forall y)(\forall z)[pila(x, y, z) \rightarrow \neg libre(y)]$$

Potencia expresiva de la lógica de primer orden

- Representación con funciones e igualdad

- $es_bloque(x)$ se verifica si x es un bloque
- $superior(x)$ es el bloque que está sobre el bloque x
- Situación del ejemplo:

$$es_bloque(a), es_bloque(b), es_bloque(c), es_bloque(d), es_bloque(e) \\ superior(b) = a, superior(c) = b, superior(e) = d$$

- $sobre_mesa(x)$ se verifica si el bloque x está sobre la mesa

$$(\forall x)[sobre_mesa(x) \leftrightarrow es_bloque(x) \wedge \neg(\exists y)superior(y) = x]$$

- $libre(x)$ se verifica si el bloque x no tiene bloques encima

$$(\forall x)[libre(x) \leftrightarrow \neg(\exists y)superior(x) = y]$$

- $tope(x)$ es el bloque libre que está encima de x

$$(\forall x)[(libre(x) \rightarrow tope(x) = x) \wedge (\neg libre(x) \rightarrow tope(x) = tope(superior(x)))]$$

Potencia expresiva de la lógica de primer orden

- Ejemplos de formalización:

- *La Tierra es un planeta:* planeta(Tierra)
- *La Luna no es un planeta:* \neg planeta(Luna)
- *La Luna es un satélite:* satélite(Luna)
- *La Tierra gira alrededor del Sol:* gira(Tierra, Sol)
- *Todo planeta es un satélite:* $(\forall x)[planeta(x) \rightarrow satélite(x)]$
- *Todo planeta gira alrededor del Sol:* $(\forall x)[planeta(x) \rightarrow gira(x, Sol)]$
- *Algún planeta gira alrededor de la Luna:* $(\exists x)[planeta(x) \wedge gira(x, Luna)]$
- *Hay por lo menos un satélite:* $(\exists x)satélite(x)$
- *Ningún planeta es un satélite:* $\neg(\exists x)[planeta(x) \wedge satélite(x)]$
- *Ningún objeto celeste gira alrededor de sí mismo:* $\neg(\exists x)gira(x, x)$

Potencia expresiva de la lógica de primer orden

- *Alrededor de los satélites no giran objetos:* $(\forall x)[\text{satélite}(x) \rightarrow \neg(\exists y)\text{gira}(y, x)]$
- *Hay exactamente un satélite:* $(\exists x)[\text{satélite}(x) \wedge (\forall y)[\text{satélite}(y) \rightarrow x = y]]$
- *La Luna es un satélite de la Tierra:* $\text{satélite}(\text{Luna}, \text{Tierra})$
[Notar la sobrecarga de la relación satélite]
- *Todo planeta tiene un satélite:* $(\forall x)[\text{planeta}(x) \rightarrow (\exists y)\text{satélite}(y, x)]$
- *La Tierra no tiene satélites:* $\neg(\exists x)\text{satélite}(x, \text{Tierra})$
- *Algún planeta no tiene satélites:* $(\exists x)[\text{planeta}(x) \wedge \neg(\exists y)\text{satélite}(y, x)]$
- *Sólo los planetas tienen satélites:* $(\forall x)[(\exists y)\text{satélite}(y, x) \rightarrow \text{planeta}(x)]$
- *Todo satélite es satélite de algún planeta:*
 $(\forall x)[\text{satélite}(x) \rightarrow (\exists y)(\text{planeta}(y) \wedge \text{satélite}(x, y))]$
- *La Luna no gira alrededor de dos planetas diferentes:*
 $\neg(\exists x)(\exists y)[\text{planeta}(x) \wedge \text{planeta}(y) \wedge \text{gira}(\text{Luna}, x) \wedge \text{gira}(\text{Luna}, y) \wedge x \neq y]$
- *Hay exactamente dos planetas:*
 $(\exists x)(\exists y)[\text{planeta}(x) \wedge \text{planeta}(y) \wedge x \neq y \wedge (\forall z)[\text{planeta}(z) \rightarrow (z = x \vee z = y)]]$

Lenguaje de primer orden

- **Lenguaje de primer orden:**
 - Símbolos lógicos:
 - Variables: $x, y, z, \dots, x_1, x_2, \dots$
 - Conectivas: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$.
 - Cuantificadores: \forall, \exists .
 - Símbolo de igualdad: $=$.
 - Símbolos propios:
 - Símbolos de constantes: $a, b, c, \dots, a_1, a_2, \dots$
 - Símbolos de predicado (con aridad): $P, Q, R, \dots, P_1, P_2, \dots$
 - Símbolos de función (con aridad): $f, g, h, \dots, f_1, f_2, \dots$
 - Símbolos auxiliares: “(”, “)”, “,”.
 - Notación:
 - L, L_1, L_2, \dots representan lenguajes de primer orden.
 - **Var** representa el conjunto de las variables.
- Los símbolos de predicados de aridad mayor que 1 se llaman de relaciones.

Ejemplos de lenguajes de primer orden

- Lenguaje del mundo de los bloques:
 - Símbolos de constantes: a, b, c, d, e
 - Símbolos de predicado (y de relación):
 - de aridad 1: *sobre_mesa, libre, es_bloque*
 - de aridad 2: *sobre, bajo, encima*
 - de aridad 3: *pila*
 - Símbolos de función (de aridad 1): *superior, tope*
- Lenguaje de la aritmética:
 - Símbolos de constantes: $0, 1$
 - Símbolos de función:
 - monaria: s (siguiente)
 - binarias: $+, \cdot$
 - Símbolo de predicado binario: $<$

Sintaxis: términos

- Términos
 - Def. de **término** de un lenguaje de primer orden L :
 - Las variables son términos de L .
 - Las constantes de L son términos de L .
 - Si f es un símbolo de función n -aria de L y t_1, \dots, t_n son términos de L , entonces $f(t_1, \dots, t_n)$ es un término de L .
 - Ejemplo: En el lenguaje de la aritmética,
 1. $+(\cdot(x, 1), s(y))$ es un término, que se suele escribir como $(x \cdot 1) + s(y)$
 2. $+(\cdot(x, <), s(y))$ no es un término
 - Notación:
 - s, t, t_1, t_2, \dots representan términos.
 - $\text{Térm}(L)$ representa el conjunto de los términos de L

Sintaxis: fórmulas atómicas

- **Fórmulas atómicas:**

- Def. de **fórmula atómica** de un lenguaje de primer orden L :

- Si t_1 y t_2 son términos de L , entonces $t_1 = t_2$ es una fórmula atómica de L .
- Si P es un símbolo de relación n -aria de L y t_1, \dots, t_n son términos de L , entonces $P(t_1, \dots, t_n)$ es una fórmula atómica de L .

- Ejemplo: En el lenguaje de la aritmética,

1. $<(\cdot(x, 1), s(y))$ es una fórmula atómica que se suele escribir como $x \cdot 1 < s(y)$
2. $+(x, y) = \cdot(x, y)$ es una fórmula atómica que se suele escribir como $x + y = x \cdot y$

- Notación:

- A, B, A_1, A_2, \dots representan fórmulas atómicas.
- $\text{Átom}(L)$ representa el conjunto de las fórmulas atómicas de L .

Sintaxis: fórmulas

- **Fórmulas:**

- Def. de las **fórmulas** de L :

- Las fórmulas atómicas de L son fórmulas de L .
- Si F y G son fórmulas de L , entonces $\neg F$, $(F \wedge G)$, $(F \vee G)$, $(F \rightarrow G)$ y $(F \leftrightarrow G)$ son fórmulas de L .
- Si F es una fórmula de L , entonces $(\forall x)F$ y $(\exists x)F$ son fórmulas de L .

- Ejemplo: En el lenguaje de la aritmética,


1. $(\forall x)(\exists y) <(x, y)$ es una fórmula que se suele escribir como $(\forall x)(\exists y)x < y$
2. $(\forall x)(\exists y) + (x, y)$ no es una fórmula.

- Notación:

- F, G, H, F_1, F_2, \dots representan fórmulas.
- $\text{Fórm}(L)$ representa el conjunto de las fórmulas de L .

Sintaxis: fórmulas

- Árboles de análisis (o de formación) y esquemáticos



Sintaxis: subfórmulas

- Subfórmulas:

- Def: El conjunto $\text{Subf}(F)$ de las subfórmulas de una fórmula F se define recursivamente por:

$$\text{Subf}(F) = \begin{cases} \{F\}, & \text{si } F \text{ es una fórmula atómica;} \\ \{F\} \cup \text{Subf}(G), & \text{si } F = \neg G; \\ \{F\} \cup \text{Subf}(G) \cup \text{Subf}(H), & \text{si } F = G * H; \\ \{F\} \cup \text{Subf}(G), & \text{si } F = (\forall x)G; \\ \{F\} \cup \text{Subf}(G), & \text{si } F = (\exists x)G \end{cases}$$

- Ejemplo:

$$\text{Subf}((\forall x)(R(x, c) \rightarrow P(f(y)))) = \{ (\forall x)(R(x, c) \rightarrow P(f(y))), \\ (R(x, c) \rightarrow P(f(y))), \\ R(x, c), \\ P(f(y)) \}$$

Sintaxis: omisión de paréntesis

- Criterios de reducción de paréntesis:

- Pueden eliminarse los paréntesis externos.

$F \wedge G$ es una abreviatura de $(F \wedge G)$

- Precedencia de asociación de conectivas y cuantificadores: $\forall, \exists, \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$.

$\forall x P(x) \rightarrow Q(x)$ es una abreviatura de $((\forall x)P(x)) \rightarrow Q(x)$

- Cuando una conectiva se usa repetidamente, se asocia por la derecha.

$F \vee G \vee H$ es una abreviatura de $(F \vee (G \vee H))$

$F \wedge G \wedge H \rightarrow \neg F \vee G$ es una abreviatura de $((F \wedge (G \wedge H)) \rightarrow (\neg F \vee G))$

- Los símbolos binarios pueden escribirse en notación infija.

$x + y$ es una abreviatura de $+(x, y)$

$x < y$ es una abreviatura de $<(x, y)$

Sintaxis: conjuntos de variables

- Conjuntos de variables:

- Def.: El **conjunto de las variables** de un término t se define recursivamente por:

$$V(t) = \begin{cases} \emptyset, & \text{si } t \text{ es una constante;} \\ \{x\}, & \text{si } t \text{ es una variable } x; \\ V(t_1) \cup \dots \cup V(t_n), & \text{si } t \text{ es } f(t_1, \dots, t_n) \end{cases}$$

- Def.: El **conjunto de las variables** de una fórmula F se define recursivamente por:

$$V(F) = \begin{cases} V(t_1) \cup V(t_2), & \text{si } F \text{ es } t_1 = t_2; \\ V(t_1) \cup \dots \cup V(t_n), & \text{si } F \text{ es } P(t_1, \dots, t_n); \\ V(G), & \text{si } F \text{ es } \neg G; \\ V(G) \cup V(H), & \text{si } F \text{ es } G * H; \\ V(G), & \text{si } F \text{ es } (\forall x)G; \\ V(G), & \text{si } F \text{ es } (\exists x)G \end{cases}$$

- Ejemplos:

– El conjunto de las variables de $(\forall x)(R(x, c) \rightarrow P(f(y)))$ es $\{x, y\}$.

– El conjunto de las variables de $(\forall x)(R(a, c) \rightarrow P(f(y)))$ es $\{y\}$.

Sintaxis: apariciones libres y ligadas

- Apariciones libres y ligadas:

- Def.: Una aparición (u ocurrencia) de la variable x en la fórmula F es **ligada** si es en una subfórmula de F de la forma $(\forall x)G$ ó $(\exists x)G$.

- Def.: Una aparición (u ocurrencia) de la variable x en la fórmula F es **libre** si no es ligada

- Ejemplo: Las apariciones ligadas son las subrayadas:

$$(\forall x)(P(\underline{x}) \rightarrow R(\underline{x}, y)) \rightarrow ((\exists y)P(\underline{y}) \rightarrow R(z, x))$$

$$(\exists x)R(\underline{x}, y) \vee (\forall y)P(\underline{y})$$

$$(\forall x)(P(\underline{x}) \rightarrow (\exists y)R(\underline{x}, \underline{y}))$$

$$P(x) \rightarrow R(x, y)$$

Sintaxis: variables libres y ligadas

- Variables libres y ligadas:

- Def.: La variable x es **libre** en F si tiene una aparición libre en F .

- Def.: La variable x es **ligada** en F si tiene una aparición ligada en F .

- Prop.: El **conjunto de las variables libres** de una fórmula F es:

$$VL(F) = \begin{cases} V(t_1) \cup V(t_2), & \text{si } F \text{ es } t_1 = t_2; \\ V(t_1) \cup \dots \cup V(t_n), & \text{si } F \text{ es } P(t_1, \dots, t_n); \\ VL(G), & \text{si } F \text{ es } \neg G; \\ VL(G) \cup VL(H), & \text{si } F \text{ es } G * H; \\ VL(G) \setminus \{x\}, & \text{si } F \text{ es } (\forall x)G; \\ VL(G) \setminus \{x\}, & \text{si } F \text{ es } (\exists x)G \end{cases}$$

- Ejemplo:

| Fórmula | Ligadas | Libres |
|---|---------|-----------|
| $(\forall x)(P(x) \rightarrow R(x, y)) \rightarrow ((\exists y)P(y) \rightarrow R(x, z))$ | x, y | x, y, z |
| $(\forall x)(P(x) \rightarrow (\exists y)R(x, y))$ | x, y | |
| $(\forall z)(P(x) \rightarrow R(x, y))$ | | x, y |

Sintaxis: fórmulas cerradas y básicas

- **Fórmula cerradas:**
 - Def.: Una **fórmula cerrada** (o **sentencia**) es una fórmula sin variables libres.
 - Ejemplos: $(\forall x)(P(x) \rightarrow (\exists y)R(x, y))$ es cerrada.
 $(\exists x)R(x, y) \vee (\forall y)P(y)$ no es cerrada.
- **Fórmulas básicas:**
 - Def.: Una **fórmula básica** es una fórmula sin variables.
 - Ejemplos: $P(a) \rightarrow R(a, b)$ es básica.
 $(\forall x)(P(x) \rightarrow (\exists y)R(x, y))$ no es básica.

Sintaxis: sustituciones

- **Sustituciones (de un lenguaje):**
 - Def.: Una **sustitución** σ (de L) es una aplicación $\sigma : \text{Var} \rightarrow \text{Térm}(L)$.
 - Ejemplo: La aplicación σ de Var en los términos de la aritmética tal que $\sigma(x) = s(0)$, $\sigma(y) = x + y$ y $\sigma(z) = z$ para $z \in \text{Var} \setminus \{x, y\}$ es una sustitución.
 - Notación: $[x_1/t_1, x_2/t_2, \dots, x_n/t_n]$ representa la sustitución σ definida por

$$\sigma(x) = \begin{cases} t_i, & \text{si } x \text{ es } x_i; \\ x, & \text{si } x \notin \{x_1, \dots, x_n\} \end{cases}$$
 - Ejemplo: La sustitución del ejemplo anterior se representa por $[x/s(0), y/x + y]$
 - Notación: $\sigma, \sigma_1, \sigma_2, \dots$ representarán sustituciones.

Sintaxis: Aplicación de sustituciones a términos

- Aplicación de sustituciones a términos:

- Def.: $t[x_1/t_1, \dots, x_n/t_n]$ es el término obtenido sustituyendo en t las apariciones de x_i por t_i .
- Def.: La extensión de σ a términos es la aplicación $\sigma : \text{Térm}(L) \rightarrow \text{Térm}(L)$ definida por

$$t\sigma = \begin{cases} c, & \text{si } t \text{ es una constante } c; \\ \sigma(x), & \text{si } t \text{ es una variable } x; \\ f(t_1\sigma, \dots, t_n\sigma), & \text{si } t \text{ es } f(t_1, \dots, t_n) \end{cases}$$

- Si $\sigma = [x/f(y, a), y/z]$, entonces
 - $a\sigma = a$, donde a es una constante.
 - $w\sigma = w$, donde w es una variable distinta de x e y .
 - $h(a, x, w)\sigma = h(a\sigma, x\sigma, w\sigma) = h(a, f(y, a), w)$
 - $f(x, y)\sigma = f(x\sigma, y\sigma) = f(f(y, a), z)$
 - $h(a, f(x, y), w)\sigma = h(a\sigma, f(x, y)\sigma, w\sigma) = h(a, f(f(y, a), z), w)$

Sintaxis: Composición de sustituciones

- Composición de sustituciones:

- Diferencia entre sustituciones simultáneas y consecutivas:
 - $g(x, z)[x/g(z, b), z/a] = g(g(z, b), a)$
 - $g(x, z)[x/g(z, b)][z/a] = g(g(z, b), z)[z/a] = g(g(a, b), a)$
- Cálculo de la composición: Si $\sigma_1 = [x/f(z, a), y/w]$ y $\sigma_2 = [x/b, z/g(w)]$, entonces
 - $x\sigma_1\sigma_2 = (x\sigma_1)\sigma_2 = f(z, a)\sigma_2 = f(z\sigma_2, a\sigma_2) = f(g(w), a)$
 - $y\sigma_1\sigma_2 = (y\sigma_1)\sigma_2 = w\sigma_2 = w$
 - $z\sigma_1\sigma_2 = (z\sigma_1)\sigma_2 = z\sigma_2 = g(w)$
 - $w\sigma_1\sigma_2 = (w\sigma_1)\sigma_2 = w\sigma_2 = w$

Por tanto, $\sigma_1\sigma_2 = [x/f(g(w), a), y/w, z/g(w)]$. Comprobación:

$$\begin{aligned} h(y, x)\sigma_1\sigma_2 &= (h(y, x)\sigma_1)\sigma_2 = h(w, f(z, a))\sigma_2 = h(w\sigma_2, f(z, a)\sigma_2) = \\ &= h(w, f(g(w), a)) \\ h(y, x)\sigma_1\sigma_2 &= h(y, x)[x/f(g(w), a), y/w, z/g(w)] = h(w, f(g(w), a)) \end{aligned}$$

Sintaxis: Aplicación de sustituciones a fórmulas

- Aplicación de sustituciones a fórmulas:

- Def.: $F[x_1/t_1, \dots, x_n/t_n]$ es la fórmula obtenida sustituyendo en F las apariciones libres de x_i por t_i .
- Def.: La extensión de σ a fórmulas es la aplicación $\sigma : \text{Fórm}(L) \rightarrow \text{Fórm}(L)$ definida por

$$F\sigma = \begin{cases} P(t_1\sigma, \dots, t_n\sigma), & \text{si } F \text{ es la fórmula atómica } P(t_1, \dots, t_n); \\ t_1\sigma = t_2\sigma, & \text{si } F \text{ es la fórmula } t_1 = t_2; \\ \neg(G\sigma), & \text{si } F \text{ es } \neg G; \\ G\sigma * H\sigma, & \text{si } F \text{ es } G * H; \\ (Qx)(G\sigma_x), & \text{si } F \text{ es } (Qx)G \text{ y } Q \in \{\forall, \exists\} \end{cases}$$

donde σ_x es la sustitución definida por

$$\sigma_x(y) = \begin{cases} x, & \text{si } y \text{ es } x; \\ \sigma(y) & \text{si } y \text{ es distinta de } x \end{cases}$$

Sintaxis: Aplicación de sustituciones a fórmulas

- Ejemplos: Si $\sigma = [x/f(y), y/b]$, entonces

1. $((\forall x)(Q(x) \rightarrow R(x, y)))\sigma = (\forall x)((Q(x) \rightarrow R(x, y))\sigma_x)$
 $= (\forall x)(Q(x)\sigma_x \rightarrow R(x, y)\sigma_x)$
 $= (\forall x)(Q(x) \rightarrow R(x, b))$
2. $(Q(x) \rightarrow (\forall x)R(x, y))\sigma = Q(x)\sigma \rightarrow ((\forall x)R(x, y))\sigma$
 $= Q(f(y)) \rightarrow (\forall x)(R(x, y)\sigma_x)$
 $= Q(f(y)) \rightarrow (\forall x)R(x, b)$
3. $((\forall x)(Q(x) \rightarrow (\forall y)R(x, y)))\sigma = (\forall x)((Q(x) \rightarrow (\forall y)R(x, y))\sigma_x)$
 $= (\forall x)(Q(x)\sigma_x \rightarrow ((\forall y)R(x, y))\sigma_{xy})$
 $= (\forall x)(Q(x) \rightarrow (\forall y)(R(x, y)\sigma_{xy}))$
 $= (\forall x)(Q(x) \rightarrow (\forall y)R(x, y))$

Sintaxis: Sustituciones libres

- **Sustituciones libres:**

- **Def.:** Una **sustitución se denomina libre para una fórmula** cuando todas las apariciones de variables introducidas por la sustitución en esa fórmula resultan libres.

- **Ejemplos:**

- $[y/x]$ no es libre para $(\exists x)(x < y)$

$$(\exists x)(x < y)[y/x] = (\exists x)(x < x)$$

- $[y/g(y)]$ es libre para $(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x, f(y)))$

$$(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x, f(y)))[y/g(y)] = (\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x, f(g(y))))$$

- $[y/g(x)]$ no es libre para $(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x, f(y)))$

$$(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x, f(y)))[y/g(x)] = (\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x, f(g(x))))$$

- **Convenio:** Al escribir $F\sigma$ supondremos que σ es libre para F .

Semántica: Estructuras, asignaciones e interpretaciones

- Una **estructura del lenguaje L** es un par $\mathcal{I} = (U, I)$ tal que:

- U es un conjunto no vacío, denominado **universo** de la estructura;

- I es una función cuyo dominio es el conjunto de símbolos propios de L y tal que

- si c es una constante de L , entonces $I(c) \in U$

(i.e. $I(c)$ es un elemento de U);

- si f es un símbolo de función n -aria ($n > 0$) de L , entonces $I(f) : U^n \rightarrow U$

(i.e. $I(f)$ es una función n -aria en U);

- si R es un símbolo de relación n -aria ($n > 0$) de L , entonces $I(R) \subseteq U^n$

(i.e. $I(R)$ es una relación n -aria en U).

- Una **asignación A en una estructura (U, I)** es una función $A : \text{Var} \rightarrow U$ que hace corresponder a cada variable del alfabeto un elemento del universo de la estructura.

- Una **interpretación de L** es un par (\mathcal{I}, A) formado por una estructura \mathcal{I} de L y una asignación A en \mathcal{I} .

- **Notación:** A veces se usa para los valores de verdad **V** y **F** en lugar de 1 y 0.

Semántica: Estructuras

- Ejemplos: Sea L el lenguaje de la aritmética cuyos símbolos propios son:

constante: 0;
 símbolo de función monaria: s ;
 símbolo de función binaria: $+$ y
 símbolo de relación binaria: \leq

- Primera estructura de L :

$U_1 = \mathbb{N}$
 $I_1(0) = 0$
 $I_1(s) = \{(n, n + 1) : n \in \mathbb{N}\}$ (sucesor)
 $I_1(+)$ = $\{(a, b, a + b) : a, b \in \mathbb{N}\}$ (suma)
 $I_1(\leq) = \{(n, m) : n, m \in \mathbb{N}, n \leq m\}$ (menor o igual)

- Segunda estructura de L :

$U_2 = \{0, 1\}^*$ (cadenas de 0 y 1)
 $I_2(0) = \epsilon$ (cadena vacía)
 $I_2(s) = \{(w, w1) : w \in \{0, 1\}^*\}$ (siguiente)
 $I_2(+)$ = $\{(w_1, w_2, w_1w_2) : w_1, w_2 \in \{0, 1\}^*\}$ (concatenación)
 $I_2(\leq) = \{(w_1, w_2) : w_1, w_2 \in \{0, 1\}^*, w_1 \text{ es prefijo de } w_2\}$ (prefijo)

Semántica: Estructuras

- Ejemplos (cont.):

- Tercera estructura de L :

$U_3 = \{\text{abierto}, \text{cerrado}\}$
 $I_3(0) = \text{cerrado}$
 $I_3(s) = \{(\text{abierto}, \text{cerrado}),$
 $\quad (\text{cerrado}, \text{abierto})\}$
 $I_3(+)$ = $\{(\text{abierto}, \text{abierto}, \text{abierto}),$
 $\quad (\text{abierto}, \text{cerrado}, \text{abierto}),$
 $\quad (\text{cerrado}, \text{abierto}, \text{abierto}),$
 $\quad (\text{cerrado}, \text{cerrado}, \text{cerrado})\}$
 $I_3(\leq) = \{(\text{abierto}, \text{abierto}),$
 $\quad (\text{cerrado}, \text{abierto}),$
 $\quad (\text{cerrado}, \text{cerrado})\}$

| e | $I_3(s)(e)$ | $I_3(+)$ | abierto | cerrado | $I_3(\leq)$ | abierto | cerrado |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| abierto | cerrado | abierto | abierto | abierto | abierto | 1 | 0 |
| cerrado | abierto | cerrado | abierto | cerrado | cerrado | 1 | 1 |

Semántica: Evaluación de términos

- Evaluación de términos:

- Def.: Dada una estructura $\mathcal{I} = (U, I)$ de L y una asignación A en \mathcal{I} , se define la **función de evaluación de términos** $\mathcal{I}_A : \text{Térm}(L) \rightarrow U$ por

$$\mathcal{I}_A(t) = \begin{cases} I(c), & \text{si } t \text{ es una constante } c; \\ A(x), & \text{si } t \text{ es una variable } x; \\ I(f)(\mathcal{I}_A(t_1), \dots, \mathcal{I}_A(t_n)), & \text{si } t \text{ es } f(t_1, \dots, t_n) \end{cases}$$

- $\mathcal{I}_A(t)$ se lee “el valor de t en \mathcal{I} respecto de A ”.
- Ejemplos: Sean L el lenguaje de la página 27 y t el término $s(+ (x, s(0)))$.
 - Si \mathcal{I} es la primera estructura y $A(x) = 3$, entonces

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_A(t) &= \mathcal{I}_A(s(+ (x, s(0)))) &= I(s)(\mathcal{I}_A(+ (x, s(0)))) &= \\ &= I(s)(I(+)(\mathcal{I}_A(x), \mathcal{I}_A(s(0)))) &= I(s)(I(+)(A(x), \mathcal{I}_A(s(0)))) &= \\ &= I(s)(I(+)(3, I(s)(\mathcal{I}_A(0)))) &= I(s)(I(+)(3, I(s)(I(0)))) &= \\ &= I(s)(I(+)(3, I(s)(0))) &= I(s)(I(+)(3, 1)) &= \\ &= I(s)(4) &= 5 \end{aligned}$$

Semántica: Evaluación de términos

- Ejemplos (cont.)

- Si \mathcal{I} es la segunda estructura y $A(x) = 10$, entonces

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_A(t) &= \mathcal{I}_A(s(+ (x, s(0)))) &= I(s)(\mathcal{I}_A(+ (x, s(0)))) &= \\ &= I(s)(I(+)(\mathcal{I}_A(x), \mathcal{I}_A(s(0)))) &= I(s)(I(+)(A(x), \mathcal{I}_A(s(0)))) &= \\ &= I(s)(I(+)(10, I(s)(\mathcal{I}_A(0)))) &= I(s)(I(+)(10, I(s)(I(0)))) &= \\ &= I(s)(I(+)(10, I(s)(\epsilon))) &= I(s)(I(+)(10, 1)) &= \\ &= I(s)(101) &= 10111 \end{aligned}$$

- Si \mathcal{I} es la tercera estructura y $A(x) = \text{abierto}$, entonces

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_A(t) &= \mathcal{I}_A(s(+ (x, s(0)))) &= I(s)(\mathcal{I}_A(+ (x, s(0)))) &= \\ &= I(s)(I(+)(\mathcal{I}_A(x), \mathcal{I}_A(s(0)))) &= I(s)(I(+)(A(x), \mathcal{I}_A(s(0)))) &= \\ &= I(s)(I(+)(\text{abierto}, I(s)(\mathcal{I}_A(0)))) &= I(s)(I(+)(\text{abierto}, I(s)(I(0)))) &= \\ &= I(s)(I(+)(\text{abierto}, I(s)(\text{cerrado}))) &= I(s)(I(+)(\text{abierto}, \text{abierto})) &= \\ &= I(s)(\text{abierto}) &= \text{cerrado} \end{aligned}$$

Semántica: Evaluación de términos

- Ejemplo anterior con notación reducida e infija:

Sean L el lenguaje de la página 27 y t el término $s(x + s(0))$.

- Si \mathcal{I} es la primera estructura y $A(x) = 3$, entonces

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_A(t) &= \mathcal{I}_A(s(x + s(0))) = s^I(3 +^I s^I(0^I)) = \\ &= s^I(3 +^I s^I(0)) = s^I(3 +^I 1) = \\ &= s^I(4) = 5 \end{aligned}$$

- Si \mathcal{I} es la segunda estructura y $A(x) = 10$, entonces

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_A(t) &= \mathcal{I}_A(s(x + s(0))) = s^I(10 +^I s^I(0^I)) = \\ &= s^I(10 +^I s^I(\epsilon)) = s^I(10 +^I 1) = \\ &= s^I(101) = 1011 \end{aligned}$$

- Si \mathcal{I} es la tercera estructura y $A(x) = \text{abierto}$, entonces

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_A(t) &= \mathcal{I}_A(s(x + s(0))) = s^I(\text{abierto} +^I s^I(0^I)) = \\ &= s^I(\text{abierto} +^I s^I(\text{cerrado})) = s^I(\text{abierto} +^I \text{abierto}) = \\ &= s^I(\text{abierto}) = \text{cerrado} \end{aligned}$$

Semántica: Evaluación de fórmulas

- Variante de una asignación:

- Def.: Sea A una asignación en la estructura (U, I) y $u \in U$. Mediante $A[x/u]$ se representa la asignación definida por

$$A[x/u](y) = \begin{cases} u, & \text{si } y \text{ es } x; \\ A(y) & \text{si } y \text{ es distinta de } x \end{cases}$$

- Función de verdad de una relación:

- Def.: Si R es una relación n -aria en U (i.e. $R \subseteq U^n$), entonces la **función de verdad de R** es la función $H_R : U^n \rightarrow \mathbb{B}$ definida por

$$H_R(u_1, \dots, u_n) = \begin{cases} 1, & \text{si } (u_1, \dots, u_n) \in R; \\ 0, & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

- Función de verdad de la igualdad:

- Def.: La **función de verdad de la igualdad** en U es la función $H_= : U^2 \rightarrow \mathbb{B}$ definida por

$$H_=(u_1, u_2) = \begin{cases} 1, & \text{si } u_1 = u_2; \\ 0, & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

Semántica: Evaluación de fórmulas

- Evaluación de fórmulas:

- Def.: Dada una estructura $\mathcal{I} = (U, I)$ de L y una asignación A sobre \mathcal{I} , se define la **función de evaluación de fórmulas** $\mathcal{I}_A : \text{Fórm}(L) \rightarrow \mathbb{B}$ por

- Si F es $t_1 = t_2$, $\mathcal{I}_A(F) = H_{=}(\mathcal{I}_A(t_1), \mathcal{I}_A(t_2))$

- Si F es $P(t_1, \dots, t_n)$, $\mathcal{I}_A(F) = H_{I(P)}(\mathcal{I}_A(t_1), \dots, \mathcal{I}_A(t_n))$

- Si F es $\neg G$, $\mathcal{I}_A(F) = H_{\neg}(\mathcal{I}_A(G))$

- Si F es $G * H$, $\mathcal{I}_A(F) = H_{*}(\mathcal{I}_A(G), \mathcal{I}_A(H))$

- Si F es $(\forall x)G$, $\mathcal{I}_A(F) = \begin{cases} 1, & \text{si para todo } u \in U \text{ se tiene } \mathcal{I}_{A[x/u]}(G) = 1; \\ 0, & \text{en caso contrario} \end{cases}$

- Si F es $(\exists x)G$, $\mathcal{I}_A(F) = \begin{cases} 1, & \text{si existe algún } u \in U \text{ tal que } \mathcal{I}_{A[x/u]}(G) = 1; \\ 0, & \text{en caso contrario} \end{cases}$

- $\mathcal{I}_A(F)$ se lee “el valor de F en \mathcal{I} respecto de A ”.

Semántica: Evaluación de fórmulas

- Ejemplo: Evaluación de $(\exists y)P(x, y)$ en la estructura $\mathcal{I} = (U, I)$ respecto de la asignación A tales que $U = \{1, 2\}$, $I(P) = \{(1, 1), (2, 2)\}$ y $A(x) = 1$

- En notación completa:

$$\mathcal{I}_A((\exists y)P(x, y)) = \mathbf{V} \Leftrightarrow \mathcal{I}_{A[y/1]}P(x, y) = \mathbf{V} \text{ ó } \mathcal{I}_{A[y/2]}P(x, y) = \mathbf{V}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{A[y/1]}P(x, y) &= H_{I(P)}(\mathcal{I}_{A[y/1]}(x), \mathcal{I}_{A[y/1]}(y)) \\ &= H_{I(P)}(A[y/1](x), A[y/1](y)) \\ &= H_{I(P)}(1, 1) \\ &= \mathbf{V} \end{aligned}$$

Luego, $\mathcal{I}_A((\exists y)P(x, y)) = \mathbf{V}$.

- En notación reducida:

$$\mathcal{I}_A((\exists y)P(x, y)) = \mathbf{V} \Leftrightarrow \mathcal{I}_{A[y/1]}P(x, y) = \mathbf{V} \text{ ó } \mathcal{I}_{A[y/2]}P(x, y) = \mathbf{V}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{A[y/1]}P(x, y) &= P^I(A[y/1](x), A[y/1](y)) \\ &= P^I(1, 1) \\ &= \mathbf{V} \end{aligned}$$

Luego, $\mathcal{I}_A((\exists y)P(x, y)) = \mathbf{V}$.

Semántica: Evaluación de fórmulas

- Ejemplo: Evaluación de $(\forall x)(\exists y)P(x, y)$ en la estructura $\mathcal{I} = (U, I)$ respecto de la asignación A tales que $U = \{1, 2\}$ e $I(P) = \{(1, 1), (2, 2)\}$

$$\mathcal{I}_A((\forall x)(\exists y)P(x, y)) = \mathbf{V} \Leftrightarrow \mathcal{I}_{A[x/1]}((\exists y)P(x, y)) = \mathbf{V} \text{ y } \mathcal{I}_{A[x/2]}((\exists y)P(x, y)) = \mathbf{V}$$

$$\mathcal{I}_{A[x/1]}((\exists y)P(x, y)) = \mathbf{V} \Leftrightarrow \mathcal{I}_{A[x/1, y/1]}P(x, y) = \mathbf{V} \text{ ó } \mathcal{I}_{A[x/1, y/2]}P(x, y) = \mathbf{V}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{A[x/1, y/1]}P(x, y) &= H_{I(P)}(\mathcal{I}_{A[x/1, y/1]}(x), \mathcal{I}_{A[x/1, y/1]}(y)) \\ &= H_{I(P)}(A[x/1, y/1](x), A[x/1, y/1](y)) \\ &= H_{I(P)}(1, 1) \\ &= \mathbf{V} \end{aligned}$$

$$\text{Luego, } \mathcal{I}_{A[x/1]}((\exists y)P(x, y)) = \mathbf{V}.$$

$$\mathcal{I}_{A[x/2]}((\exists y)P(x, y)) = \mathbf{V} \Leftrightarrow \mathcal{I}_{A[x/2, y/1]}P(x, y) = \mathbf{V} \text{ ó } \mathcal{I}_{A[x/2, y/2]}P(x, y) = \mathbf{V}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{A[x/2, y/2]}P(x, y) &= H_{I(P)}(\mathcal{I}_{A[x/2, y/2]}(x), \mathcal{I}_{A[x/2, y/2]}(y)) \\ &= H_{I(P)}(A[x/2, y/2](x), A[x/2, y/2](y)) \\ &= H_{I(P)}(2, 2) \\ &= \mathbf{V} \end{aligned}$$

$$\text{Luego, } \mathcal{I}_{A[x/2]}((\exists y)P(x, y)) = \mathbf{V}.$$

$$\text{Por tanto, } \mathcal{I}_A((\forall x)(\exists y)P(x, y)) = \mathbf{V}$$

Semántica: Evaluación de fórmulas

- Ejemplo anterior en notación reducida:

Evaluación de $(\forall x)(\exists y)P(x, y)$ en la estructura $\mathcal{I} = (U, I)$ respecto de la asignación A tales que $U = \{1, 2\}$ e $I(P) = \{(1, 1), (2, 2)\}$

$$\mathcal{I}_A((\forall x)(\exists y)P(x, y)) = \mathbf{V} \Leftrightarrow \mathcal{I}_{A[x/1]}((\exists y)P(x, y)) = \mathbf{V} \text{ y } \mathcal{I}_{A[x/2]}((\exists y)P(x, y)) = \mathbf{V}$$

$$\mathcal{I}_{A[x/1]}((\exists y)P(x, y)) = \mathbf{V} \Leftrightarrow \mathcal{I}_{A[x/1, y/1]}P(x, y) = \mathbf{V} \text{ ó } \mathcal{I}_{A[x/1, y/2]}P(x, y) = \mathbf{V}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{A[x/1, y/1]}P(x, y) &= P^I(1, 1) \\ &= \mathbf{V} \end{aligned}$$

$$\text{Luego, } \mathcal{I}_{A[x/1]}((\exists y)P(x, y)) = \mathbf{V}.$$

$$\mathcal{I}_{A[x/2]}((\exists y)P(x, y)) = \mathbf{V} \Leftrightarrow \mathcal{I}_{A[x/2, y/1]}P(x, y) = \mathbf{V} \text{ ó } \mathcal{I}_{A[x/2, y/2]}P(x, y) = \mathbf{V}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{A[x/2, y/2]}P(x, y) &= P^I(2, 2) \\ &= \mathbf{V} \end{aligned}$$

$$\text{Luego, } \mathcal{I}_{A[x/2]}((\exists y)P(x, y)) = \mathbf{V}.$$

$$\text{Por tanto, } \mathcal{I}_A((\forall x)(\exists y)P(x, y)) = \mathbf{V}$$

Semántica: Evaluación de fórmulas

- Ejemplo: Evaluación de $(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(g(x), a))$ en la estructura $\mathcal{I} = (U, I)$ respecto de la asignación A tales que $U = \{1, 2\}$, $I(a) = 1$, $I(g) = \{(1, 2), (2, 1)\}$, $I(P) = \{2\}$ e $I(Q) = \{(1, 2), (2, 2)\}$.

$$\mathcal{I}_A((\forall x)(P(x) \rightarrow Q(g(x), a))) = \mathbf{V} \Leftrightarrow \mathcal{I}_{A[x/1]}(P(x) \rightarrow Q(g(x), a)) = \mathbf{V} \text{ y} \\ \mathcal{I}_{A[x/2]}(P(x) \rightarrow Q(g(x), a)) = \mathbf{V}$$

$$\begin{aligned} & \mathcal{I}_{A[x/1]}(P(x) \rightarrow Q(g(x), a)) = \\ & = H_{\rightarrow}(\mathcal{I}_{A[x/1]}(P(x)), \mathcal{I}_{A[x/1]}(Q(g(x), a))) = \\ & = H_{\rightarrow}(H_{I(P)}(\mathcal{I}_{A[x/1]}(x)), H_{I(Q)}(\mathcal{I}_{A[x/1]}(g(x)), \mathcal{I}_{A[x/1]}(a))) = \\ & = H_{\rightarrow}(H_{I(P)}(A[x/1](x)), H_{I(Q)}(I(g)(\mathcal{I}_{A[x/1]}(x)), I(a))) = \\ & = H_{\rightarrow}(H_{I(P)}(1), H_{I(Q)}(I(g)(A[x/1](x)), 1)) = \\ & = H_{\rightarrow}(\mathbf{F}, H_{I(Q)}(I(g)(1), 1)) = \\ & = H_{\rightarrow}(\mathbf{F}, H_{I(Q)}(2, 1)) = \\ & = H_{\rightarrow}(\mathbf{F}, \mathbf{F}) = \\ & = \mathbf{V} \end{aligned}$$

Semántica: Evaluación de fórmulas

- Ejemplo (cont.)

$$\begin{aligned} & \mathcal{I}_{A[x/2]}(P(x) \rightarrow Q(g(x), a)) = \\ & = H_{\rightarrow}(\mathcal{I}_{A[x/2]}(P(x)), \mathcal{I}_{A[x/2]}(Q(g(x), a))) = \\ & = H_{\rightarrow}(H_{I(P)}(\mathcal{I}_{A[x/2]}(x)), H_{I(Q)}(\mathcal{I}_{A[x/2]}(g(x)), \mathcal{I}_{A[x/2]}(a))) = \\ & = H_{\rightarrow}(H_{I(P)}(A[x/2](x)), H_{I(Q)}(I(g)(\mathcal{I}_{A[x/2]}(x)), I(a))) = \\ & = H_{\rightarrow}(H_{I(P)}(2), H_{I(Q)}(I(g)(A[x/2](x)), 1)) = \\ & = H_{\rightarrow}(\mathbf{V}, H_{I(Q)}(I(g)(2), 1)) = \\ & = H_{\rightarrow}(\mathbf{V}, H_{I(Q)}(1, 1)) = \\ & = H_{\rightarrow}(\mathbf{V}, \mathbf{V}) = \\ & = \mathbf{V} \end{aligned}$$

Por tanto, $\mathcal{I}_A((\forall x)(P(x) \rightarrow Q(g(x), a))) = \mathbf{V}$.

Semántica: Evaluación de fórmulas

- Ejemplo anterior con notación reducida:

Evaluación de $(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(g(x), a))$ en la estructura $\mathcal{I} = (U, I)$ respecto de la asignación A tales que $U = \{1, 2\}$, $I(a) = 1$, $I(g) = \{(1, 2), (2, 1)\}$, $I(P) = \{2\}$ e $I(Q) = \{(1, 2), (2, 2)\}$.

$$\mathcal{I}_A((\forall x)(P(x) \rightarrow Q(g(x), a))) = \mathbf{V} \Leftrightarrow \mathcal{I}_{A[x/1]}(P(x) \rightarrow Q(g(x), a)) = \mathbf{V} \text{ y} \\ \mathcal{I}_{A[x/2]}(P(x) \rightarrow Q(g(x), a)) = \mathbf{V}$$

$$\begin{aligned} & \mathcal{I}_{A[x/1]}(P(x) \rightarrow Q(g(x), a)) \\ &= P^I(1) \rightarrow Q^I(g^I(1), a^I) \\ &= \mathbf{F} \rightarrow Q^I(2, 1) \\ &= \mathbf{F} \rightarrow \mathbf{F} \\ &= \mathbf{V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \mathcal{I}_{A[x/2]}(P(x) \rightarrow Q(g(x), a)) \\ &= P^I(2) \rightarrow Q^I(g^I(2), a^I) \\ &= \mathbf{V} \rightarrow Q^I(1, 1) \\ &= \mathbf{V} \rightarrow \mathbf{V} \\ &= \mathbf{V} \end{aligned}$$

Por tanto, $\mathcal{I}_A((\forall x)(P(x) \rightarrow Q(g(x), a))) = \mathbf{V}$.

Semántica: Evaluación de fórmulas

- Ejemplo: Evaluación de $(\exists x)(P(g(x)) \wedge Q(x, g(a)))$ en la estructura $\mathcal{I} = (U, I)$ respecto de la asignación A tales que $U = \{1, 2\}$, $I(a) = 1$, $I(g) = \{(1, 2), (2, 1)\}$, $I(P) = \{2\}$ e $I(Q) = \{(1, 2), (2, 2)\}$.

$$\mathcal{I}_A((\exists x)(P(g(x)) \wedge Q(x, g(a)))) = \mathbf{V} \Leftrightarrow \mathcal{I}_{A[x/1]}(P(g(x)) \wedge Q(x, g(a))) = \mathbf{V} \text{ ó} \\ \mathcal{I}_{A[x/2]}(P(g(x)) \wedge Q(x, g(a))) = \mathbf{V}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{A[x/1]}(P(g(x)) \wedge Q(x, g(a))) &= P^I(g^I(1)) \wedge Q^I(1, g^I(a^I)) \\ &= P^I(2) \wedge Q^I(1, g^I(1)) \\ &= \mathbf{V} \wedge Q^I(1, 2) \\ &= \mathbf{V} \wedge \mathbf{V} \\ &= \mathbf{V} \end{aligned}$$

Por tanto, $\mathcal{I}_A((\exists x)(P(g(x)) \wedge Q(x, g(a)))) = \mathbf{V}$.

Semántica: Evaluación de fórmulas

- Ejemplo: Evaluación de $(\exists x)(P(x) \wedge Q(x, a))$ en la estructura $\mathcal{I} = (U, I)$ respecto de la asignación A tales que $U = \{1, 2\}$, $I(a) = 1$, $I(g) = \{(1, 2), (2, 1)\}$, $I(P) = \{2\}$ e $I(Q) = \{(1, 2), (2, 2)\}$.

$$\mathcal{I}_A((\exists x)(P(x) \wedge Q(x, a))) = \mathbf{V} \Leftrightarrow \begin{aligned} \mathcal{I}_{A[x/1]}(P(x) \wedge Q(x, a)) &= \mathbf{V} \text{ ó} \\ \mathcal{I}_{A[x/2]}(P(x) \wedge Q(x, a)) &= \mathbf{V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{A[x/1]}(P(x) \wedge Q(x, a)) &= P^I(1) \wedge Q^I(1, a^I) \\ &= \mathbf{F} \wedge Q^I(1, 1) \\ &= \mathbf{F} \wedge \mathbf{V} \\ &= \mathbf{F} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{A[x/2]}(P(x) \wedge Q(x, a)) &= P^I(2) \wedge Q^I(2, a^I) \\ &= \mathbf{V} \wedge Q^I(2, 1) \\ &= \mathbf{V} \wedge \mathbf{F} \\ &= \mathbf{F} \end{aligned}$$

Por tanto, $\mathcal{I}_A((\exists x)(P(x) \wedge Q(x, a))) = \mathbf{F}$.

Semántica: Evaluación de fórmulas

- Ejemplo: Evaluación de $(\forall x)(\exists y)(P(x) \wedge Q(x, y))$ en la estructura $\mathcal{I} = (U, I)$ respecto de la asignación A tales que $U = \{1, 2\}$, $I(a) = 1$, $I(g) = \{(1, 2), (2, 1)\}$, $I(P) = \{2\}$ e $I(Q) = \{(1, 2), (2, 2)\}$.

$$\mathcal{I}_A((\forall x)(\exists y)(P(x) \wedge Q(x, y))) = \mathbf{V} \Leftrightarrow \begin{aligned} \mathcal{I}_{A[x/1]}(\exists y)(P(x) \wedge Q(x, y)) &= \mathbf{V} \text{ y} \\ \mathcal{I}_{A[x/2]}(\exists y)(P(x) \wedge Q(x, y)) &= \mathbf{V} \end{aligned}$$

$$\mathcal{I}_{A[x/1]}(\exists y)(P(x) \wedge Q(x, y)) = \mathbf{V} \Leftrightarrow \begin{aligned} \mathcal{I}_{A[x/1, y/1]}(P(x) \wedge Q(x, y)) &= \mathbf{V} \text{ ó} \\ \mathcal{I}_{A[x/1, y/2]}(P(x) \wedge Q(x, y)) &= \mathbf{V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{A[x/1, y/1]}(P(x) \wedge Q(x, y)) &= P^I(1) \wedge Q^I(1, 1) \\ &= \mathbf{F} \wedge \mathbf{V} \\ &= \mathbf{F} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{A[x/1, y/2]}(P(x) \wedge Q(x, y)) &= P^I(1) \wedge Q^I(1, 2) \\ &= \mathbf{F} \wedge \mathbf{V} \\ &= \mathbf{F} \end{aligned}$$

Luego, $\mathcal{I}_{A[x/1]}(\exists y)(P(x) \wedge Q(x, y)) = \mathbf{F}$

Por tanto, $\mathcal{I}_A((\forall x)(\exists y)(P(x) \wedge Q(x, y))) = \mathbf{V}$.

Semántica: Evaluación de fórmulas

- Ejemplo: Evaluación de $(\forall x)g(x) = x$ en la estructura $\mathcal{I} = (U, I)$ respecto de la asignación A tales que $U = \{1, 2\}$, $I(a) = 1$, $I(g) = \{(1, 2), (2, 1)\}$, $I(P) = \{2\}$ e $I(Q) = \{(1, 2), (2, 2)\}$.

$$\mathcal{I}_A((\forall x)g(x) = x) = \mathbf{V} \Leftrightarrow \mathcal{I}_{A[x/1]}g(x) = x = \mathbf{V} \text{ y } \mathcal{I}_{A[x/2]}g(x) = x = \mathbf{V}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{A[x/1]}(g(x) = x) &= (g^I(1) = 1) \\ &= (2 = 1) \\ &= \mathbf{F} \end{aligned}$$

Por tanto, $\mathcal{I}_A((\forall x)g(x) = x) = \mathbf{F}$.

Semántica: Evaluación de fórmulas

- Ejemplo: Evaluación de $(\forall x)g(g(x)) = x$ en la estructura $\mathcal{I} = (U, I)$ respecto de la asignación A tales que $U = \{1, 2\}$, $I(a) = 1$, $I(g) = \{(1, 2), (2, 1)\}$, $I(P) = \{2\}$ e $I(Q) = \{(1, 2), (2, 2)\}$.

$$\mathcal{I}_A((\forall x)g(g(x)) = x) = \mathbf{V} \Leftrightarrow \mathcal{I}_{A[x/1]}g(g(x)) = x = \mathbf{V} \text{ y } \mathcal{I}_{A[x/2]}g(g(x)) = x = \mathbf{V}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{A[x/1]}(g(g(x)) = x) &= (g^I(g^I(1)) = 1) \\ &= (g^I(2) = 1) \\ &= (1 = 1) \\ &= \mathbf{V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{A[x/2]}(g(g(x)) = x) &= (g^I(g^I(2)) = 2) \\ &= (g^I(1) = 2) \\ &= (2 = 2) \\ &= \mathbf{V} \end{aligned}$$

Por tanto, $\mathcal{I}_A((\forall x)g(g(x)) = x) = \mathbf{V}$.

Semántica: Evaluación de fórmulas

- Ejemplo de dependencia del universo: Sea G la fórmula $(\forall x)(\exists y)R(y, x)$, entonces
 - $\mathcal{I}_A(G) = \mathbf{V}$, siendo $\mathcal{I} = (\mathbb{Z}, I)$, $I(R) = <$ y A una asignación en \mathcal{I} .
 - $\mathcal{I}_A(G) = \mathbf{F}$, siendo $\mathcal{I} = (\mathbb{N}, I)$, $I(R) = <$ y A una asignación en \mathcal{I} .
- Ejemplo de dependencia de la estructura: Sea G la fórmula $(\exists x)(\forall y)R(x, y)$, entonces
 - $\mathcal{I}_A(G) = \mathbf{V}$, siendo $\mathcal{I} = (\mathbb{N}, I)$, $I(R) = \leq$ y A una asignación en \mathcal{I} .
 - $\mathcal{I}_A(G) = \mathbf{F}$, siendo $\mathcal{I} = (\mathbb{N}, I)$, $I(R) = \geq$ y A una asignación en \mathcal{I} .
- Ejemplo de dependencia de la asignación: Sea G la fórmula $(\forall y)R(x, y)$, entonces
 - $\mathcal{I}_A(G) = \mathbf{V}$, siendo $\mathcal{I} = (\mathbb{N}, I)$, $I(R) = \leq$ y A una asignación en \mathcal{I} tal que $A(x) = 0$.
 - $\mathcal{I}_A(G) = \mathbf{F}$, siendo $\mathcal{I} = (\mathbb{N}, I)$, $I(R) = \leq$ y A una asignación en \mathcal{I} tal que $A(x) = 5$.

Semántica: Evaluación de fórmulas

- Evaluación de fórmulas en las estructuras de las páginas 27–28:

| Fórmula | \mathcal{I}_1 | \mathcal{I}_2 | \mathcal{I}_3 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| $(\forall x)0 \leq x$ | V | V | V |
| $(\forall x)x \leq s(x)$ | V | V | F |
| $(\exists x)s(x) = 0$ | F | F | V |
| $(\exists x)s(x) = x$ | F | F | F |

Semántica: Evaluación variables libres

- Evaluación y variables libres:

- Sea t un término de L , F una fórmula de L e \mathcal{I} una estructura de L .
 - Si A y B son dos asignaciones en \mathcal{I} que coinciden sobre las variables de t , entonces $\mathcal{I}_A(t) = \mathcal{I}_B(t)$.
 - Si A y B son dos asignaciones en \mathcal{I} que coinciden sobre las variables libres de F , entonces $\mathcal{I}_A(F) = \mathcal{I}_B(F)$.
 - Si t no tiene variables, entonces $\mathcal{I}_A(F) = \mathcal{I}_B(F)$ para cualesquiera asignaciones A y B en \mathcal{I} . Se suele escribir simplemente $\mathcal{I}(t)$.
 - Si F es cerrada, entonces $\mathcal{I}_A(F) = \mathcal{I}_B(F)$ para cualesquiera asignaciones A y B en \mathcal{I} . Se suele escribir simplemente $\mathcal{I}(F)$.
 - Si las variables libres de F son x_1, \dots, x_n , entonces son equivalentes
 - $\mathcal{I}_A(F) = 1$, para toda asignación A en \mathcal{I} .
 - $\mathcal{I}((\forall x_1) \dots (\forall x_n) F) = 1$.

Semántica: Realización de una fórmula

- Realización de una fórmula:

- Def.: Sean F una fórmula de L , \mathcal{I} una estructura de L y A una asignación en \mathcal{I} .
 - (\mathcal{I}, A) es una realización de F si $\mathcal{I}_A(F) = 1$.
Se representa por $\mathcal{I}_A \models F$.
 - (\mathcal{I}, A) no es una realización de F si $\mathcal{I}_A(F) = 0$.
Se representa por $\mathcal{I}_A \not\models F$.
 - F se verifica en \mathcal{I} respecto de A si $\mathcal{I}_A \models F$.
 - F no se verifica en \mathcal{I} respecto de A si $\mathcal{I}_A \not\models F$.
- Ejemplos: Sea $\mathcal{I} = (\mathbb{N}, I)$ una estructura tal que $I(R) = \leq$.
 - Si A es una asignación en \mathcal{I} tal que $A(x) = 0$, entonces

$$\mathcal{I}_A \models (\forall y)R(x, y),$$
 - Si A es una asignación en \mathcal{I} tal que $A(x) = 5$, entonces

$$\mathcal{I}_A \not\models (\forall y)R(x, y),$$

Semántica: Satisfacibilidad en una estructura

- Satisfacibilidad en una estructura
 - Def.: Sean F una fórmula de L e \mathcal{I} una estructura de L .
 - F es satisfacible en \mathcal{I} si existe alguna asignación A en I tal que $\mathcal{I}_A \models F$.
 - F es insatisfacible en \mathcal{I} si no existe ninguna asignación A en I tal que $\mathcal{I}_A \models F$.
 - Ejemplos: Sea $\mathcal{I} = (\mathbb{N}, I)$ una estructura tal que $I(R) = \leq$.
 - $(\forall y)R(x, y)$ es satisfacible en \mathcal{I} .
 $\mathcal{I}_A \models (\forall y)R(x, y)$, con $A(x) = 0$.
 - $(\forall x)R(x, y)$ es insatisfacible en \mathcal{I} .
 No existe $n \in \mathbb{N}$ tal que para todo $m \in \mathbb{N}$, se tenga $m \leq n$.
 - Ejemplos: Sea $\mathcal{I} = (\mathbb{N}, I)$ una estructura tal que $I(R) = \geq$.
 - $(\forall y)R(x, y)$ es insatisfacible en \mathcal{I} .
 No existe $m \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n \in \mathbb{N}$, se tenga $m \geq n$.
 - $(\forall x)R(x, y)$ es satisfacible en \mathcal{I} .
 $\mathcal{I}_A \models (\forall y)R(x, y)$, con $A(x) = 0$.

Semántica: Validez en una estructura

- Validez en una estructura
 - Def.: Sean F una fórmula de L e \mathcal{I} una estructura de L .
 - F es válida en \mathcal{I} si, para toda asignación A en \mathcal{I} , $\mathcal{I}_A \models F$.
 Se representa por $\mathcal{I} \models F$.
 - F no es válida en \mathcal{I} si, para alguna asignación A en \mathcal{I} , $\mathcal{I}_A \not\models F$.
 Se representa por $\mathcal{I} \not\models F$.
 - Ejemplos: Sea $\mathcal{I} = (\mathbb{N}, I)$ una estructura tal que $I(R) = <$.
 - $\mathcal{I} \models (\exists y)R(x, y)$.
 Si A es una asignación en \mathcal{I} , entonces $\mathcal{I}_A \models (\exists y)R(x, y)$
 $I_{A[y/A(x)+1]}(R(x, y)) = \mathbf{V}$
 - $\mathcal{I} \not\models (\forall y)R(x, y)$.
 Sea A una asignación en \mathcal{I} tal que $A(x) = 5$. Entonces $\mathcal{I}_A \not\models (\forall y)R(x, y)$
 $I_{A[y/3]}(R(x, y)) = \mathbf{F}$

Semántica: Satisfacibilidad y validez en una estructura

- Satisfacibilidad y validez en una estructura para sentencias
 - Sea F una sentencia de L e \mathcal{I} una estructura de L .
 - F es válida en \mathcal{I} syss F es satisfacible en \mathcal{I} .
 - Se cumple una, y sólo una, de las siguientes condiciones
 1. F es válida en \mathcal{I} .
 2. $\neg F$ es válida en \mathcal{I} .
- Cierres cuantificacionales:
 - Sea F una fórmula de L , \mathcal{I} una estructura de L y $\{x_1, \dots, x_n\}$ el conjunto de las variables libres de F .
 - F es válida en \mathcal{I} syss $(\forall x_1) \dots (\forall x_n) F$ es válida en \mathcal{I}
 - F es satisfacible en \mathcal{I} syss $(\exists x_1) \dots (\exists x_n) F$ es satisfacible en \mathcal{I}

Semántica: Modelo de una fórmula

- Modelo de una fórmula:
 - Def.: Sean F una fórmula de L e \mathcal{I} una estructura de L .
 - \mathcal{I} es un modelo de F si $\mathcal{I} \models F$.
 - \mathcal{I} no es un modelo de F si $\mathcal{I} \not\models F$.
 - Ejemplos: Sea $\mathcal{I} = (\mathbb{N}, I)$ una estructura tal que $I(R) = <$. Entonces

$$\mathcal{I} \models (\exists y)R(x, y). \quad \mathcal{I} \not\models (\forall y)R(x, y).$$
 - Ejemplos: Sea F la fórmula $(\forall x)f(x, e) = x$. Las siguientes estructuras son modelos de F .
 - (U, I) con $U = \mathbb{N}$, $I(e) = 0$ e $I(f)$ como la suma.
 - (U, I) con $U = \{0, 1\}^*$, $I(e) = \epsilon$ e $I(f)$ la concatenación.
 - (U, I) con $U = \mathbb{B}$, $I(e) = 1$ e $I(f) = H_\wedge$
 Las siguientes estructuras no son modelo de F
 - (U, I) con $U = \mathbb{N}$, $I(e) = 5$ e $I(f)$ como la suma.
 - (U, I) con $U = \mathbb{N}$, $I(e) = 0$ e $I(f)$ como el producto.

Semántica: Satisfacibilidad de una fórmula

- Satisfacibilidad de una fórmula:

- Def.: Sea F una fórmula de L .

- F es **satisfacible** si tiene alguna realización
(i.e. existe una estructura \mathcal{I} y una asignación A en \mathcal{I} tales que $\mathcal{I}_A(F) = 1$).
 - F es **insatisfacible** si no tiene ninguna realización
(i.e. para toda estructura \mathcal{I} y toda asignación A se tiene que $\mathcal{I}_A(F) = 0$).

- Ejemplos:

- $(\forall y)R(x, y)$ es satisfacible
 $\mathcal{I}_A((\forall y)R(x, y)) = 1$, siendo $\mathcal{I} = (\mathbb{N}, I)$, $I(R) = \leq$ y $A(x) = 0$.
 - $(\exists x)P(x) \wedge (\forall x)\neg P(x)$ es insatisfacible.

Semántica: Satisfacibilidad y modelo

- Propiedades:

- Sea F una fórmula cerrada. Son equivalentes:

- F es satisfacible.
 - F tiene modelo.

- Si F es insatisfacible, entonces no tiene ningún modelo.

- Existen fórmulas satisfacibles que tienen realizaciones, pero no tienen modelos.

Por ejemplo, sea F la fórmula $x \neq y$.

La fórmula F es satisfacible

$$\mathcal{I}_A(F) = 1, \text{ siendo } \mathcal{I} = (\{p, q\}, I), A(x) = p, A(y) = q$$

La fórmula F no tiene modelo

Sea \mathcal{I} una estructura. Existe una asignación A en \mathcal{I} tal que $A(x) = A(y)$.

Luego, $\mathcal{I}_A(F) = 0$ y $\mathcal{I} \not\models F$.

Semántica: Validez de una fórmula

- Validez de una fórmula:

- Def.: Sea F una fórmula de L .

- F es válida si toda estructura de L es modelo de F
(i.e. para toda estructura \mathcal{I} y toda asignación A se tiene que $\mathcal{I}_A(F) = 1$). Se representa por $\models F$.
 - F no es válida si alguna estructura de L no es modelo de F
(i.e. existe alguna estructura \mathcal{I} y alguna asignación A tales que $\mathcal{I}_A(F) = 0$). Se representa por $\not\models F$.

- Ejemplos:

- $(\exists x)P(x) \vee (\forall x)\neg P(x)$ es válida.
 - $(\forall y)R(x, y)$ no es válida.
 $\mathcal{I}_A((\forall y)R(x, y)) = 0$, siendo $\mathcal{I} = (\mathbb{N}, I)$, $I(R) = \leq$ y $A(x) = 5$.
 - $(\exists x)(P(x) \rightarrow (\forall y)P(y))$ es válida.

Semántica: Satisfacibilidad y validez

- Relaciones entre satisfacibilidad y validez:

- Prop.: F es válida syss $\neg F$ es insatisfacible.

F es válida

\iff para toda estructura \mathcal{I} y toda asignación A se tiene que $\mathcal{I}_A(F) = 1$

\iff para toda estructura \mathcal{I} y toda asignación A se tiene que $\mathcal{I}_A(\neg F) = 0$

$\iff \neg F$ es insatisfacible.

- Si F es válida, entonces F es satisfacible.

F es válida

\implies para toda estructura \mathcal{I} y toda asignación A se tiene que $\mathcal{I}_A(F) = 1$

\implies existe una estructura \mathcal{I} y una asignación A tales que $\mathcal{I}_A(F) = 1$

$\implies F$ es satisfacible.

- F es satisfacible $\not\implies \neg F$ es insatisfacible.

$(\forall x)P(x)$ es satisfacible.

modelo $\mathcal{I} = (U, I)$ con $U = \{1, 2\}$ e $I(P) = \{a\}$

$\neg(\forall x)P(x)$ es satisfacible.

modelo $\mathcal{I} = (U, I)$ con $U = \{1, 2\}$ e $I(P) = \{a\}$

Semántica: Realización de un conjunto de fórmulas

- **Notación:**
 - S, S_1, S_2, \dots representarán conjuntos de fórmulas.
- **Realización de un conjunto de fórmulas:**
 - **Def.:** Sean S un conjunto de fórmulas de L , \mathcal{I} una estructura de L y A una asignación en \mathcal{I} .
 - (\mathcal{I}, A) es una realización de S si para toda $F \in S$ se tiene que $\mathcal{I}_A(F) = 1$.
Se representa por $\mathcal{I}_A \models S$.
 - (\mathcal{I}, A) no es una realización de S si para alguna $F \in S$ se tiene que $\mathcal{I}_A(F) = 0$.
Se representa por $\mathcal{I}_A \not\models S$.
 - **Ejemplos:** Sea $S = \{(\forall y)R(x, y), (\forall y)f(x, y) = y\}$.
 - (\mathcal{I}, A) con $\mathcal{I} = (U, I), U = \mathbb{N}, R^I = \leq, f^I = +, A(x) = 0$ es realización de S .
 - (\mathcal{I}, A) con $\mathcal{I} = (U, I), U = \mathbb{N}, R^I = <, f^I = +, A(x) = 0$ no es realización de S .
 - (\mathcal{I}, A) con $\mathcal{I} = (U, I), U = \mathbb{N}, R^I = \leq, f^I = *, A(x) = 0$ no es realización de S .

Semántica: Consistencia de un conjunto de fórmulas

- **Consistencia de un conjunto de fórmulas:**
 - **Def.:** Sea S un conjunto de fórmulas de L .
 - S es consistente si S tiene alguna realización
(i.e. existe alguna estructura \mathcal{I} de L y alguna asignación A en \mathcal{I} tales que, para toda $F \in S$, $\mathcal{I}_A(F) = 1$).
 - S es inconsistente si S no tiene ninguna realización
(i.e. para toda estructura \mathcal{I} de L y toda asignación A en \mathcal{I} , existe alguna $F \in S$, tal que $\mathcal{I}_A(F) = 0$).
 - **Ejemplos:**
 - $S = \{(\forall y)R(x, y), (\forall y)f(x, y) = y\}$ es consistente .
 (\mathcal{I}, A) con $\mathcal{I} = (\mathbb{N}, I), R^I = \leq, f^I = +, A(x) = 0$ es realización de S .
 - $S = \{P(x) \rightarrow Q(x), (\exists y)P(y), \neg Q(x)\}$ es inconsistente.

Semántica: Modelo de un conjunto de fórmulas

• Modelo de un conjunto de fórmulas:

- Def.: Sean S un conjunto de fórmulas de L e \mathcal{I} una estructura de L .
 - \mathcal{I} es un modelo de S si para toda $F \in S$ se tiene que $\mathcal{I} \models F$
(i.e. para toda $F \in S$ y toda asignación A en \mathcal{I} se tiene $\mathcal{I}_A(F) = 1$).
Se representa por $\mathcal{I} \models S$.
 - \mathcal{I} no es un modelo de S si para alguna $F \in S$ se tiene que $\mathcal{I} \not\models F$
(i.e. para alguna $F \in S$ y alguna asignación A en \mathcal{I} se tiene $\mathcal{I}_A(F) = 0$).
Se representa por $\mathcal{I} \not\models S$.
- Ejemplos: Sea $S = \{R(e, y), f(e, y) = y\}$.
 - $\mathcal{I} = (\mathbb{N}, I)$ con $R^I = \leq, f^I = +, e^I = 0$ es modelo de S .
 - $\mathcal{I} = (\mathbb{N}, I)$ con $R^I = <, f^I = +, e^I = 0$ no es modelo de S .
 - $\mathcal{I} = (\mathbb{N}, I)$ con $R^I = \leq, f^I = *, e^I = 0$ no es modelo de S .
 - $\mathcal{I} = (\{0, 1\}^*, I)$ con $R^I = \text{prefijo}, f^I = \text{concatenación y } e^I = \epsilon$ es modelo de S .

Semántica: Consistencia y modelo

• Propiedades:

- Sea S un conjunto de fórmulas cerradas. Son equivalentes:
 - S es consistente.
 - S tiene modelo.
- Si S es inconsistente, entonces no tiene ningún modelo.
- Existen conjuntos de fórmulas consistentes que tienen realizaciones, pero no tienen modelos.

Por ejemplo, sea $S = \{x \neq y\}$.

El conjunto S es consistente

$$\mathcal{I}_A \models S, \text{ siendo } \mathcal{I} = (\{p, q\}, I), A(x) = p, A(y) = q$$

El conjunto S no tiene modelo

Sea \mathcal{I} una estructura. Existe una asignación A en \mathcal{I} tal que $A(x) = A(y)$.
Luego, $\mathcal{I}_A(x \neq y) = 0$ y $\mathcal{I} \not\models S$.

Semántica: Consecuencia lógica

- Consecuencia lógica:

- Def.: Sean F una fórmula de L y S un conjunto de fórmulas de L .
 - F es consecuencia lógica de S si todas las realizaciones de S lo son de F .
(i.e. para toda estructura \mathcal{I} de L y toda asignación A en \mathcal{I} , si $\mathcal{I}_A \models S$ entonces $\mathcal{I}_A \models F$).
(i.e. para toda estructura \mathcal{I} de L y toda asignación A en \mathcal{I} , si, para todo $G \in S$, $\mathcal{I}_A(G) = 1$ entonces $\mathcal{I}_A(F) = 1$).
Se representa por $S \models F$.
 - F no es consecuencia lógica de S si alguna realización de S no lo es de F .
(i.e. para alguna estructura \mathcal{I} de L y alguna asignación A en \mathcal{I} se tiene que $\mathcal{I}_A \models S$ y $\mathcal{I}_A \not\models F$).
(i.e. para alguna estructura \mathcal{I} de L y alguna asignación A en \mathcal{I} se tiene que, para todo $G \in S$, $\mathcal{I}_A(G) = 1$ y $\mathcal{I}_A(F) = 0$).
Se representa por $S \not\models F$.
 - Se escribe $G \models F$ en lugar de $\{G\} \models F$.
 - Se escribe $G \not\models F$ en lugar de $\{G\} \not\models F$.

Semántica: Consecuencia lógica

- Ejemplos:

- $(\forall x)P(x) \models P(y)$
- $P(y) \not\models (\forall x)P(x)$
 (\mathcal{I}, A) con $\mathcal{I} = (U, I), U = \{1, 2\}, P^I = \{1\}, A(y) = 1$.
- $(\forall x)P(x) \models (\exists y)P(y)$
- $(\exists x)P(x) \not\models (\forall y)P(y)$
 $\mathcal{I} = (U, I)$ con $U = \{1, 2\}, P^I = \{1\}$
 $\mathcal{I} = (U, I)$ con $U = \mathbb{N}$ y $P^I = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ es par}\}$
- $(\exists x)(\forall y)Q(x, y) \models (\forall y)(\exists x)Q(x, y)$
- $(\forall y)(\exists x)Q(x, y) \not\models (\exists x)(\forall y)Q(x, y)$
 $\mathcal{I} = (U, I)$ con $U = \{1, 2\}, Q^I = \{(1, 1), (2, 2)\}$
 $\mathcal{I} = (U, I)$ con $U = \mathbb{N}, Q^I = <$

Semántica: Consecuencia lógica

- Ejemplos:

- $\{P(x) \rightarrow Q(x), P(c)\} \models Q(c)$
- $\{P(x) \rightarrow Q(x), Q(c)\} \not\models P(c)$
- $\{P(x) \rightarrow Q(x), \neg Q(c)\} \models \neg P(c)$
- $\{P(c), \neg P(d)\} \models c \neq d$

- Ejemplos: Se consideran las fórmulas

$$F_1 : (\forall x)R(x, x),$$

$$F_2 : (\forall x)(\forall y)(R(x, y) \rightarrow R(y, x)).$$

$$F_3 : (\forall x)(\forall y)(R(x, y) \wedge R(y, x) \rightarrow x = y),$$

- $\{F_2, F_3\} \not\models F_1$

Contraejemplo: $\mathcal{I} = (U, I)$ con $U = \{a, b\}$ y $R^I = \{(a, a)\}$

- $\{F_1, F_2\} \not\models F_3$

Contraejemplo: $\mathcal{I} = (U, I)$ con $U = \{a, b\}$ y $R^I = U^2$

- $\{F_1, F_3\} \models F_2$

Semántica: Consecuencia lógica

- Propiedades:

- $S \models F$ syss $S \cup \{\neg F\}$ es inconsistente.

$$S \models F$$

\iff para toda estructura \mathcal{I} de L y toda asignación A en \mathcal{I} ,
si, para todo $G \in S$, $\mathcal{I}_A(G) = 1$ entonces $\mathcal{I}_A(F) = 1$.

\iff para toda estructura \mathcal{I} de L y toda asignación A en \mathcal{I} ,
si, para todo $G \in S$, $\mathcal{I}_A(G) = 1$ entonces $\mathcal{I}_A(\neg F) = 0$.

\iff para toda estructura \mathcal{I} de L y toda asignación A en \mathcal{I} ,
existe alguna $H \in S \cup \{\neg F\}$ tal que $\mathcal{I}_A(\neg H) = 0$.

$\iff S \cup \{\neg F\}$ es inconsistente.

- Sean F una fórmula cerrada de L y S un conjunto de fórmulas cerradas de L .
Entonces, F es consecuencia lógica de S syss todos los modelos de S lo son de F .

Semántica: Equivalencia lógica

- Equivalencia lógica

- Def.: Sean F y G fórmulas de L . F y G son equivalentes si para toda estructura \mathcal{I} de L y toda asignación A en \mathcal{I} , $\mathcal{I}_A(F) = \mathcal{I}_A(G)$.

Se representa por $F \equiv G$.

- Ejemplos:

- $P(x) \not\equiv P(y)$.

$\mathcal{I} = (\{1, 2\}, I)$ con $P^I = \{1\}$ y $A(x) = 1, A(y) = 2$.

- $(\forall x)P(x) \equiv (\forall y)P(y)$.

- $(\forall x)(P(x) \wedge Q(x)) \equiv (\forall x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x)$.

- $(\exists x)(P(x) \wedge Q(x)) \equiv (\exists x)P(x) \wedge (\exists x)Q(x)$.

$\mathcal{I} = (\{1, 2\}, I)$ con $P^I = \{1\}$ y $Q^I = \{2\}$.

- Propiedades: Sean F y G fórmulas cerradas de L .

- $F \equiv G \text{ syss } \models F \leftrightarrow G$.

- $F \equiv G \text{ syss } F \models G \text{ y } G \models F$.

Bibliografía

- C. Badesa, I. Jané y R. Jansana *Elementos de lógica formal*. (Ariel, 2000) pp. 195–259 y 323–326.
- M.L. Bonet *Apuntes de LPO*. (Univ. Politécnica de Cataluña, 2003) pp. 17–26.
- C.-L. Chang y R.C.-T. Lee *Symbolic logic and mechanical theorem proving* (Academic Press, 1973) pp. 26–35.
- J.L. Fernández, A. Manjarrés y F.J. Díez *Lógica computacional*. (UNED, 2003) pp. 64–87.
- J.H. Gallier *Logic for computer science (foundations of automatic theorem Proving)* (June 2003) pp. 146–186.
- M. Huth y M. Ryan *Logic in computer science: modelling and reasoning about systems*. (Cambridge University Press, 2000) pp. 90–109 y 128–140.
- M. Ojeda e I. Pérez de Guzmán *Lógica para la computación (Vol. 2: Lógica de primer orden)* (Ágora, 1997) pp. 1–37 y 49–51.
- L. Paulson *Logic and proof* (U. Cambridge, 2002) pp. 22–29.

Capítulo 7

Deducción natural en lógica de primer orden

Tema 7: Deducción natural en lógica de primer orden

José A. Alonso Jiménez
Andrés Cordon Franco

Grupo de Lógica Computacional
Dpto. de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Reglas del cuantificador universal

- Regla de eliminación del cuantificador universal

- Regla de **eliminación del cuantificador universal**:

$$\frac{(\forall x)F}{F[x/t]} \forall e$$

donde $[x/t]$ es libre para F .

- Nota: Analogía con $\wedge e_1$ y $\wedge e_2$.

- Ejemplo 1: $P(c), (\forall x)(P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \vdash \neg Q(c)$

| | |
|--|-----------------------|
| 1 : actual y , $P(y)$, $\forall x.(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$ | premisas |
| 2 : $P(y) \rightarrow \neg Q(y)$ | $\forall e$ 1.3,1.1 |
| 3 : $\neg Q(y)$ | $\rightarrow e$ 2,1.2 |

- Nota: $(\forall x)(\exists y)(x < y) \not\vdash (\exists y)(y < y)$.

Reglas del cuantificador universal

- Regla de introducción del cuantificador universal

- Regla de **introducción del cuantificador universal**:

$$\frac{\begin{array}{c} x_0 \\ \vdots \\ F[x/x_0] \end{array}}{(\forall x)F} \forall i$$

donde x_0 es una variable nueva, que no aparece fuera de la caja.

- Nota: Analogía con $\wedge i$.
- Ejemplo 2: $(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x)), (\forall x)P(x) \vdash (\forall x)Q(x)$

| | | | |
|-----|-------------------------------------|------------------|---------------------|
| 1 : | $\forall x.(P(x) \rightarrow Q(x))$ | $\forall x.P(x)$ | premisas |
| 2 : | actual i | | supuesto |
| 3 : | $P(i) \rightarrow Q(i)$ | | $\forall e$ 1.1,2 |
| 4 : | $P(i)$ | | $\forall e$ 1.2,2 |
| 5 : | $Q(i)$ | | $\rightarrow e$ 3,4 |
| 6 : | $\forall x.Q(x)$ | | $\forall i$ 2–5 |

Reglas del cuantificador existencial

- Regla de introducción del cuantificador existencial

- Regla de **introducción del cuantificador existencial**:

$$\frac{F[x/t]}{(\exists x)F} \exists i$$

donde $[x/t]$ es libre para F .

- Nota: Analogía con $\forall i_1$ y $\forall i_2$.
- Ejemplo 3: $(\forall x)P(x) \vdash (\exists x)P(x)$

| | | |
|-----|-------------------------------|---------------------|
| 1 : | actual j , $\forall x.P(x)$ | premisas |
| 2 : | $P(j)$ | $\forall e$ 1.2,1.1 |
| 3 : | $\exists x.P(x)$ | $\exists i$ 2,1.1 |

Reglas del cuantificador existencial

- Regla de eliminación del cuantificador existencial

- Regla de **eliminación del cuantificador existencial**:

$$\frac{(\exists x)F \quad \boxed{\begin{array}{c} x_0 \quad F[x/x_0] \\ \vdots \\ G \end{array}}}{G} \exists e$$

donde x_0 es una variable nueva, que no aparece fuera de la caja.

- Nota: Analogía con $\forall e$.

- Ejemplo 4: $(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x)), (\exists x)P(x) \vdash (\exists x)Q(x)$

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|------------------|-----------------------|
| 1 : | $\forall x.(P(x) \rightarrow Q(x))$ | , | $\exists x.P(x)$ | premisas |
| 2 : | actual i , $P(i)$ | | | supuestos |
| 3 : | $P(i) \rightarrow Q(i)$ | | | $\forall e$ 1.1,2.1 |
| 4 : | $Q(i)$ | | | $\rightarrow e$ 3,2.2 |
| 5 : | $\exists x.Q(x)$ | | | $\exists i$ 4,2.1 |
| 6 : | $\exists x.Q(x)$ | | | $\exists e$ 1.2,2-5 |

Reglas del cuantificador existencial

- Ejemplo 5: $(\forall x)(Q(x) \rightarrow R(x)), (\exists x)(P(x) \wedge Q(x)) \vdash (\exists x)(P(x) \wedge R(x))$

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------|
| 1 : | $\forall x.(Q(x) \rightarrow R(x))$ | , | $\exists x.(P(x) \wedge Q(x))$ | premisas |
| 2 : | actual i , $P(i) \wedge Q(i)$ | | | supuestos |
| 3 : | $Q(i) \rightarrow R(i)$ | | | $\forall e$ 1.1,2.1 |
| 4 : | $Q(i)$ | | | $\wedge e$ 2.2 |
| 5 : | $P(i)$ | | | $\wedge e$ 2.2 |
| 6 : | $R(i)$ | | | $\rightarrow e$ 3,4 |
| 7 : | $P(i) \wedge R(i)$ | | | $\wedge i$ 5,6 |
| 8 : | $\exists x.(P(x) \wedge R(x))$ | | | $\exists i$ 7,2.1 |
| 9 : | $\exists x.(P(x) \wedge R(x))$ | | | $\exists e$ 1.2,2-8 |

Reglas del cuantificador existencial

- Ejemplo 6: $(\exists x)P(x), (\forall x)(\forall y)(P(x) \rightarrow Q(y)) \vdash (\forall y)Q(y)$

| | | |
|---|--|-----------------------|
| 1 : $\exists x.P(x)$, $\forall x.\forall y.(P(x)\rightarrow Q(y))$ | | premisas |
| 2 : actual i | | supuesto |
| 3 : actual $i1$, $P(i1)$ | | supuestos |
| 4 : $\forall y.(P(i1)\rightarrow Q(y))$ | | $\forall e$ 1.2,3.1 |
| 5 : $P(i1)\rightarrow Q(i)$ | | $\forall e$ 4,2 |
| 6 : $Q(i)$ | | $\rightarrow e$ 5,3.2 |
| 7 : $Q(i)$ | | $\exists e$ 1.1,3–6 |
| 8 : $\forall y.Q(y)$ | | $\forall i$ 2–7 |

Equivalencias

- **Equivalencias:**

- Sean F y G fórmulas.

$$[1(a)] \quad \neg(\forall x)F \equiv (\exists x)\neg F$$

$$[1(b)] \quad \neg(\exists x)F \equiv (\forall x)\neg F$$

- Sean F y G fórmulas y x una variable no libre en G .

$$[2(a)] \quad (\forall x)F \wedge G \equiv (\forall x)(F \wedge G)$$

$$[2(b)] \quad (\forall x)F \vee G \equiv (\forall x)(F \vee G)$$

$$[2(c)] \quad (\exists x)F \wedge G \equiv (\exists x)(F \wedge G)$$

$$[2(d)] \quad (\exists x)F \vee G \equiv (\exists x)(F \vee G)$$

Equivalencias

- Sean F y G fórmulas.

$$[3(a)] (\forall x)F \wedge (\forall x)G \equiv (\forall x)(F \wedge G)$$

$$[3(b)] (\exists x)F \vee (\exists x)G \equiv (\exists x)(F \vee G)$$

- Sean F y G fórmulas.

$$[4(a)] (\forall x)(\forall y)F \equiv (\forall y)(\forall x)F$$

$$[4(b)] (\exists x)(\exists y)F \equiv (\exists y)(\exists x)F$$

Equivalencias

- Equivalencia 1(a): $\neg(\forall x)F \vdash (\exists x)\neg F$

| | | |
|------|---------------------------|-----------------|
| 1 : | $\neg\forall x.P(x)$ | premise |
| 2 : | $\neg\exists x.\neg P(x)$ | supuesto |
| 3 : | actual i | supuesto |
| 4 : | $\neg P(i)$ | supuesto |
| 5 : | $\exists x.\neg P(x)$ | $\exists i$ 4,3 |
| 6 : | \perp | $\neg e$ 5,2 |
| 7 : | $P(i)$ | RAA 4-6 |
| 8 : | $\forall x.P(x)$ | $\forall i$ 3-7 |
| 9 : | \perp | $\neg e$ 8,1 |
| 10 : | $\exists x.\neg P(x)$ | RAA 2-9 |

Equivalencias

- Equivalencia 1(a): $(\exists x)\neg F \vdash \neg(\forall x)F$

| | | |
|-----|--------------------------|-------------------|
| 1 : | $\exists x.\neg P(x)$ | premisa |
| 2 : | $\neg\neg\forall x.P(x)$ | supuesto |
| 3 : | $\forall x.P(x)$ | $\neg\neg$ e 2 |
| 4 : | actual i , $\neg P(i)$ | supuestos |
| 5 : | $P(i)$ | \forall e 3,4.1 |
| 6 : | \perp | \neg e 5,4.2 |
| 7 : | \perp | \exists e 1,4–6 |
| 8 : | $\neg\forall x.P(x)$ | RAA 2–7 |

Equivalencias

- Equivalencia 1(a): $\neg(\forall x)F \equiv (\exists x)\neg F$

| | | |
|-----|--|--|
| 1 : | $\neg\forall x.P(x)$ | supuesto |
| 2 : | $\exists x.\neg P(x)$ | Conjecture $\neg\forall x.P(x) \vdash \exists x.\neg P(x)$ 1 |
| 3 : | $\neg\forall x.P(x) \rightarrow \exists x.\neg P(x)$ | \rightarrow i 1–2 |
| 4 : | $\exists x.\neg P(x)$ | supuesto |
| 5 : | $\neg\forall x.P(x)$ | Theorem $\exists x.\neg P(x) \vdash \neg\forall x.P(x)$ 4 |
| 6 : | $\exists x.\neg P(x) \rightarrow \neg\forall x.P(x)$ | \rightarrow i 4–5 |
| 7 : | $\neg\forall x.P(x) \leftrightarrow \exists x.\neg P(x)$ | \leftrightarrow i 3,6 |

Equivalencias

- Equivalencia 3(a): $(\forall x)(F \wedge G) \vdash (\forall x)F \wedge (\forall x)G$

| | | |
|------|--|-----------------|
| 1 : | $\forall x.(P(x) \wedge Q(x))$ | premisa |
| 2 : | actual i1 | supuesto |
| 3 : | $P(i1) \wedge Q(i1)$ | $\forall e$ 1,2 |
| 4 : | $P(i1)$ | $\wedge e$ 1 3 |
| 5 : | $\forall x.P(x)$ | $\forall i$ 2–4 |
| 6 : | actual i | supuesto |
| 7 : | $P(i) \wedge Q(i)$ | $\forall e$ 1,6 |
| 8 : | $Q(i)$ | $\wedge e$ 2 7 |
| 9 : | $\forall x.Q(x)$ | $\forall i$ 6–8 |
| 10 : | $\forall x.P(x) \wedge \forall x.Q(x)$ | $\wedge i$ 5,9 |

Equivalencias

- Equivalencia 3(a): $(\forall x)F \wedge (\forall x)G \vdash (\forall x)(F \wedge G)$

| | | |
|-----|--|-----------------|
| 1 : | $\forall x.P(x) \wedge \forall x.Q(x)$ | premisa |
| 2 : | actual i | supuesto |
| 3 : | $\forall x.P(x)$ | $\wedge e$ 1 |
| 4 : | $P(i)$ | $\forall e$ 3,2 |
| 5 : | $\forall x.Q(x)$ | $\wedge e$ 1 |
| 6 : | $Q(i)$ | $\forall e$ 5,2 |
| 7 : | $P(i) \wedge Q(i)$ | $\wedge i$ 4,6 |
| 8 : | $\forall x.(P(x) \wedge Q(x))$ | $\forall i$ 2–7 |

Equivalencias

- Equivalencia 3(a): $(\forall x)(F \wedge G) \equiv (\forall x)F \wedge (\forall x)G$

| | |
|---|--|
| 1 : $\forall x.(P(x) \wedge Q(x))$ | supuesto |
| 2 : $\forall x.P(x) \wedge \forall x.Q(x)$ | Theorem $\forall x.(P(x) \wedge Q(x)) \vdash \forall x.P(x) \wedge \forall x.Q(x)$ 1 |
| 3 : $\forall x.(P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \forall x.P(x) \wedge \forall x.Q(x)$ | \rightarrow i 1–2 |
| 4 : $\forall x.P(x) \wedge \forall x.Q(x)$ | supuesto |
| 5 : $\forall x.(P(x) \wedge Q(x))$ | Theorem $\forall x.P(x) \wedge \forall x.Q(x) \vdash \forall x.(P(x) \wedge Q(x))$ 4 |
| 6 : $\forall x.P(x) \wedge \forall x.Q(x) \rightarrow \forall x.(P(x) \wedge Q(x))$ | \rightarrow i 4–5 |
| 7 : $\forall x.(P(x) \wedge Q(x)) \leftrightarrow \forall x.P(x) \wedge \forall x.Q(x)$ | \leftrightarrow i 3,6 |

Equivalencias

- Equivalencia 3(b): $(\exists x)F \vee (\exists x)G \vdash (\exists x)(F \vee G)$

| | |
|--|---------------------|
| 1 : $\exists x.P(x) \vee \exists x.Q(x)$ | premisa |
| 2 : $\exists x.P(x)$ | supuesto |
| 3 : actual i, P(i) | supuestos |
| 4 : P(i) \vee Q(i) | \vee i1 3.2 |
| 5 : $\exists x.(P(x) \vee Q(x))$ | \exists i 4,3.1 |
| 6 : $\exists x.(P(x) \vee Q(x))$ | \exists e 2,3–5 |
| 7 : $\exists x.Q(x)$ | supuesto |
| 8 : actual i1, Q(i1) | supuestos |
| 9 : P(i1) \vee Q(i1) | \vee i2 8.2 |
| 10 : $\exists x.(P(x) \vee Q(x))$ | \exists i 9,8.1 |
| 11 : $\exists x.(P(x) \vee Q(x))$ | \exists e 7,8–10 |
| 12 : $\exists x.(P(x) \vee Q(x))$ | \vee e 1,2–6,7–11 |

Equivalencias

- Equivalencia 3(b): $(\exists x)(F \vee G) \vdash (\exists x)F \vee (\exists x)G$

| | | |
|------|--------------------------------------|-------------------|
| 1 : | $\exists x.(P(x) \vee Q(x))$ | premisa |
| 2 : | actual i , $P(i) \vee Q(i)$ | supuestos |
| 3 : | $P(i)$ | supuesto |
| 4 : | $\exists x.P(x)$ | $\exists i$ 3,2.1 |
| 5 : | $\exists x.P(x) \vee \exists x.Q(x)$ | \vee intro 4 |
| 6 : | $Q(i)$ | supuesto |
| 7 : | $\exists x.Q(x)$ | $\exists i$ 6,2.1 |
| 8 : | $\exists x.P(x) \vee \exists x.Q(x)$ | \vee intro 7 |
| 9 : | $\exists x.P(x) \vee \exists x.Q(x)$ | Ve 2.2,3–5,6–8 |
| 10 : | $\exists x.P(x) \vee \exists x.Q(x)$ | $\exists e$ 1,2–9 |

Equivalencias

- Equivalencia 3(b): $(\exists x)F \vee (\exists x)G \equiv (\exists x)(F \vee G)$

| | | |
|-----|---|---|
| 1 : | $\exists x.P(x) \vee \exists x.Q(x)$ | supuesto |
| 2 : | $\exists x.(P(x) \vee Q(x))$ | Theorem $\exists x.P(x) \vee \exists x.Q(x) \vdash \exists x.(P(x) \vee Q(x))$ 1 |
| 3 : | $\exists x.P(x) \vee \exists x.Q(x) \rightarrow \exists x.(P(x) \vee Q(x))$ | $\rightarrow i$ 1–2 |
| 4 : | $\exists x.(P(x) \vee Q(x))$ | supuesto |
| 5 : | $\exists x.P(x) \vee \exists x.Q(x)$ | Conjecture $\exists x.(P(x) \vee Q(x)) \vdash \exists x.P(x) \vee \exists x.Q(x)$ 4 |
| 6 : | $\exists x.(P(x) \vee Q(x)) \rightarrow \exists x.P(x) \vee \exists x.Q(x)$ | $\rightarrow i$ 4–5 |
| 7 : | $\exists x.P(x) \vee \exists x.Q(x) \leftrightarrow \exists x.(P(x) \vee Q(x))$ | $\leftrightarrow i$ 3,6 |

Equivalencias

- Equivalencia 4(b): $(\exists x)(\exists y)F \vdash (\exists y)(\exists x)F$

| | | |
|-----|---------------------------------|---------------------|
| 1 : | $\exists x.\exists y.P(x,y)$ | premise |
| 2 : | actual i , $\exists y.P(i,y)$ | supuestos |
| 3 : | actual $i1$, $P(i,i1)$ | supuestos |
| 4 : | $\exists x.P(x,i1)$ | $\exists i$ 3.2,2.1 |
| 5 : | $\exists y.\exists x.P(x,y)$ | $\exists i$ 4,3.1 |
| 6 : | $\exists y.\exists x.P(x,y)$ | $\exists e$ 2.2,3–5 |
| 7 : | $\exists y.\exists x.P(x,y)$ | $\exists e$ 1,2–6 |

Equivalencias

- Equivalencia 4(b): $(\exists x)(\exists y)F \equiv (\exists y)(\exists x)F$

| | | |
|-----|---|---|
| 1 : | $\exists x.\exists y.P(x,y)$ | supuesto |
| 2 : | $\exists y.\exists x.P(x,y)$ | Conjecture $\exists x.\exists y.P(x,y) \vdash \exists y.\exists x.P(x,y)$ 1 |
| 3 : | $\exists x.\exists y.P(x,y) \rightarrow \exists y.\exists x.P(x,y)$ | $\rightarrow i$ 1–2 |
| 4 : | $\exists y.\exists x.P(x,y)$ | supuesto |
| 5 : | $\exists x.\exists y.P(x,y)$ | Conjecture $\exists x.\exists y.P(x,y) \vdash \exists y.\exists x.P(x,y)$ 4 |
| 6 : | $\exists y.\exists x.P(x,y) \rightarrow \exists x.\exists y.P(x,y)$ | $\rightarrow i$ 4–5 |
| 7 : | $\exists x.\exists y.P(x,y) \leftrightarrow \exists y.\exists x.P(x,y)$ | $\leftrightarrow i$ 3,6 |

Reglas de la igualdad

- Regla de **eliminación de la igualdad**:

$$\frac{t_1 = t_2 \quad F[x/t_1]}{F[x/t_2]} = e$$

donde $[x/t_1]$ y $[x/t_2]$ son libres para F .

- Ejemplo:

- 1 $(x + 1) = (1 + x)$ premisa
- 2 $(x + 1 > 1) \rightarrow (x + 1 > 0)$ premisa
- 3 $(1 + x > 1) \rightarrow (1 + x > 0)$ =e 1,2

- Ejemplo: $t_1 = t_2, t_2 = t_3 \vdash t_1 = t_3$

- 1 $t_1 = t_2$ premisa
- 2 $t_2 = t_3$ premisa
- 3 $t_1 = t_3$ =e 2,1

Reglas de la igualdad

- Regla de **introducción de la igualdad**:

$$\overline{t = t} = i$$

- Ejemplo: $t_1 = t_2 \vdash t_2 = t_1$

- 1 $t_1 = t_2$ premisa
- 2 $t_1 = t_1$ =i
- 3 $t_2 = t_1$ =e 1,2

Bibliografía

- C. Badesa, I. Jané y R. Jansana *Elementos de lógica formal*. (Ariel, 2000) pp. 259–287.
- R. Bornat *Using ItL Jape with X* (Department of Computer Science, QMW, 1998)
- J. Dingel *Propositional and predicate logic: a review*. (2000) pp. 28–33.
- J.L. Fernández, A. Manjarrés y F.J. Díez *Lógica computacional*. (UNED, 2003) pp. 88–94.
- M. Huth y M. Ryan *Logic in computer science: modelling and reasoning about systems*. (Cambridge University Press, 2000) pp. 109-127.

Capítulo 8

Formas normales. Cláusulas

Tema 8: Formas normales. Cláusulas

José A. Alonso Jiménez
Andrés Cordón Franco

Grupo de Lógica Computacional
Dpto. de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Equivalencias

- **Equivalencia lógica**
 - Prop.: $F \equiv G$ syss $\models F \leftrightarrow G$.
- **Propiedades básicas de la equivalencia lógica:**
 - Reflexiva: $F \equiv F$
 - Simétrica: Si $F \equiv G$, entonces $G \equiv F$
 - Transitiva: Si $F \equiv G$ y $G \equiv H$, entonces $F \equiv H$
- **Principio de sustitución de fórmulas equivalentes:**
 - Prop.: Si en la fórmula F se sustituye una de sus subfórmulas G por una fórmula G' lógicamente equivalente a G , entonces la fórmula obtenida, F' , es lógicamente equivalente a F .
 - Ejemplo:

$$\begin{aligned} F &= (\forall x)P(x) \rightarrow (\exists x)Q(x) \\ G &= (\forall x)P(x) \\ G' &= (\forall y)P(y) \\ F' &= (\forall y)P(y) \rightarrow (\exists x)Q(x) \end{aligned}$$

Forma rectificada

- **Fórmula en forma rectificada:**

- Def.: F está en forma rectificada si ninguna variable aparece libre y ligada y cada cuantificador se refiere a una variable diferente.

- Ejemplos: $(\forall x)P(x) \rightarrow (\forall y)Q(z, y)$ está en forma rectificada
 $(\forall x)P(x) \rightarrow (\forall y)Q(x, y)$ no está en forma rectificada
 $(\forall x)P(x) \rightarrow (\forall x)Q(z, x)$ no está en forma rectificada

- Prop.: Para toda fórmula F existe una fórmula equivalente G en forma rectificada.

- Lema del renombramiento: Si y no aparece libre en F , entonces

$$(\forall x)F \equiv (\forall y)F[x/y]$$

$$(\exists x)F \equiv (\exists y)F[x/y].$$

- Ejemplos de rectificación:

$$(\forall x)P(x) \rightarrow (\forall x)Q(z, x) \equiv (\forall x)P(x) \rightarrow (\forall u)Q(z, u)$$

$$(\forall x)P(x) \rightarrow (\forall y)Q(x, y) \equiv (\forall z)P(z) \rightarrow (\forall y)Q(x, y)$$

Forma normal prenexa

- **Fórmula en forma normal prenexa**

- Def.: La fórmula F está en forma normal prenexa (FNP) si es de la forma $(Q_1x_1) \dots (Q_nx_n)G$, donde $Q_i \in \{\forall, \exists\}$, $n \geq 0$ y G no tiene cuantificadores.

$(Q_1x_1) \dots (Q_nx_n)$ se llama el **prefijo** de F y G se llama la **matriz** de F .

- Ejemplos:

| Fórmula | ¿está en FNP? |
|---|---------------|
| $\neg(\exists x)[P(x) \rightarrow (\forall x)P(x)]$ | no |
| $(\forall x)(\exists y)[P(x) \wedge \neg P(y)]$ | sí |
| $(\forall x)P(x) \vee (\exists y)Q(y)$ | no |
| $(\forall x)(\exists y)[P(x) \vee Q(y)]$ | sí |
| $(\exists y)(\forall x)[P(x) \vee Q(y)]$ | sí |
| $\neg((\forall x)[P(x) \rightarrow Q(x)] \wedge (\forall x)[Q(x) \rightarrow R(x)] \rightarrow (\forall x)[P(x) \rightarrow R(x)])$ | no |
| $(\exists z)(\forall x)(\forall y)[((\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge (\neg Q(y) \vee R(y))) \wedge (P(z) \wedge \neg R(z))]$ | sí |

Forma normal prenexa: Cálculo de forma normal prenexa

- Algoritmo de cálculo de forma normal prenexa:

- Algoritmo: Aplicando a una fórmula los siguientes pasos se obtiene otra fórmula equivalente y que está en forma normal prenexa rectificada:

1. Rectificar la fórmula usando las equivalencias

$$(\forall x)F \equiv (\forall y)F[x/y] \quad (1)$$

$$(\exists x)F \equiv (\exists y)F[x/y] \quad (2)$$

donde y es una variable que no ocurre libre en F .

2. Eliminar los bicondicionales usando la equivalencia

$$F \leftrightarrow G \equiv (F \rightarrow G) \wedge (G \rightarrow F) \quad (3)$$

3. Eliminar los condicionales usando la equivalencia

$$F \rightarrow G \equiv \neg F \vee G \quad (4)$$

Forma normal prenexa: Cálculo de forma normal prenexa

- Algoritmo (cont.)

4. Interiorizar las negaciones usando las equivalencias

$$\neg(F \wedge G) \equiv \neg F \vee \neg G \quad (5)$$

$$\neg(F \vee G) \equiv \neg F \wedge \neg G \quad (6)$$

$$\neg\neg F \equiv F \quad (7)$$

$$\neg(\forall x)F \equiv (\exists x)\neg F \quad (8)$$

$$\neg(\exists x)F \equiv (\forall x)\neg F \quad (9)$$

5. Exteriorizar los cuantificadores usando las equivalencias

$$(\forall x)F \wedge G \equiv (\forall x)(F \wedge G) \quad \text{con } x \text{ no libre en } G. \quad (11)$$

$$(\forall x)F \vee G \equiv (\forall x)(F \vee G) \quad \text{con } x \text{ no libre en } G. \quad (12)$$

$$(\exists x)F \wedge G \equiv (\exists x)(F \wedge G) \quad \text{con } x \text{ no libre en } G. \quad (13)$$

$$(\exists x)F \vee G \equiv (\exists x)(F \vee G) \quad \text{con } x \text{ no libre en } G. \quad (14)$$

$$G \wedge (\forall x)F \equiv (\forall x)(G \wedge F) \quad \text{con } x \text{ no libre en } G. \quad (15)$$

$$G \vee (\forall x)F \equiv (\forall x)(G \vee F) \quad \text{con } x \text{ no libre en } G. \quad (16)$$

$$G \wedge (\exists x)F \equiv (\exists x)(G \wedge F) \quad \text{con } x \text{ no libre en } G. \quad (17)$$

$$G \vee (\exists x)F \equiv (\exists x)(G \vee F) \quad \text{con } x \text{ no libre en } G. \quad (18)$$

Forma normal prenexa: Cálculo de forma normal prenexa

- Ejemplo de cálculo de una forma normal prenexa de

$$\begin{aligned}
 & \neg(\exists x)[P(x) \rightarrow (\forall x)P(x)] \\
 \equiv & \neg(\exists x)[P(x) \rightarrow (\forall y)P(y)] && [\text{por (1)}] \\
 \equiv & \neg(\exists x)[\neg P(x) \vee (\forall y)P(y)] && [\text{por (4)}] \\
 \equiv & (\forall x)[\neg(\neg P(x) \vee (\forall y)P(y))] && [\text{por (9)}] \\
 \equiv & (\forall x)[\neg\neg P(x) \wedge \neg(\forall y)P(y)] && [\text{por (6)}] \\
 \equiv & (\forall x)[P(x) \wedge (\exists y)\neg P(y)] && [\text{por (7 y 8)}] \\
 \equiv & (\forall x)(\exists y)[P(x) \wedge \neg P(y)] && [\text{por (17)}]
 \end{aligned}$$

- Ejemplo de cálculo de una forma normal prenexa de

$$\begin{aligned}
 & (\forall x)P(x) \vee (\exists y)Q(y) \\
 \equiv & (\forall x)[P(x) \vee (\exists y)Q(y)] && [\text{por (12)}] \\
 \equiv & (\forall x)(\exists y)[P(x) \vee Q(y)] && [\text{por (18)}]
 \end{aligned}$$

- Ejemplo de cálculo de otra forma normal prenexa de

$$\begin{aligned}
 & (\forall x)P(x) \vee (\exists y)Q(y) \\
 \equiv & (\exists y)[(\forall x)P(x) \vee Q(y)] && [\text{por (18)}] \\
 \equiv & (\exists y)(\forall x)[P(x) \vee Q(y)] && [\text{por (12)}]
 \end{aligned}$$

Forma normal prenexa: Cálculo de forma normal prenexa

- Ejemplo de cálculo de una forma normal prenexa de

$$\begin{aligned}
 & \neg((\forall x)[P(x) \rightarrow Q(x)] \wedge (\forall x)[Q(x) \rightarrow R(x)] \rightarrow (\forall x)[P(x) \rightarrow R(x)]) \\
 \equiv & \neg((\forall x)[P(x) \rightarrow Q(x)] \wedge (\forall y)[Q(y) \rightarrow R(y)] \rightarrow (\forall z)[P(z) \rightarrow R(z)]) && [\text{por (1)}] \\
 \equiv & \neg(\neg((\forall x)[\neg P(x) \vee Q(x)] \wedge (\forall y)[\neg Q(y) \vee R(y)]) \vee (\forall z)[\neg P(z) \vee R(z)]) && [\text{por (4)}] \\
 \equiv & \neg\neg((\forall x)[\neg P(x) \vee Q(x)] \wedge (\forall y)[\neg Q(y) \vee R(y)]) \wedge \neg(\forall z)[\neg P(z) \vee R(z)] && [\text{por (6)}] \\
 \equiv & ((\forall x)[\neg P(x) \vee Q(x)] \wedge (\forall y)[\neg Q(y) \vee R(y)]) \wedge (\exists z)[\neg(\neg P(z) \vee R(z))] && [\text{por (7, 8)}] \\
 \equiv & ((\forall x)[\neg P(x) \vee Q(x)] \wedge (\forall y)[\neg Q(y) \vee R(y)]) \wedge (\exists z)[\neg\neg P(z) \wedge \neg R(z)] && [\text{por (6)}] \\
 \equiv & ((\forall x)[\neg P(x) \vee Q(x)] \wedge (\forall y)[\neg Q(y) \vee R(y)]) \wedge (\exists z)[P(z) \wedge \neg R(z)] && [\text{por (7)}] \\
 \equiv & (\exists z)[((\forall x)[\neg P(x) \vee Q(x)] \wedge (\forall y)[\neg Q(y) \vee R(y)]) \wedge (P(z) \wedge \neg R(z))] && [\text{por (17)}] \\
 \equiv & (\exists z)[(\forall x)[(\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge (\forall y)[\neg Q(y) \vee R(y)]] \wedge (P(z) \wedge \neg R(z))] && [\text{por (11)}] \\
 \equiv & (\exists z)(\forall x)[((\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge (\forall y)[\neg Q(y) \vee R(y)]) \wedge (P(z) \wedge \neg R(z))] && [\text{por (11)}] \\
 \equiv & (\exists z)(\forall x)[(\forall y)[(\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge (\neg Q(y) \vee R(y))] \wedge (P(z) \wedge \neg R(z))] && [\text{por (15)}] \\
 \equiv & (\exists z)(\forall x)(\forall y)[((\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge (\neg Q(y) \vee R(y))) \wedge (P(z) \wedge \neg R(z))] && [\text{por (11)}]
 \end{aligned}$$

Forma normal prenexa conjuntiva

- **Fórmula en forma normal prenexa conjuntiva**
 - Def.: La fórmula F está en forma normal prenexa conjuntiva (FNPC) si es de la forma $(Q_1x_1) \dots (Q_nx_n)G$, donde $Q_i \in \{\forall, \exists\}$, $n \geq 0$, G no tiene cuantificadores y G está en forma normal conjuntiva.
- **Algoritmo de cálculo de forma normal prenexa conjuntiva:**
 - Algoritmo: Aplicando a una fórmula los siguientes pasos se obtiene otra fórmula equivalente y que está en forma normal prenexa conjuntiva rectificada:
 1. Calcular una forma normal prenexa rectificada usando las equivalencias (1)–(18)
 2. Interiorizar las disyunciones usando las equivalencias

$$A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C) \quad (19)$$

$$(A \wedge B) \vee C \equiv (A \vee C) \wedge (B \vee C) \quad (20)$$
 - Ejemplo de cálculo de una FNPC de $(\forall x)(\exists y)[P(x) \vee (Q(y) \wedge \neg R(y))]$:

$$\begin{aligned} & (\forall x)(\exists y)[P(x) \vee (Q(y) \wedge \neg R(y))] \\ \equiv & (\forall x)(\exists y)[(P(x) \vee Q(y)) \wedge (P(x) \vee \neg R(y))] \quad [\text{por (19)}] \end{aligned}$$

Forma de Skolem

- **Forma de Skolem:**
 - Def.: La fórmula F está en forma de Skolem (FS) si es de la forma $(\forall x_1) \dots (\forall x_n)G$, donde $n \geq 0$ y G no tiene cuantificadores.
 - Ejemplos:

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| $(\forall x)(\exists y)P(x, y)$ | no está en forma de Skolem |
| $(\forall x)P(x, f(x))$ | sí está en forma de Skolem |
| $(\exists x)Q(x)$ | no está en forma de Skolem |
| $Q(a)$ | sí está en forma de Skolem |
- **Equisatisfacibilidad:**
 - Def.: Las fórmulas F y G son equisatisfacible si:

$$F \text{ es satisfacible syss } G \text{ es satisfacible.}$$
 Se representa por $F \equiv_{sat} G$
 - Ejemplos:

| | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|
| $(\exists x)Q(x)$ | \equiv_{sat} | $Q(a)$ |
| $(\exists x)Q(x)$ | $\not\equiv$ | $Q(a)$ |
| $(\forall x)(\exists y)P(x, y)$ | \equiv_{sat} | $(\forall x)P(x, f(x))$ |
| $(\forall x)(\exists y)P(x, y)$ | $\not\equiv$ | $(\forall x)P(x, f(x))$ |

Forma de Skolem

- Propiedades:

- Si a es una constante que no ocurre en F , entonces $(\exists x)F \equiv_{sat} F[x/a]$.
- Si g es un símbolo de función n -aria que no ocurre en F , entonces $(\forall x_1) \dots (\forall x_n)(\exists x)F \equiv_{sat} (\forall x_1) \dots (\forall x_n)F[x/g(x_1, \dots, x_n)]$.

- Algoritmo de cálculo de forma de Skolem:

- Algoritmo: Sea F una fórmula en forma normal prenexa rectificadas, la forma de Skolem de F es

$$\text{Sko}(F) = \begin{cases} \text{Sko}(G[x/a]), & \text{si } F \text{ es } (\exists x)G \text{ y } a \text{ es una nueva constante} \\ & \text{que no ocurre en } F \text{ (constante de Skolem);} \\ \text{Sko}(G[x/f(x_1, \dots, x_n)]), & \text{si } F \text{ es } (\forall x_1) \dots (\forall x_n)(\exists x)G \text{ y } f \text{ es un símbolo} \\ & \text{de función } n\text{-aria que no ocurre en } F \\ & \text{(función de Skolem);} \\ F, & \text{si } F \text{ está en forma de Skolem} \end{cases}$$

- Propiedad: Si F es una fórmula en forma normal prenexa rectificadas, entonces $\text{Sko}(F)$ está en forma de Skolem y $\text{Sko}(F) \equiv_{sat} F$.

Forma de Skolem: Cálculo de forma de Skolem

- Ejemplos de cálculo de forma de Skolem:

- Ejemplo 1:

$$\begin{aligned} & \text{Sko}((\exists x)(\forall y)(\forall z)(\exists u)(\forall v)(\exists w)P(x, y, z, u, v, w)) \\ &= \text{Sko}((\forall y)(\forall z)(\exists u)(\forall v)(\exists w)P(a, y, z, u, v, w)) \\ &= \text{Sko}((\forall y)(\forall z)(\forall v)(\exists w)P(a, y, z, f(y, z), v, w)) \\ &= \text{Sko}((\forall y)(\forall z)(\forall v)P(a, y, z, f(y, z), v, g(y, z, v))) \\ &= (\forall y)(\forall z)(\forall v)P(a, y, z, f(y, z), v, g(y, z, v)) \end{aligned}$$

- Ejemplo 2:

$$\begin{aligned} & \text{Sko}((\forall x)(\exists y)(\forall z)(\exists w)[\neg P(a, w) \vee Q(f(x), y)]) \\ &= \text{Sko}((\forall x)(\forall z)(\exists w)[\neg P(a, w) \vee Q(f(x), h(x))]) \\ &= \text{Sko}((\forall x)(\forall z)[\neg P(a, g(x, z)) \vee Q(f(x), h(x))]) \\ &= (\forall x)(\forall z)[\neg P(a, g(x, z)) \vee Q(f(x), h(x))] \end{aligned}$$

Forma de Skolem: Cálculo de forma de Skolem

- Ejemplo de cálculo de una forma de Skolem de

$$\begin{aligned} & \neg(\exists x)[P(x) \rightarrow (\forall x)P(x)] \\ \equiv & (\forall x)(\exists y)[P(x) \wedge \neg P(y)] \quad [\text{por página ??}] \\ \equiv_{sat} & (\forall x)[P(x) \wedge \neg P(f(x))] \end{aligned}$$

- Ejemplo de cálculo de una forma de Skolem de

$$\begin{aligned} & (\forall x)P(x) \vee (\exists y)Q(y) \\ \equiv & (\forall x)(\exists y)[P(x) \vee Q(y)] \quad [\text{por página ??}] \\ \equiv_{sat} & (\forall x)[P(x) \vee Q(f(x))] \end{aligned}$$

- Ejemplo de cálculo de otra forma de Skolem de

$$\begin{aligned} & (\forall x)P(x) \vee (\exists y)Q(y) \\ \equiv & (\exists y)(\forall x)[P(x) \vee Q(y)] \quad [\text{por página ??}] \\ \equiv_{sat} & (\forall x)[P(x) \vee Q(a)] \end{aligned}$$

- Ejemplo de cálculo de una forma de Skolem de

$$\begin{aligned} & \neg((\forall x)[P(x) \rightarrow Q(x)] \wedge (\forall x)[Q(x) \rightarrow R(x)] \rightarrow (\forall x)[P(x) \rightarrow R(x)]) \\ \equiv & (\exists z)(\forall x)(\forall y)[((\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge (\neg Q(y) \vee R(y))) \wedge (P(z) \wedge \neg R(z))] \quad [\text{por p. ??}] \\ \equiv_{sat} & (\forall x)(\forall y)[((\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge (\neg Q(y) \vee R(y))) \wedge (P(a) \wedge \neg R(a))] \end{aligned}$$

Lógica clausal: sintaxis

- Sintaxis de la lógica clausal

- Un **átomo** es una fórmula atómica.

Variables sobre átomos: $A, B, C, \dots, A_1, A_2, \dots$

- Un **literal** es un átomo (A) o la negación de un átomo ($\neg A$).

Variables sobre literales: L, L_1, L_2, \dots

- Una **cláusula** es un conjunto finito de literales.

Variables sobre cláusulas: C, C_1, C_2, \dots

- La **cláusula vacía** es el conjunto vacío de literales.

La cláusula vacía se representa por \square .

- Conjuntos finitos de cláusulas.

Variables sobre conjuntos finitos de cláusulas: S, S_1, S_2, \dots

Lógica clausal: semántica

- Fórmulas correspondientes:

- Def.: La **fórmula correspondiente a la cláusula** $\{L_1, \dots, L_n\}$ es

$$(\forall x_1) \dots (\forall x_p)[L_1 \vee \dots \vee L_n],$$

donde x_1, \dots, x_p son las variables libres de $L_1 \vee \dots \vee L_n$.

- Def.: La **fórmula correspondiente a la cláusula** \square es \perp .

- Def.: La **fórmula correspondiente al conjunto de cláusulas**

$$\{\{L_1^1, \dots, L_{n_1}^1\}, \dots, \{L_1^m, \dots, L_{n_m}^m\}\} \text{ es}$$

$$(\forall x_1) \dots (\forall x_p)[(L_1^1 \vee \dots \vee L_{n_1}^1) \wedge \dots \wedge (L_1^m \vee \dots \vee L_{n_m}^m)],$$

donde x_1, \dots, x_p son las variables libres de $(L_1^1 \vee \dots \vee L_{n_1}^1) \wedge \dots \wedge (L_1^m \vee \dots \vee L_{n_m}^m)$.

- Def.: La **fórmula correspondiente al conjunto de cláusulas** \emptyset es \top .

- Semántica:

- Def.: En cualquier interpretación $\mathcal{I} = (U, I)$, $I(\top) = 1$ e $I(\perp) = 0$.

- Def.: Los **conceptos semánticos** relativos a las cláusulas y a los conjuntos de cláusulas son los de sus correspondientes fórmulas.

Forma clausal de una fórmula

- Forma clausal de una fórmula

- Def.: Una **forma clausal de una fórmula** F es un conjunto de cláusulas S tal que $F \equiv_{sat} S$.

- Algoritmo: Aplicando a la fórmula F los siguientes pasos se obtiene S que una forma clausal de F :

1. Sea $F_1 = (\exists y_1) \dots (\exists y_n)F$, donde y_1, \dots, y_n son las variables libres de F .

2. Sea F_2 una forma normal prenexa conjuntiva rectificada de F_1 calculada mediante el algoritmo de la página ??.

3. Sea $F_3 = \text{Sko}(F_2)$, que tiene la forma

$$(\forall x_1) \dots (\forall x_p)[(L_1^1 \vee \dots \vee L_{n_1}^1) \wedge \dots \wedge (L_1^m \vee \dots \vee L_{n_m}^m)],$$

4. Sea $S = \{\{L_1^1, \dots, L_{n_1}^1\}, \dots, \{L_1^m, \dots, L_{n_m}^m\}\}$.

- Prop.: $F \equiv_{sat} F_1 \equiv F_2 \equiv_{sat} F_3 \equiv S$.

Forma clausal de una fórmula: Ejemplos

- Ejemplo de cálculo de una forma clausal de

$$\begin{aligned} & \neg(\exists x)[P(x) \rightarrow (\forall x)P(x)] \\ \equiv_{sat} & (\forall x)[P(x) \wedge \neg P(f(x))] \quad [\text{pág. ??}] \\ \equiv & \{\{P(x)\}, \{\neg P(f(x))\}\} \end{aligned}$$

- Ejemplo de cálculo de una forma clausal de

$$\begin{aligned} & (\forall x)P(x) \vee (\exists y)Q(y) \\ \equiv_{sat} & (\forall x)[P(x) \vee Q(f(x))] \quad [\text{pág. ??}] \\ \equiv & \{\{P(x), Q(f(x))\}\} \end{aligned}$$

- Ejemplo de cálculo de otra forma clausal de

$$\begin{aligned} & (\forall x)P(x) \vee (\exists y)Q(y) \\ \equiv_{sat} & (\forall x)[P(x) \vee Q(a)] \quad [\text{pág. ??}] \\ \equiv & \{\{P(x), Q(a)\}\} \end{aligned}$$

- Ejemplo de cálculo de una forma clausal de

$$\begin{aligned} & \neg((\forall x)[P(x) \rightarrow Q(x)] \wedge (\forall x)[Q(x) \rightarrow R(x)] \rightarrow (\forall x)[P(x) \rightarrow R(x)]) \\ \equiv_{sat} & (\forall x)(\forall y)[((\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge (\neg Q(y) \vee R(y))) \wedge (P(a) \wedge \neg R(a))] \quad [\text{pág. ??}] \\ \equiv & \{\{\neg P(x), Q(x)\}, \{\neg Q(y), R(y)\}, \{P(a)\}, \{\neg R(a)\}\} \end{aligned}$$

Forma clausal de una fórmula: Ejemplos

- Ejemplo de cálculo de una forma clausal de

$$\begin{aligned} & \neg(\exists x)[P(x, z) \vee (\forall y)Q(x, f(y))] \vee (\forall y)P(g(x, y), z) \\ \equiv_{sat} & (\exists z)[\neg(\exists x)[P(x, z) \vee (\forall y)Q(x, f(y))] \vee (\forall y)P(g(x, y), z)] \quad [1] \\ \equiv & (\exists z)[\neg(\exists x)[P(x, z) \vee (\forall y)Q(x, f(y))] \vee (\forall w)P(g(x, w), z)] \quad [(1)] \\ \equiv & (\exists z)[(\forall x)[\neg(P(x, z) \vee (\forall y)Q(x, f(y)))] \vee (\forall w)P(g(x, w), z)] \quad [(9)] \\ \equiv & (\exists z)[(\forall x)[\neg P(x, z) \wedge \neg(\forall y)Q(x, f(y))] \vee (\forall w)P(g(x, w), z)] \quad [(6)] \\ \equiv & (\exists z)[(\forall x)[\neg P(x, z) \wedge (\exists y)\neg Q(x, f(y))] \vee (\forall w)P(g(x, w), z)] \quad [(8)] \\ \equiv & (\exists z)(\forall x)[(\neg P(x, z) \wedge (\exists y)\neg Q(x, f(y))) \vee (\forall w)P(g(x, w), z)] \quad [(12)] \\ \equiv & (\exists z)(\forall x)[(\exists y)[\neg P(x, z) \wedge \neg Q(x, f(y))] \vee (\forall w)P(g(x, w), z)] \quad [(17)] \\ \equiv & (\exists z)(\forall x)(\exists y)[(\neg P(x, z) \wedge \neg Q(x, f(y))) \vee (\forall w)P(g(x, w), z)] \quad [(14)] \\ \equiv & (\exists z)(\forall x)(\exists y)(\forall w)[(\neg P(x, z) \wedge \neg Q(x, f(y))) \vee P(g(x, w), z)] \quad [(16)] \\ \equiv & (\exists z)(\forall x)(\exists y)(\forall w)[(\neg P(x, z) \vee P(g(x, w), z)) \wedge (\neg Q(x, f(y)) \vee P(g(x, w), z))] \quad [(20)] \\ \equiv_{sat} & (\forall x)(\exists y)(\forall w)[(\neg P(x, a) \vee P(g(x, w), a)) \wedge (\neg Q(x, f(y)) \vee P(g(x, w), a))] \quad [\text{Sko}] \\ \equiv_{sat} & (\forall x)(\forall w)[(\neg P(x, a) \vee P(g(x, w), a)) \wedge (\neg Q(x, f(h(x))) \vee P(g(x, w), a))] \quad [\text{Sko}] \\ \equiv & \{\{\neg P(x, a), P(g(x, w), a)\}, \{\neg Q(x, f(h(x))), P(g(x, w), a)\}\} \end{aligned}$$

Forma clausal de una fórmula: Ejemplos

- Ejemplo de cálculo de una forma clausal de

$$\begin{aligned}
 & \neg((\forall x)[P(x) \rightarrow Q(x)] \wedge (\exists x)P(x) \rightarrow (\exists x)Q(x)) \\
 \equiv & \neg((\forall x)[P(x) \rightarrow Q(x)] \wedge (\exists y)P(y) \rightarrow (\exists z)Q(z)) \quad [(2)] \\
 \equiv & \neg(\neg((\forall x)[P(x) \rightarrow Q(x)] \wedge (\exists y)P(y)) \vee (\exists z)Q(z)) \quad [(4)] \\
 \equiv & \neg(\neg((\forall x)[\neg P(x) \vee Q(x)] \wedge (\exists y)P(y)) \vee (\exists z)Q(z)) \quad [(4)] \\
 \equiv & \neg\neg((\forall x)[\neg P(x) \vee Q(x)] \wedge (\exists y)P(y)) \wedge \neg(\exists z)Q(z) \quad [(6)] \\
 \equiv & ((\forall x)[\neg P(x) \vee Q(x)] \wedge (\exists y)P(y)) \wedge \neg(\exists z)Q(z) \quad [(7)] \\
 \equiv & ((\forall x)[\neg P(x) \vee Q(x)] \wedge (\exists y)P(y)) \wedge (\forall z)\neg Q(z) \quad [(9)] \\
 \equiv & (\exists y)[(\forall x)[\neg P(x) \vee Q(x)] \wedge P(y)] \wedge (\forall z)\neg Q(z) \quad [(17)] \\
 \equiv & (\exists y)[(\forall x)[\neg P(x) \vee Q(x)] \wedge P(y)] \wedge (\forall z)\neg Q(z) \quad [(13)] \\
 \equiv & (\exists y)[(\forall x)[(\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge P(y)]] \wedge (\forall z)\neg Q(z) \quad [(11)] \\
 \equiv & (\exists y)(\forall x)[(\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge P(y)] \wedge (\forall z)\neg Q(z) \quad [(11)] \\
 \equiv & (\exists y)(\forall x)(\forall z)[(\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge P(y) \wedge \neg Q(z)] \quad [(15)] \\
 \equiv_{sat} & (\forall x)(\forall z)[(\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge P(a) \wedge \neg Q(z)] \quad [(15)] \\
 \equiv & \{\{\neg P(x), Q(x)\}, \{P(a)\}, \{\neg Q(z)\}\}
 \end{aligned}$$

Forma clausal de un conjunto de fórmulas

- Equisatisfacibilidad de conjuntos de fórmulas:

- Def.: Los conjuntos de fórmulas S_1 y S_2 son equisatisfacible si:

S_1 es satisfacible syss S_2 es satisfacible.

Se representa por $S_1 \equiv_{sat} S_2$

- Forma clausal de un conjunto de fórmulas

- Def.: Una **forma clausal de un conjunto de fórmulas** S es un conjunto de cláusulas equisatisfacible con S .

- Prop.: Si S_1, \dots, S_n son formas clausales de F_1, \dots, F_n , entonces $S_1 \cup \dots \cup S_n$ es una forma clausal de $\{F_1, \dots, F_n\}$.

- Ejemplo: Una forma clausal de

$$\{(\forall x)[P(x) \rightarrow Q(x)], (\exists x)P(x), \neg(\exists x)Q(x)\}$$

es

$$\{\{\neg P(x), Q(x)\}, \{P(a)\}, \{\neg Q(z)\}\}.$$

Reducción de consecuencia a insatisfacibilidad de cláusulas

- Reducción de consecuencia a insatisfacibilidad de cláusulas:
 - Prop: Sean S_1, \dots, S_n formas clausales de las fórmulas F_1, \dots, F_n . Si S es una forma clausal de $\neg G$, entonces son equivalentes
 1. $\{F_1, \dots, F_n\} \models G$.
 2. $\{F_1, \dots, F_n, \neg G\}$ es inconsistente.
 3. $S_1 \cup \dots \cup S_n \cup S$ es inconsistente.
 - Ejemplos:
 - Ejemplo 1:

$$\{(\forall x)[P(x) \rightarrow Q(x)], (\exists x)P(x)\} \models (\exists x)Q(x)$$
 syss $\{\{-P(x), Q(x)\}, \{P(a)\}, \{-Q(z)\}\}$ es inconsistente.
 - Ejemplo 2:

$$\{(\forall x)[P(x) \rightarrow Q(x)], (\forall x)[Q(x) \rightarrow R(x)]\} \models (\forall x)[P(x) \rightarrow R(x)]$$
 syss $\{\{-P(x), Q(x)\}, \{-Q(y), R(y)\}, \{P(a)\}, \{-R(a)\}\}$ es inconsistente.

Bibliografía

- M.L. Bonet *Apuntes de LPO*. (Univ. Politécnica de Cataluña, 2003) pp. 26–31.
- C.L. Chang y R.C.T. Lee *Symbolic logic and mechanical theorem proving* (Academic Press, 1973) pp. 35–39 y 46–51.
- J.L. Fernández, A. Manjarrés y F.J. Díez *Lógica computacional*. (UNED, 2003) pp. 101–106.
- S. Hölldobler *Computational logic*. (U. de Dresden, 2004) pp. 62–67.
- R. Nieuwenhuis *Lógica de primer orden*. (U. Politécnica de Cataluña, 2003) pp. 16–17
- M. Ojeda e I. Pérez *Lógica para la computación (Vol. 2: Lógica de Primer Orden)* (Ágora, 1997) pp. 37–49
- E. Paniagua, J.L. Sánchez y F. Martín *Lógica computacional* (Thomson, 2003) pp. 153–160.
- L. Paulson *Logic and proof* (U. Cambridge, 2002) pp. 43–47.
- U. Schöning *Logic for computer scientists* (Birkäuser, 1989) pp. 51–61.

Capítulo 9

Resolución en lógica de primer orden

Tema 9: Resolución en lógica de primer orden

José A. Alonso Jiménez
Andrés Cordon Franco

Grupo de Lógica Computacional
Dpto. de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Introducción

- Ejemplos de consecuencia mediante resolución:

- Ejemplo 1: $\{(\forall x)[P(x) \rightarrow Q(x)], (\exists x)P(x)\} \models (\exists x)Q(x)$
 $\text{sys} \{ \{ \neg P(x), Q(x) \}, \{ P(a) \}, \{ \neg Q(z) \} \}$ es inconsistente.

| | | |
|---|-------------------------|--|
| 1 | $\{ \neg P(x), Q(x) \}$ | Hipótesis |
| 2 | $\{ P(a) \}$ | Hipótesis |
| 3 | $\{ \neg Q(z) \}$ | Hipótesis |
| 4 | $\{ Q(a) \}$ | Resolvente de 1 y 2 con $\sigma = [x/a]$ |
| 5 | \square | Resolvente de 3 y 4 con $\sigma = [z/a]$ |

- Ejemplo 2: $\{(\forall x)[P(x) \rightarrow Q(x)], (\forall x)[Q(x) \rightarrow R(x)]\} \models (\forall x)[P(x) \rightarrow R(x)]$
 $\text{sys} \{ \{ \neg P(x), Q(x) \}, \{ \neg Q(y), R(y) \}, \{ P(a) \}, \{ \neg R(a) \} \}$ es inconsistente.

| | | |
|---|-------------------------|---|
| 1 | $\{ \neg P(x), Q(x) \}$ | Hipótesis |
| 2 | $\{ \neg Q(y), R(y) \}$ | Hipótesis |
| 3 | $\{ P(a) \}$ | Hipótesis |
| 4 | $\{ \neg R(a) \}$ | Hipótesis |
| 5 | $\{ Q(a) \}$ | Resolvente de 1 y 2 con $\sigma = [x/a]$ |
| 6 | $\{ R(a) \}$ | Resolvente de 2 y 5 con $\sigma = [y/a]$ |
| 5 | \square | Resolvente de 3 y 4 con $\sigma = \epsilon$ |

Unificación: Unificadores

- **Unificador:**

- Def.: La sustitución σ es un **unificador** de los términos t_1 y t_2 si $t_1\sigma = t_2\sigma$.
- Def.: Los términos t_1 y t_2 son **unificables** si tienen algún unificador.
- Def.: t es una **instancia común** de t_1 y t_2 si existe una sustitución σ tal que $t = t_1\sigma = t_2\sigma$.
- Ejemplos:

| t_1 | t_2 | Unificador | Instancia común |
|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| $f(x, g(z))$ | $f(g(y), x)$ | $[x/g(z), y/z]$ | $f(g(z), g(z))$ |
| $f(x, g(z))$ | $f(g(y), x)$ | $[x/g(y), z/y]$ | $f(g(y), g(y))$ |
| $f(x, g(z))$ | $f(g(y), x)$ | $[x/g(a), y/a]$ | $f(g(a), g(a))$ |
| $f(x, y)$ | $f(y, x)$ | $[x/a, y/a]$ | $f(a, a)$ |
| $f(x, y)$ | $f(y, x)$ | $[y/x]$ | $f(x, x)$ |
| $f(x, y)$ | $g(a, b)$ | No tiene | No tiene |
| $f(x, x)$ | $f(a, b)$ | No tiene | No tiene |
| $f(x)$ | $f(g(x))$ | No tiene | No tiene |

- Nota: Las anteriores definiciones se extienden a conjuntos de términos y de literales.

Unificación: Composición de sustituciones

- **Composición de sustituciones:**

- Def.: La **composición** de las sustituciones σ_1 y σ_2 es la sustitución $\sigma_1\sigma_2$ definida por $x(\sigma_1\sigma_2) = (x\sigma_1)\sigma_2$, para toda variable x .
- Ejemplo: Si $\sigma_1 = [x/f(z, a), y/w]$ y $\sigma_2 = [x/b, z/g(w)]$, entonces

$$- x\sigma_1\sigma_2 = (x\sigma_1)\sigma_2 = f(z, a)\sigma_2 = f(z\sigma_2, a\sigma_2) = f(g(w), a)$$

$$- y\sigma_1\sigma_2 = (y\sigma_1)\sigma_2 = w\sigma_2 = w$$

$$- z\sigma_1\sigma_2 = (z\sigma_1)\sigma_2 = z\sigma_2 = g(w)$$

$$- w\sigma_1\sigma_2 = (w\sigma_1)\sigma_2 = w\sigma_2 = w$$

Por tanto, $\sigma_1\sigma_2 = [x/f(g(w), a), y/w, z/g(w)]$.

- Def.: La **sustitución identidad** es la sustitución ϵ tal que, para todo x , $x\epsilon = x$.
- Propiedades:
 1. Asociativa: $\sigma_1(\sigma_2\sigma_3) = (\sigma_1\sigma_2)\sigma_3$
 2. Neutro: $\sigma\epsilon = \epsilon\sigma = \sigma$.

Unificación: Comparación de sustituciones

- **Comparación de sustituciones:**
 - Def.: La sustitución σ_1 es **más general que** la σ_2 si existe una sustitución σ_3 tal que $\sigma_2 = \sigma_1\sigma_3$, Se representa por $\sigma_2 \leq \sigma_1$.
 - Def.: Las sustituciones σ_1 y σ_2 son **equivalentes** si $\sigma_1 \leq \sigma_2$ y $\sigma_2 \leq \sigma_1$. Se representa por $\sigma_1 \equiv \sigma_2$.
 - Ejemplos: Sean $\sigma_1 = [x/g(z), y/z]$, $\sigma_2 = [x/g(y), z/y]$ y $\sigma_3 = [x/g(a), y/a]$. Entonces,
 1. $\sigma_1 = \sigma_2[y/z]$
 2. $\sigma_2 = \sigma_1[z/y]$
 3. $\sigma_3 = \sigma_1[z/a]$
 4. $\sigma_1 \equiv \sigma_2$
 5. $\sigma_3 \leq \sigma_1$
 - Ejemplo: $[x/a, y/a] \leq [y/x]$, ya que $[x/a, y/a] = [y/x][x/a, y/a]$.

Unificación: Unificador de máxima generalidad

- **Unificador de máxima generalidad:**
 - Def.: La sustitución σ es un **unificador de máxima generalidad (UMG)** de los términos t_1 y t_2 si
 - σ es un unificador de t_1 y t_2 .
 - σ es más general que cualquier unificador de t_1 y t_2 .
 - Ejemplos:
 1. $[x/g(z), y/z]$ es un UMG de $f(x, g(z))$ y $f(g(y), x)$.
 2. $[x/g(y), z/y]$ es un UMG de $f(x, g(z))$ y $f(g(y), x)$.
 3. $[x/g(a), y/a]$ no es un UMG de $f(x, g(z))$ y $f(g(y), x)$.
 - Nota: Las anterior definición se extienden a conjuntos de términos y de literales.

Unificación: Algoritmo de unificación

- **Notación de lista:**
 - (a_1, \dots, a_n) representa una lista cuyos elementos son a_1, \dots, a_n .
 - $(a|R)$ representa una lista cuyo primer elemento es a y resto es R .
 - $()$ representa la lista vacía.
- **Unificadores de listas de términos:**
 - Def.: σ es un **unificador** de $(s_1 \dots, s_n)$ y $(t_1 \dots, t_n)$ si $s_1\sigma = t_1\sigma, \dots, s_n\sigma = t_n\sigma$.
 - Def.: $(s_1 \dots, s_n)$ y $(t_1 \dots, t_n)$ son **unificables** si tienen algún unificador.
 - Def.: σ es un **unificador de máxima generalidad (UMG)** de $(s_1 \dots, s_n)$ y $(t_1 \dots, t_n)$ si σ es un unificador de $(s_1 \dots, s_n)$ y $(t_1 \dots, t_n)$ más general que cualquier otro.
- **Aplicación de una sustitución a una lista de ecuaciones:**
 - $(s_1 = t_1, \dots, s_n = t_n)\sigma = (s_1\sigma = t_1\sigma, \dots, s_n\sigma = t_n\sigma)$.
- **Algoritmo de unificación de listas de términos:**
 - Entrada: Una lista de ecuaciones $L = (s_1 = t_1, \dots, s_n = t_n)$ y una sustitución σ .
 - Salida: Un UMG de las listas $(s_1 \dots, s_n)$ y $(t_1 \dots, t_n)$, si son unificables; “No unificables”, en caso contrario.

Unificación: Algoritmo de unificación

- Procedimiento $\text{unif}(L, \sigma)$:
 1. Si $L = ()$, entonces $\text{unif}(L, \sigma) = \sigma$.
 2. Si $L = (t = t|L')$, entonces $\text{unif}(L, \sigma) = \text{unif}(L', \sigma)$.
 3. Si $L = (f(t_1, \dots, t_m) = f(t'_1, \dots, t'_m)|L')$, entonces
 - $\text{unif}(L, \sigma) = \text{unif}((t_1 = t'_1, \dots, t_m = t'_m|L'), \sigma)$.
 4. Si $L = (x = t|L')$ (ó $L = (t = x|L')$) y x no aparece en t , entonces
 - $\text{unif}(L, \sigma) = \text{unif}(L'[x/t], \sigma[x/t])$.
 5. Si $L = (x = t|L')$ (ó $L = (t = x|L')$) y x aparece en t , entonces
 - $\text{unif}(L, \sigma) = \text{“No unificables”}$.
 6. Si $L = (f(t_1, \dots, t_m) = g(t'_1, \dots, t'_m)|L')$, entonces
 - $\text{unif}(L, \sigma) = \text{“No unificables”}$.
 7. Si $L = (f(t_1, \dots, t_m) = f(t'_1, \dots, t'_p)|L')$ y $m \neq p$, entonces
 - $\text{unif}(L, \sigma) = \text{“No unificables”}$.

Unificación: Algoritmo de unificación

- **Algoritmo de unificación de dos términos:**

- **Entrada:** Dos términos t_1 y t_2 .
- **Salida:** Un UMG de t_1 y t_2 , si son unificables; “No unificables”, en caso contrario.

- **Procedimiento:** $\text{unif}((t_1 = t_2), \epsilon)$.

- **Ejemplo 1:** Unificar $f(x, g(z))$ y $f(g(y), x)$:

$$\begin{aligned}
 & \text{unif}((f(x, g(z)) = f(g(y), x)), \epsilon) \\
 = & \text{unif}((x = g(y), g(z) = x), \epsilon) && \text{por 3} \\
 = & \text{unif}((g(z) = x)[x/g(y)], \epsilon[x/g(y)]) && \text{por 4} \\
 = & \text{unif}((g(z) = g(y)), [x/g(y)]) \\
 = & \text{unif}((z = y), [x/g(y)]) && \text{por 3} \\
 = & \text{unif}(), [x/g(y)][z/y] && \text{por 4} \\
 = & \text{unif}(), [x/g(y), z/y] \\
 = & [x/g(y), z/y] && \text{por 1}
 \end{aligned}$$

Unificación: Algoritmo de unificación

- **Ejemplo 2:** Unificar $f(x, b)$ y $f(a, y)$:

$$\begin{aligned}
 & \text{unif}((f(x, b) = f(a, y)), \epsilon) \\
 = & \text{unif}((x = a, b = y), \epsilon) && \text{por 3} \\
 = & \text{unif}((b = y)[x/a], \epsilon[x/a]) && \text{por 4} \\
 = & \text{unif}((b = y), [x/a]) \\
 = & \text{unif}(), [x/a][y/b] && \text{por 4} \\
 = & [x/a, y/b] && \text{por 1}
 \end{aligned}$$

- **Ejemplo 3:** Unificar $f(x, x)$ y $f(a, b)$:

$$\begin{aligned}
 & \text{unif}((f(x, x) = f(a, b)), \epsilon) \\
 = & \text{unif}((x = a, x = b), \epsilon) && \text{por 3} \\
 = & \text{unif}((x = b)[x/a], \epsilon[x/a]) && \text{por 4} \\
 = & \text{unif}((a = b), [x/a]) \\
 = & \text{“No unificable”} && \text{por 6}
 \end{aligned}$$

- **Ejemplo 4:** Unificar $f(x, g(y))$ y $f(y, x)$:

$$\begin{aligned}
 & \text{unif}((f(x, g(y)) = f(y, x)), \epsilon) \\
 = & \text{unif}((x = y, g(y) = x), \epsilon) && \text{por 3} \\
 = & \text{unif}((g(y) = x)[x/y], \epsilon[x/y]) && \text{por 4} \\
 = & \text{unif}((g(y) = y), [x/y]) \\
 = & \text{“No unificable”} && \text{por 5}
 \end{aligned}$$

Unificación: Algoritmo de unificación

- Ejemplo 5: Unificar $j(w, a, h(w))$ y $j(f(x, y), x, z)$

$$\begin{aligned}
 & \text{unif}((j(w, a, h(w)) = j(f(x, y), x, z))\epsilon) \\
 = & \text{unif}((w = f(x, y), a = x, h(w) = z), \epsilon) && \text{por 3} \\
 = & \text{unif}((a = x, h(w) = z)[w/f(x, y)], \epsilon[w/f(x, y)]) && \text{por 4} \\
 = & \text{unif}((a = x, h(f(x, y)) = z), [w/f(x, y)]) \\
 = & \text{unif}((h(f(x, y)) = z)[x/a], [w/f(x, y)][x/a]) && \text{por 4} \\
 = & \text{unif}((h(f(a, y)) = z), [w/f(a, y), x/a]) \\
 = & \text{unif}((\), [w/f(a, y), x/a][z/h(f(a, y))]) && \text{por 4} \\
 = & [w/f(a, y), x/a, z/h(f(a, y))] && \text{por 1}
 \end{aligned}$$

- Ejemplo 6: Unificar $j(w, a, h(w))$ y $j(f(x, y), x, y)$

$$\begin{aligned}
 & \text{unif}((j(w, a, h(w)) = j(f(x, y), x, y))\epsilon) \\
 = & \text{unif}((w = f(x, y), a = x, h(w) = y), \epsilon) && \text{por 3} \\
 = & \text{unif}((a = x, h(w) = y)[w/f(x, y)], \epsilon[w/f(x, y)]) && \text{por 4} \\
 = & \text{unif}((a = x, h(f(x, y)) = y), [w/f(x, y)]) \\
 = & \text{unif}((h(f(x, y)) = y)[x/a], [w/f(x, y)][x/a]) && \text{por 4} \\
 = & \text{unif}((h(f(a, y)) = y), [w/f(a, y), x/a]) \\
 = & \text{“No unificable”} && \text{por 5}
 \end{aligned}$$

Resolución: Separación de variables

- Separación de variables

- Def.: La sustitución $[x_1/t_1, \dots, x_n/t_n]$ es un **renombramiento** si todos los t_i son variables.
- Prop.: Si θ es un renombramiento, entonces $C \equiv C\theta$.
- Def.: Las cláusulas C_1 y C_2 están **separadas** si no tienen ninguna variable común.
- Def.: Una **separación de las variables de C_1 y C_2** es un par de renombramientos (θ_1, θ_2) tales que $C_1\theta_1$ y $C_2\theta_2$ están separadas.
- Ejemplo: Una separación de variables de $C_1 = \{P(x), Q(x, y)\}$ y $C_2 = \{R(f(x, y))\}$ es $(\theta_1 = [x/x_1, y/y_1], \theta_2 = [x/x_2, y/y_2])$.

Resolución: Resolvente binaria

- **Resolución binaria:**

- **Def.:** La cláusula C es una resolvente binaria de las cláusulas C_1 y C_2 si existen una separación de variables (θ_1, θ_2) de C_1 y C_2 , un literal $L_1 \in C_1$, un literal $L_2 \in C_2$ y un UMG σ de $L_1\theta_1$ y $L_2^c\theta_2$ tales que

$$C = (C_1\theta_1\sigma \setminus \{L_1\theta_1\sigma\}) \cup (C_2\theta_2\sigma \setminus \{L_2\theta_2\sigma\}).$$

- **Ejemplo:** Sean

$$C_1 = \{\neg P(x), Q(f(x))\},$$

$$C_2 = \{\neg Q(x), R(g(x))\},$$

$$L_1 = Q(f(x)),$$

$$L_2 = \neg Q(x),$$

$$\theta_1 = [x/x_1],$$

$$\theta_2 = [x/x_2],$$

$$L_1\theta_1 = Q(f(x_1)),$$

$$L_2^c\theta_2 = Q(x_2),$$

$$\sigma = [x_2/f(x_1)]$$

Entonces, $C = \{\neg P(x_1), R(g(f(x_1)))\}$ es una resolvente binaria de C_1 y C_2 .

Resolución: Factorización

- **Factorización:**

- **Def.:** La cláusula C es un factor de la cláusula D si existen dos literales L_1 y L_2 en D que son unificables y $C = D\sigma \setminus \{L_2\sigma\}$ donde σ es un UMG de L_1 y L_2 .

- **Ejemplo:** Sean

$$D = \{P(x, y), P(y, x), Q(a)\}$$

$$L_1 = P(x, y)$$

$$L_2 = P(y, x)$$

$$\sigma = [y/x]$$

Entonces,

$$C = \{P(x, x), Q(a)\} \text{ es un factor de } D.$$

Resolución

- Ejemplos de refutación por resolución:
 - Refutación de $S = \{\{\neg P(x, f(x, y))\}, \{P(a, z), \neg Q(z, v)\}, \{Q(u, a)\}\}$
 - 1 $\{\neg P(x, f(x, y))\}$ Hipótesis
 - 2 $\{P(a, z), \neg Q(z, v)\}$ Hipótesis
 - 3 $\{Q(u, a)\}$ Hipótesis
 - 4 $\{\neg Q(f(a, y), v)\}$ Resolvente de 1 y 2 con $\sigma = [x/a, z/f(a, y)]$
 - 5 \square Resolvente de 3 y 4 con $\sigma = [u/f(a, y), v/a]$
 - Refutación de $S = \{\{P(x)\}, \{\neg P(f(x))\}\}$
 - 1 $\{P(x)\}$ Hipótesis
 - 2 $\{\neg P(f(x))\}$ Hipótesis
 - 3 \square Resolvente de 1 y 2 con $\theta_1 = \epsilon, \theta_2 = [x/x'], \sigma = [x/f(x')]$
 - Refutación de $S = \{\{P(x, y), P(y, x)\}, \{\neg P(u, v), \neg P(v, u)\}\}$
 - 1 $\{P(x, y), P(y, x)\}$ Hipótesis
 - 2 $\{\neg P(u, v), \neg P(v, u)\}$ Hipótesis
 - 3 $\{P(x, x)\}$ Factor de 1 con $[y/x]$
 - 4 $\{\neg P(u, u)\}$ Factor de 2 con $[v/u]$
 - 5 \square Resolvente de 3 y 4 con $[x/u]$

Resolución

- Definiciones
 - Sea S un conjunto de cláusulas.
 - La sucesión (C_1, \dots, C_n) es una **demostración por resolución de la cláusula C a partir de S** si $C = C_n$ y para todo $i \in \{1, \dots, n\}$ se verifica una de las siguientes condiciones:
 - $C_i \in S$;
 - existen $j, k < i$ tales que C_i es una resolvente de C_j y C_k
 - existe $j < i$ tal que C_i es un factor de C_j
 - La cláusula C es **demostrable por resolución a partir de S** si existe una demostración por resolución de C a partir de S .
 - Una **refutación por resolución de S** es una demostración por resolución de la cláusula vacía a partir de S .
 - Se dice que S es **refutable por resolución** si existe una refutación por resolución a partir de S .

Resolución

- **Demostraciones por resolución**

- Def.: Sean S_1, \dots, S_n formas clausales de las fórmulas F_1, \dots, F_n y S una forma clausal de $\neg F$. Una **demostración por resolución de F a partir de $\{F_1, \dots, F_n\}$** es una refutación por resolución de $S_1 \cup \dots \cup S_n \cup S$.
- Def.: La fórmula F es **demostrable por resolución a partir de $\{F_1, \dots, F_n\}$** si existe una demostración por resolución de F a partir de $\{F_1, \dots, F_n\}$. Se representa por $\{F_1, \dots, F_n\} \vdash_{Res} F$.
- Ejemplo: (tema 8 p. 21) $\{(\forall x)[P(x) \rightarrow Q(x)], (\exists x)P(x)\} \vdash_{Res} (\exists x)Q(x)$
 - 1 $\{\neg P(x), Q(x)\}$ Hipótesis
 - 2 $\{P(a)\}$ Hipótesis
 - 3 $\{\neg Q(z)\}$ Hipótesis
 - 4 $\{Q(a)\}$ Resolvente de 1 y 2 con $[x/a]$
 - 5 \square Resolvente de 3 y 4 con $[z/a]$

Resolución

- Ejemplo: (tema 8 p. 21)

$$\{(\forall x)[P(x) \rightarrow Q(x)], (\forall x)[Q(x) \rightarrow R(x)] \vdash_{Res} (\forall x)[P(x) \rightarrow R(x)]\}$$
 - 1 $\{\neg P(x), Q(x)\}$ Hipótesis
 - 2 $\{\neg Q(y), R(y)\}$ Hipótesis
 - 3 $\{P(a)\}$ Hipótesis
 - 4 $\{\neg R(a)\}$ Hipótesis
 - 5 $\{Q(a)\}$ Resolvente de 1 y 2 con $[x/a]$
 - 6 $\{R(a)\}$ Resolvente de 2 y 5 con $[y/a]$
 - 5 \square Resolvente de 6 y 4 con
- Ejemplo: (tema 6 p. 55) $\vdash_{Res} (\exists x)[P(x) \rightarrow (\forall y)P(y)]$
 - 1 $\{P(x)\}$ Hipótesis
 - 2 $\{\neg P(f(x))\}$ Hipótesis
 - 3 \square Resolvente de 1 y 2 con $\theta_2 = [x/x'], \sigma = [x/f(x')]$

Resolución

- Ejemplo: $\vdash_{Res} (\forall x)(\exists y)\neg(P(y, x) \leftrightarrow \neg P(y, y))$

– Forma clausal:

$$\begin{aligned}
 & \neg(\forall x)(\exists y)\neg(P(y, x) \leftrightarrow \neg P(y, y)) \\
 \equiv & \neg(\forall x)(\exists y)\neg((P(y, x) \rightarrow \neg P(y, y)) \wedge (\neg P(y, y) \rightarrow P(y, x))) \\
 \equiv & \neg(\forall x)(\exists y)\neg((\neg P(y, x) \vee \neg P(y, y)) \wedge (\neg\neg P(y, y) \vee P(y, x))) \\
 \equiv & \neg(\forall x)(\exists y)\neg((\neg P(y, x) \vee \neg P(y, y)) \wedge (P(y, y) \vee P(y, x))) \\
 \equiv & (\exists x)(\forall y)\neg((\neg P(y, x) \vee \neg P(y, y)) \wedge (P(y, y) \vee P(y, x))) \\
 \equiv & (\exists x)(\forall y)((\neg P(y, x) \vee \neg P(y, y)) \wedge (P(y, y) \vee P(y, x))) \\
 \equiv_{sat} & (\forall y)((\neg P(y, a) \vee \neg P(y, y)) \wedge (P(y, y) \vee P(y, a))) \\
 \equiv & \{\{\neg P(y, a), \neg P(y, y)\}, \{P(y, y), P(y, a)\}\}
 \end{aligned}$$

– Refutación:

- 1 $\{\neg P(y, a), \neg P(y, y)\}$ Hipótesis
- 2 $\{P(y, y), P(y, a)\}$ Hipótesis
- 3 $\{\neg P(a, a)\}$ Factor de 1 con $[y/a]$
- 4 $\{\neg P(a, a)\}$ Factor de 2 con $[y/a]$
- 5 \square Resolvente de 3 y 4

Resolución

- Ejemplo (Paradoja del barbero de Russell): En una isla pequeña hay sólo un barbero. El gobernador de la isla ha publicado la siguiente norma: “El barbero afeita a todas las personas que no se afeitan a sí misma y sólo a dichas personas”. Demostrar que la norma es inconsistente.

– Representación:

$$(\forall x)[afeita(b, x) \leftrightarrow \neg afeita(x, x)]$$

– Forma clausal:

$$\begin{aligned}
 & (\forall x)[afeita(b, x) \leftrightarrow \neg afeita(x, x)] \\
 \equiv & (\forall x)[(afeita(b, x) \rightarrow \neg afeita(x, x)) \wedge (\neg afeita(x, x) \rightarrow afeita(b, x))] \\
 \equiv & (\forall x)[(\neg afeita(b, x) \vee \neg afeita(x, x)) \wedge (\neg\neg afeita(x, x) \vee afeita(b, x))] \\
 \equiv & (\forall x)[(\neg afeita(b, x) \vee \neg afeita(x, x)) \wedge (afeita(x, x) \vee afeita(b, x))] \\
 \equiv & \{\{\neg afeita(b, x), \neg afeita(x, x)\}, \{afeita(x, x), afeita(b, x)\}\}
 \end{aligned}$$

– Refutación:

- 1 $\{\neg afeita(b, x), \neg afeita(x, x)\}$ Hipótesis
- 2 $\{afeita(x, x), afeita(b, x)\}$ Hipótesis
- 3 $\{\neg afeita(b, b)\}$ Factor de 1 con $[x/b]$
- 4 $\{afeita(b, b)\}$ Factor de 2 con $[x/b]$
- 5 \square Resolvente de 3 y 4

Adecuación y completitud de la resolución

- **Propiedades:**

- Si C es una resolvente de C_1 y C_2 , entonces $\{C_1, C_2\} \models C$.
- Si D es un factor de C entonces $C \models D$.
- Si $\square \in S$, entonces S es inconsistente.
- Si el conjunto de cláusulas S es refutable por resolución, entonces S es inconsistente.
- Teor.: El cálculo de resolución (para la lógica de primer orden sin igualdad) es adecuado y completo; es decir,

$$\text{Adecuado: } S \vdash_{Res} F \implies S \models F$$

$$\text{Completo: } S \models F \implies S \vdash_{Res} F$$

Interpretaciones de Herbrand

- Def.: El **universo de Herbrand de L** es el conjunto de los términos básicos de L . Se representa por $UH(L)$.
- Def.: Una interpretación $\mathcal{I} = (U, I)$ de L es una **interpretación de Herbrand** si
 - U es el universo de Herbrand de L ;
 - $I(c) = c$, para cada constante c de L ;
 - $I(f) = f$, para cada símbolo de función f de L .
- Def.: La **base de Herbrand de L** es el conjunto de los átomos básicos de L . Se representa por $BH(L)$.
- Prop.: Una interpretación de Herbrand queda determinada por un subconjunto de la base de Herbrand, el conjunto de átomos básicos verdaderos en esa interpretación.
- Ejemplo: Si $\mathcal{C} = \{a, b, c\}$, $\mathcal{F} = \emptyset$ y $\mathcal{R} = \{P/1\}$, entonces las interpretaciones de Herbrand de L son

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------|-------------|------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------------|
| $I_n(P)$ | \emptyset | $\{c\}$ | $\{b\}$ | $\{b, c\}$ | $\{a\}$ | $\{a, c\}$ | $\{a, b\}$ | $\{a, b, c\}$ |
| IH_n | \emptyset | $\{P(c)\}$ | $\{P(b)\}$ | $\{P(b), P(c)\}$ | $\{P(a)\}$ | $\{P(a), P(c)\}$ | $\{P(a), P(b)\}$ | $\{P(a), P(b), P(c)\}$ |

Modelos de Herbrand

• Modelos de Herbrand:

- Nota: Las definiciones de universo de Herbrand, base de Herbrand e interpretación de Herbrand definidas para un lenguaje se extienden a fórmulas y conjuntos de fórmulas considerando el lenguaje formado por los símbolos no lógicos que aparecen.
- Def.: Un **modelo de Herbrand de una fórmula F** es una interpretación de Herbrand de F que es modelo de F .
- Def.: Un **modelo de Herbrand de un conjunto de fórmulas S** es una interpretación de Herbrand de S que es modelo de S .
- Ejemplo: Los modelos de Herbrand de $\{P(a) \vee P(b), \neg P(b) \vee P(c), P(a) \rightarrow P(c)\}$ son $\{P(b), P(c)\}$, $\{P(a), P(c)\}$ y $\{P(a), P(b), P(c)\}$.
- Ejemplo: Sea $S = \{(\forall x)(\forall y)[Q(b, x) \rightarrow P(a) \vee R(y)], P(b) \rightarrow \neg(\exists z)(\exists u)Q(z, u)\}$. Entonces, $\text{UH}(S) = \{a, b\}$
 $\text{BH}(S) = \{P(a), P(b), Q(a, a), Q(a, b), Q(b, a), Q(b, b), R(a), R(b)\}$
 Un modelo de Herbrand de S es $\{P(a)\}$.

Cálculo de modelo de Herbrand

• Cálculo de modelo de Herbrand

- Ejemplo 1: Cálculo de modelo de Herbrand de $\{(\forall x)[P(x) \rightarrow Q(x)], P(a), \neg Q(b)\}$

| | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| 1 | $\{\neg P(x), Q(x)\}$ | Hipótesis |
| 2 | $\{P(a)\}$ | Hipótesis |
| 3 | $\{\neg Q(b)\}$ | Hipótesis |
| 4 | $\{Q(a)\}$ | Resolvente de 1 y 2 |
| 5 | $\{\neg P(b)\}$ | Resolvente de 1 y 3 |

Modelo de Herbrand: $U = \{a, b\}$, $I(P) = \{a\}$, $I(Q) = \{a\}$.
- Ejemplo 2: Cálculo de modelo de Herbrand de $\{(\forall x)[P(x) \rightarrow P(s(x))], P(0)\}$

| | | |
|---|--------------------------|---------------------|
| 1 | $\{\neg P(x), P(s(x))\}$ | Hipótesis |
| 2 | $\{P(0)\}$ | Hipótesis |
| 3 | $\{P(s(0))\}$ | Resolvente de 1 y 2 |
| 4 | $\{P(s(s(0)))\}$ | Resolvente de 1 y 3 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ |

Modelo de Herbrand: $U = \{0, s(0), s(s(0)), \dots\}$
 $I(P) = \{P(0), P(s(0)), P(s(s(0))), \dots, \}$

Determinación de no-consecuencia por resolución

- Ejemplo de determinación de no consecuencia por resolución
 - Enunciado: Comprobar, por resolución, que

$$(\forall x)[P(x) \vee Q(x)] \not\models (\forall x)P(x) \vee (\forall x)Q(x).$$
 - Reducción 1: Comprobar que es consistente

$$\{(\forall x)[P(x) \vee Q(x)], \neg((\forall x)P(x) \vee (\forall x)Q(x))\}$$
 - Reducción 2: Comprobar que es consistente

$$\{P(x), Q(x)\}, \{\neg P(a)\}, \{\neg Q(b)\}$$
 - Resolución:
 - 1 $\{P(x), Q(x)\}$ Hipótesis
 - 2 $\{\neg P(a)\}$ Hipótesis
 - 3 $\{\neg Q(b)\}$ Hipótesis
 - 4 $\{Q(a)\}$ Resolvente de 1 y 2
 - 5 $\{P(b)\}$ Resolvente de 1 y 3
 - Modelo: $U = \{a, b\}, I(P) = \{b\}, I(Q) = \{a\}.$

Tableros semánticos

- Fórmulas gamma y beta
- Las **fórmulas gamma**, junto con sus componentes, son

| | | |
|--------------------|---------------|-----------------------------|
| $(\forall x)F$ | $F[x/t]$ | (con t un término básico) |
| $\neg(\exists x)F$ | $\neg F[x/t]$ | (con t un término básico) |


- Las **fórmulas beta**, junto con sus componentes, son

| | | |
|--------------------|---------------|-------------------------------|
| $(\exists x)F$ | $F[x/a]$ | (con a una nueva constante) |
| $\neg(\forall x)F$ | $\neg F[x/a]$ | (con a una nueva constante) |

Tableros semánticos

- Ejemplo de consecuencia mediante tablero:


$$\{(\forall x)[P(x) \rightarrow Q(x)], (\exists x)P(x)\} \vdash_{Tab} (\exists x)Q(x)$$



Tableros semánticos

- Ejemplo de consecuencia mediante tablero:


$$\{(\forall x)[P(x) \rightarrow Q(x)], (\forall x)[Q(x) \rightarrow R(x)]\} \vdash_{Tab} (\forall x)[P(x) \rightarrow R(x)]$$



Tableros semánticos

- Ejemplo de no consecuencia mediante tablero:

$$(\forall x)[P(x) \vee Q(x)] \not\models (\forall x)P(x) \vee (\forall x)Q(x).$$



Contramodelo: $U = \{a, b\}, I(P) = \{b\}, I(Q) = \{a\}$.

Bibliografía

- Fitting, M. *First-Order Logic and Automated Theorem Proving (2nd ed.)* (Springer, 1996) pp. 137–141.
- M.L. Bonet *Apuntes de LPO*. (Univ. Politécnica de Cataluña, 2003) pp. 34–40.
- C.L. Chang y R.C.T. Lee *Symbolic logic and mechanical theorem proving* (Academic Press, 1973) pp. 70–99.
- J.I. García, P.A. García y J.M. Urbano *Fundamentos lógicos de la programación*. (Universidad de Granada, 2002) pp. 45–66
- M. Genesereth *Computational Logic (Chapter 9: Relational Resolution)* (Stanford University, 2003)
- S. Hölldobler *Computational logic*. (U. de Dresden, 2004) pp. 71–74.
- M. Ojeda e I. Pérez *Lógica para la computación (Vol. 2: Lógica de Primer Orden)* (Ágora, 1997) pp. 138–164.
- L. Paulson *Logic and proof* (U. Cambridge, 2002) pp. 50–61.
- U. Schöning *Logic for computer scientists* (Birkäuser, 1989) pp. 79–96.