Lógicas clásicas

Francisco J. Martín Mateos

Dpto. Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
Universidad de Sevilla

- Objetivos de la lógica:
 - Formalización del lenguaje natural.
 - Desarrollar métodos de razonamiento independientes del contexto.
- Sistemas lógicos:
 - Lógica proposicional.
 - Lógica de primer orden.
 - Lógica de orden superior.
 - Lógicas modales.
 - Lógicas descriptivas.

- Las lógicas clásicas son sistemas formales que cumplen:
 - *Principio de tercio excluso*: Cualquier afirmación es verdadera o falsa.
 - *Principio de no contradicción*: No hay afirmaciones que sean verdaderas y falsas al mismo tiempo.
 - *Principio de explosión*: De una afirmación contradictoria se puede deducir cualquier cosa.
 - *Principio de monotonía de la implicación*: Las hipótesis de cualquier hecho derivado pueden ampliarse con supuestos adicionales.
- Ejemplos:
 - Lógica proposicional.
 - Lógica de primer orden.
 - Lógica de segundo orden.

Lógica proposicional

- Argumentaciones:
 - Si el tren llega a las 7 y no hay taxis en la estación, entonces Juan llegará tarde a la reunión. Juan no ha llegado tarde a la reunión. El tren llegó a las 7. Por tanto, había taxis en la estación.
 - Si hay corriente y la lámpara no está fundida, entonces está encendida. La lámpara no está encendida. Hay corriente. Por tanto, la lámpara está fundida.

Argumentaciones y formalización

- Formalización:
 - Primer caso:
 - $p \equiv$ “el tren llega a las 7”
 - $q \equiv$ “hay taxis en la estación”
 - $r \equiv$ “juan llegará tarde a la reunión”
 - Segundo caso:
 - $p \equiv$ “hay corriente”
 - $q \equiv$ “la lámpara está fundida”
 - $r \equiv$ “la lámpara está encendida”
- En ambos casos:
 - Argumentación: Si p y no q , entonces r . No r . p . Por tanto, q
 - Formulación: $p \wedge \neg q \rightarrow r, \neg r, p \models q$.

- Alfabeto proposicional:
 - Variables proposicionales: $p, q, r, \dots, p_1, p_2, \dots$
 - Conectivas lógicas:
 - Conectivas monarias:
negación, $\neg$.
 - Conectivas binarias:
conjunción, $\wedge$;
disyunción, $\vee$;
condicional $\rightarrow$;
bicondicional $\leftrightarrow$.
 - Símbolos adicionales: (y) .

- Fórmulas proposicionales:
 - Cualquier variable proposicional es una fórmula (fórmulas atómicas).
 - Si **F** y **G** son fórmulas entonces también son fórmulas:
 - Negación: $(\neg F)$
 - Conjunción: $(F \wedge G)$
 - Disyunción: $(F \vee G)$
 - Condicional: $(F \rightarrow G)$
 - Bicondicional: $(F \leftrightarrow G)$
- Ejemplos:
 - Son fórmulas: **p**, $(p \vee (\neg q))$, $((p \wedge q) \rightarrow (q \vee p))$.
 - No es fórmula: $(p \wedge \vee q)$.

- Notación:
 - Variables proposicionales: **p, q, r**
 - Conjunto de todas las variables proposicionales: **VP**
 - Fórmulas proposicionales: **F, G, H**
 - Conjunto de todas las fórmulas proposicionales: **Prop**
- Los paréntesis se eliminan cuando no hay duda sobre el uso de las conectivas lógicas.
 - Se eliminan los paréntesis externos:
 - **F ∨ G** en lugar de **(F ∨ G)**.
 - Se usa una precedencia entre las conectivas: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$.
 - **F ∧ G → ¬F ∨ G** en lugar de **(F ∧ G) → ((¬F) ∨ G)**
 - Asociación por la derecha de las conectivas:
 - **F ∨ G ∨ H** en lugar de **F ∨ (G ∨ H)**

- Valores de verdad: verdadero (**1** o $\top$) y falso (**0** o $\perp$)
 - El conjunto de los valores de verdad es $\mathbb{B}$
- Funciones de verdad asociadas a las conectivas:

$$H_{\neg}(i) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = 0 \\ 0 & \text{si } i = 1 \end{cases}$$

$$H_{\wedge}(i, j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j = 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$H_{\vee}(i, j) = \begin{cases} 0 & \text{si } i = j = 0 \\ 1 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$H_{\rightarrow}(i, j) = \begin{cases} 0 & \text{si } i = 1 \text{ y } j = 0 \\ 1 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$H_{\leftrightarrow}(i, j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Tablas de verdad:
 - Conectivas monarias:

i	$\neg i$
1	0
0	1

- Conectivas binarias:

i	j	$i \wedge j$	$i \vee j$	$i \rightarrow j$	$i \leftrightarrow j$
0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

- Interpretaciones: Funciones del conjunto de las variables proposicionales en el conjunto de valores de verdad.

$$I : \mathbf{VP} \longrightarrow \mathbb{B}$$

- Para cada interpretación I existe una única función que da significado a las fórmulas, $I : \mathbf{Prop} \longrightarrow \mathbb{B}$, tal que:

$$I(\mathbf{F}) = \begin{cases} I(\mathbf{F}) & \text{si } \mathbf{F} \text{ es atómica} \\ \mathbf{H}_{\neg}(I(\mathbf{G})) & \text{si } \mathbf{F} = \neg \mathbf{G} \\ \mathbf{H}_{*}(I(\mathbf{G}), I(\mathbf{H})) & \text{si } \mathbf{F} = \mathbf{G} * \mathbf{H} \end{cases}$$

Donde $*$ es cualquier conectiva binaria.

- Interpretaciones de fórmulas:

- $F = (p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)$ en la interpretación I_1 tal que $I_1(p) = I_1(r) = 1$ e $I_1(q) = 0$:

p	q	r	$p \vee q$	$\neg q$	$\neg q \vee r$	F
1	0	1	1	1	1	1

- $F = (p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)$ en la interpretación I_2 tal que $I_2(r) = 1$ e $I_2(p) = I_2(q) = 0$:

p	q	r	$p \vee q$	$\neg q$	$\neg q \vee r$	F
0	0	1	0	1	1	0

- Si dos interpretaciones I_1 e I_2 coinciden en todas las variables proposicionales de una fórmula F entonces $I_1(F) = I_2(F)$.

- Modelo de una fórmula:
 - Una interpretación I es modelo de una fórmula F si $I(F) = 1$
 - Se escribe $I \models F$
 - Si $I_1(p) = I_1(r) = 1$ e $I_1(q) = 0$, entonces $I_1 \models (p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)$
 - Si $I_2(r) = 1$ e $I_2(p) = I_2(q) = 0$, entonces $I_2 \not\models (p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)$
- Una fórmula es satisfacible si tiene modelos:
 - La fórmula $(p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)$ es satisfacible.
- Una fórmula es insatisfacible si no tiene modelos:
 - La fórmula $p \wedge \neg p$ es insatisfacible

Tautologías y contradicciones

- Una fórmula **F** es una tautología o válida ($\models \mathbf{F}$), si toda interpretación es un modelo de **F**.
 - La fórmula $(\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{q}) \vee (\mathbf{q} \rightarrow \mathbf{p})$ es una tautología.
- Una fórmula **F** es una contradicción o insatisfacible, si ninguna interpretación es un modelo de **F**.
 - La fórmula $(\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{q}) \wedge \neg(\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{q})$ es una contradicción.
- Una fórmula **F** es contingente, si no es una tautología ni una contradicción.
 - La fórmula $\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{q}$ es contingente.

- Los problemas SAT y TAUT
 - Problema SAT: Dada una fórmula, determinar si es satisfacible.
 - Problema TAUT: Dada una fórmula, determinar si es una tautología.
- Relaciones entre estos dos problemas:
 - $\mathbf{F}$ es una tautología $\iff \neg\mathbf{F}$ es insatisfacible.
 - $\mathbf{F}$ es una tautología $\implies \mathbf{F}$ es satisfacible.
 - $\mathbf{F}$ es satisfacible $\not\implies \neg\mathbf{F}$ es insatisfacible.

Fórmulas equivalentes

- Dos fórmulas **F** y **G** son equivalentes ($\mathbf{F} \equiv \mathbf{G}$), si para toda interpretación **I** se tiene que $\mathbf{I}(\mathbf{F}) = \mathbf{I}(\mathbf{G})$.

- Equivalencias importantes:

- Idempotencia:

$$\mathbf{F} \vee \mathbf{F} \equiv \mathbf{F}$$

$$\mathbf{F} \wedge \mathbf{F} \equiv \mathbf{F}$$

- Conmutatividad:

$$\mathbf{F} \vee \mathbf{G} \equiv \mathbf{G} \vee \mathbf{F}$$

$$\mathbf{F} \wedge \mathbf{G} \equiv \mathbf{G} \wedge \mathbf{F}$$

- Asociatividad:

$$\mathbf{F} \vee (\mathbf{G} \vee \mathbf{H}) \equiv (\mathbf{F} \vee \mathbf{G}) \vee \mathbf{H}$$

$$\mathbf{F} \wedge (\mathbf{G} \wedge \mathbf{H}) \equiv (\mathbf{F} \wedge \mathbf{G}) \wedge \mathbf{H}$$

- Absorción:

$$\mathbf{F} \wedge (\mathbf{F} \vee \mathbf{G}) \equiv \mathbf{F}$$

$$\mathbf{F} \vee (\mathbf{F} \wedge \mathbf{G}) \equiv \mathbf{F}$$

Fórmulas equivalentes

- Dos fórmulas **F** y **G** son equivalentes ($\mathbf{F} \equiv \mathbf{G}$), si para toda interpretación **I** se tiene que $\mathbf{I}(\mathbf{F}) = \mathbf{I}(\mathbf{G})$.

- Equivalencias importantes:

- Distributividad:

$$\mathbf{F} \vee (\mathbf{G} \wedge \mathbf{H}) \equiv (\mathbf{F} \vee \mathbf{G}) \wedge (\mathbf{F} \vee \mathbf{H})$$

$$\mathbf{F} \wedge (\mathbf{G} \vee \mathbf{H}) \equiv (\mathbf{F} \wedge \mathbf{G}) \vee (\mathbf{F} \wedge \mathbf{H})$$

- Doble negación:

$$\neg\neg\mathbf{F} \equiv \mathbf{F}$$

- Leyes de De Morgan:

$$\neg(\mathbf{F} \wedge \mathbf{G}) \equiv \neg\mathbf{F} \vee \neg\mathbf{G}$$

$$\neg(\mathbf{F} \vee \mathbf{G}) \equiv \neg\mathbf{F} \wedge \neg\mathbf{G}$$

- Leyes de tautologías. Si **F** es una tautología:

$$\mathbf{F} \wedge \mathbf{G} \equiv \mathbf{G}$$

$$\mathbf{F} \vee \mathbf{G} \equiv \mathbf{F}$$

- Leyes de contradicciones. Si **F** es una contradicción:

$$\mathbf{F} \wedge \mathbf{G} \equiv \mathbf{F}$$

$$\mathbf{F} \vee \mathbf{G} \equiv \mathbf{G}$$

Propiedades de la equivalencia lógica

- La equivalencia lógica es una relación de equivalencia
 - Reflexividad: $\mathbf{F} \equiv \mathbf{F}$
 - Simetría: Si $\mathbf{F} \equiv \mathbf{G}$, entonces $\mathbf{G} \equiv \mathbf{F}$.
 - Transitividad: Si $\mathbf{F} \equiv \mathbf{G}$ y $\mathbf{G} \equiv \mathbf{H}$, entonces $\mathbf{F} \equiv \mathbf{H}$.
- Relación entre equivalencia y bicondicional

$$\mathbf{F} \equiv \mathbf{G} \text{ si y solo si } \models \mathbf{F} \leftrightarrow \mathbf{G}$$

- Principio de sustitución de fórmulas equivalentes: Si en una fórmula $\mathbf{F}$ se sustituye una subfórmula $\mathbf{G}$ por otra lógicamente equivalente $\mathbf{G}'$, entonces la fórmula obtenida $\mathbf{F}'$ es lógicamente equivalente a la original.
 - $\mathbf{F} = \neg(\mathbf{p} \wedge \mathbf{q}) \rightarrow \neg(\mathbf{p} \wedge \neg\neg\mathbf{r})$
 - $\mathbf{G} = \neg(\mathbf{p} \wedge \neg\neg\mathbf{r})$
 - $\mathbf{G}' = \neg\mathbf{p} \vee \neg\mathbf{r}$
 - $\mathbf{F}' = \neg(\mathbf{p} \wedge \mathbf{q}) \rightarrow \neg\mathbf{p} \vee \neg\mathbf{r}$

Conjuntos de fórmulas

- Modelo de un conjunto de fórmulas:
 - Una interpretación I es modelo de un conjunto de fórmulas S ($I \models S$), si para toda $F \in S$ se tiene que $I \models F$.

• Sea $S = \{F_1 = (p \vee q) \wedge (\neg q \vee r), F_2 = p \rightarrow r\}$

- La interpretación I_1 tal que $I_1(p) = I_1(r) = 1$ e $I_1(q) = 0$ es modelo de S .

p	q	r	$p \vee q$	$\neg q$	$\neg q \vee r$	$p \rightarrow r$	F_1	F_2
1	0	1	1	1	1	1	1	1

- La interpretación I_2 tal que $I_2(p) = I_2(q) = 0$ e $I_2(r) = 1$ no es modelo de S .

p	q	r	$p \vee q$	$\neg q$	$\neg q \vee r$	$p \rightarrow r$	F_1	F_2
0	0	1	0	1	1	1	0	1

Consistencia y consecuencia lógica

- Un conjunto **S** es consistente, si tiene algún modelo.
 - El conjunto $\{(\mathbf{p} \vee \mathbf{q}) \wedge (\neg \mathbf{q} \vee \mathbf{r}), \mathbf{p} \rightarrow \mathbf{r}\}$ es consistente.
- Un conjunto **S** es inconsistente, si no tiene ningún modelo.
 - El conjunto $\{\mathbf{p} \vee \mathbf{q}, \neg \mathbf{p} \vee \mathbf{q}, \mathbf{p} \vee \neg \mathbf{q}, \neg \mathbf{p} \vee \neg \mathbf{q}\}$ es inconsistente.
- Una fórmula **F** es consecuencia lógica de un conjunto de fórmulas **S** ($\mathbf{S} \models \mathbf{F}$) si todos los modelos de **S** son a su vez modelos de **F**.
 - $\{\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{q}, \mathbf{q} \rightarrow \mathbf{r}\} \models \mathbf{p} \rightarrow \mathbf{r}$
 - $\{\mathbf{p}\} \not\models \mathbf{p} \wedge \mathbf{q}$

Propiedades de la consecuencia lógica

- Propiedades básicas de la relación de consecuencia lógica:
 - Reflexividad: $S \models S$.
 - Monotonía: Si $S_1 \models F$ y $S_1 \subset S_2$, entonces $S_2 \models F$.
 - Transitividad: Si $S \models F$ y $\{F\} \models G$, entonces $S \models G$.
- Relación entre consecuencia, validez, satisfacibilidad y consistencia. Las siguientes condiciones son equivalentes:
 - $\{F_1, \dots, F_n\} \models G$.
 - $\models F_1 \wedge \dots \wedge F_n \rightarrow G$.
 - $\neg(F_1 \wedge \dots \wedge F_n \rightarrow G)$ es insatisfacible.
 - $\{F_1, \dots, F_n, \neg G\}$ es inconsistente.

- Un cálculo lógico ($\vdash$) es un procedimiento de decisión que permite comprobar la validez de una fórmula.
 - También permiten comprobar la satisfacibilidad, la consistencia y la consecuencia lógica.
- La combinación exhaustiva de todos los valores de verdad de las variables proposicionales y el cálculo del valor de verdad mediante las tablas de verdad es un ejemplo de cálculo lógico.
- Otros cálculos lógicos: tableros semánticos, secuentes, deducción natural, resolución, ...

Propiedades de los cálculos lógicos

- Un cálculo lógico es correcto ($\vdash \implies \models$), si toda fórmula que se puede demostrar que es válida con el cálculo lógico, es válida en la lógica.
 - Todo cálculo lógico debería cumplir esta propiedad.
- Un cálculo lógico es completo ($\models \implies \vdash$), si para toda fórmula válida en la lógica, se puede demostrar su validez utilizando únicamente el cálculo lógico.
- Existen cálculos lógicos para la lógica proposicional que son correctos y completos.
 - Los cálculos lógicos mencionados para la lógica proposicional son correctos y completos: tablas de verdad, tableros semánticos, secuentes, deducción natural, resolución, ...
- La lógica proposicional es decidible: existen procedimientos capaces de decidir si una fórmula es válida o no, en un número finito de pasos.

Lógica de primer orden

Limitación expresiva de la lógica proposicional

- Si Sevilla es vecina de Cádiz, entonces Cádiz es vecina de Sevilla. Sevilla es vecina de Cádiz. Por tanto Cádiz es vecina de Sevilla.
 - Formalización en lógica proposicional: $\{\mathbf{SvC} \rightarrow \mathbf{CvS}, \mathbf{SvC}\} \models \mathbf{CvS}$
- Si una provincia es vecina de otra, entonces la segunda es vecina de la primera. Sevilla es vecina de Cádiz. Por tanto Cádiz es vecina de Sevilla.
 - Formalización en lógica proposicional: Imposible
 - Es necesario poder hacer referencia a individuos genéricos caracterizados por funciones.
 - *Ser una provincia*
 - *Ser vecinas*

- Símbolos lógicos
 - Variables: $x, y, z, \dots, x_1, x_2, \dots$
 - Conectivas lógicas: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$
 - Cuantificadores:
 - Cuantificador universal: $\forall$
 - Cuantificador existencial: $\exists$
- Símbolos propios
 - Constantes de individuos: $a, b, c, \dots, a_1, a_2, \dots$
 - Predicados (con aridad): $P, Q, R, \dots, P_1, P_2, \dots$
 - Funciones (con aridad): $f, g, h, \dots, f_1, f_2, \dots$
- Símbolos auxiliares: $(,), ,$

Lenguaje de primer orden

- Notación:
 - Lenguajes de primer orden: $L, L_1, \dots$
 - Conjunto de las variables: **Var**
- Observaciones:
 - Un lenguaje de primer orden se describe con sus constantes, predicados y funciones propias. Los símbolos lógicos siempre están presentes en el lenguaje.
 - Los símbolos de predicado de aridad 1 (un argumento) se llaman propiedades.
 - Los símbolos de predicado de aridad mayor que 1 (dos o más argumentos) se llaman relaciones.
 - La mayoría de los lenguajes de primer orden incluyen el predicado de igualdad (=).

- Lenguaje de la vecindad entre provincias:
 - Símbolos de constantes: {**Sevilla, Cadiz**}
 - Símbolos de predicado: {**provincia, vecinas**}
 - Símbolos de función: { }
- Lenguaje de la aritmética natural:
 - Símbolos de constantes: {**0, 1, ...**}
 - Símbolos de predicado: {**<, ≤, =, ...**}
 - Símbolos de función: {**+, -, ***}

- Términos en un lenguaje de primer orden L :
 - Las variables son términos de L .
 - Las constantes de L son términos de L .
 - Si f es un símbolo de función de L de aridad n (o n -aria) y $t_1, \dots, t_n$ son términos de L , entonces $f(t_1, \dots, t_n)$ es un término de L .
- Notación:
 - Términos de un lenguaje de primer orden: $t, s, \dots, t_1, t_2, \dots$
 - Conjunto de términos del lenguaje L : $\text{Term}(L)$
- Ejemplos:
 - En el lenguaje de la vecindad entre provincias: **Sevilla, Cadiz**.
 - En el lenguaje de la aritmética: $+(*(x, 1), y)$ (o $(x * 1) + y$).

- Fórmulas atómicas en un lenguaje de primer orden L :
 - Si P es un símbolo de predicado n -ario y $t_1, \dots, t_n$ son términos del lenguaje L , entonces $P(t_1, \dots, t_n)$ es una fórmula atómica.
- Notación:
 - Fórmulas atómicas de un lenguaje de primer orden:
 $A, B, \dots, A_1, A_2, \dots$
 - Conjunto de fórmulas atómicas del lenguaje L : $\text{Atom}(L)$
- Ejemplos:
 - En el lenguaje de la vecindad entre provincias: $\text{provincia}(x)$, $\text{vecinas}(\text{Cadiz}, y)$.
 - En el lenguaje de la aritmética: $x < (2 * s(x))$ (o $x < 2 * s(x)$).

- Fórmulas en un lenguaje de primer orden **L**:
 - Las fórmulas atómicas de **L** son fórmulas en **L**.
 - Si **F** y **G** son fórmulas en **L**, entonces $(\neg F)$, $(F \wedge G)$, $(F \vee G)$, $(F \rightarrow G)$ y $(F \leftrightarrow G)$ son fórmulas en **L**.
 - Si **F** es una fórmula en **L**, entonces $(\forall x F)$ y $(\exists x F)$ son fórmulas en **F**.
- Notación:
 - Fórmulas en un lenguaje de primer orden: **F**, **G**, ..., **F**₁, **F**₂, ...
 - Conjunto de las fórmulas del lenguaje **L**: **Form(L)**
 - Se siguen los mismo criterios para eliminar paréntesis que en la lógica proposicional, con $\forall$ y $\exists$ con la mayor precedencia.
- Ejemplos:
 - En el lenguaje de la vecindad entre provincias: $\forall x \text{ provincia}(x) \forall x (\exists y \text{ vecinas}(x, y))$.
 - En el lenguaje de la aritmética: $\exists x (\forall y \leq (x, y))$.

- Conjunto de variables de un término:

$$\mathbf{V}(t) = \begin{cases} \emptyset & \text{si } t \text{ es una constante} \\ \{x\} & \text{si } t \text{ es la variable } x \\ \mathbf{V}(t_1) \cup \dots \cup \mathbf{V}(t_n) & \text{si } t \text{ es } f(t_1, \dots, t_n) \end{cases}$$

- Conjunto de variables de una fórmula:

$$\mathbf{V}(F) = \begin{cases} \mathbf{V}(t_1) \cup \dots \cup \mathbf{V}(t_n) & \text{si } F \text{ es } P(t_1, \dots, t_n) \\ \mathbf{V}(G) & \text{si } F \text{ es } \neg G \\ \mathbf{V}(G) \cup \mathbf{V}(H) & \text{si } F \text{ es } G * H \\ \mathbf{V}(G) & \text{si } F \text{ es } \forall x G \\ \mathbf{V}(G) & \text{si } F \text{ es } \exists x G \end{cases}$$

Donde * es una conectiva binaria.

- Ejemplos

- El conjunto de variables de $\forall x (R(x) \rightarrow P(y))$ es $\{x, y\}$
- El conjunto de variables de $\forall x (R(a) \rightarrow P(y))$ es $\{y\}$

- Apariciones libres y ligadas en una fórmula:
 - Una aparición de una variable x es ligada si ocurre en una subfórmula de la forma $\forall x G$ o $\exists x G$.
 - Una aparición de una variable x es libre si no es ligada.
- Ejemplos:
 - $\forall x (P(\underline{x}) \rightarrow R(\underline{x}, y)) \rightarrow (\exists y P(\underline{y}) \rightarrow R(y, x))$
 - $\exists x R(\underline{x}, y) \vee \exists y P(\underline{y})$
 - $\forall x (P(\underline{x}) \rightarrow \exists y R(\underline{x}, \underline{y}))$
 - $\forall z (P(x) \rightarrow R(x, y))$

- Variables libres y ligadas en una fórmula:
 - Una variable x es libre si tiene una aparición libre.
 - Una variable x es ligada si tiene una aparición ligada.
 - Conjunto de las variables libres de una fórmula F es:

$$VL(F) = \begin{cases} V(t_1) \cup \dots \cup V(t_n) & \text{si } F \text{ es } P(t_1, \dots, t_n) \\ VL(G) & \text{si } F \text{ es } \neg G \\ VL(G) \cup VL(H) & \text{si } F \text{ es } G * H \\ VL(G) - \{x\} & \text{si } F \text{ es } \forall x G \\ VL(G) - \{x\} & \text{si } F \text{ es } \exists x G \end{cases}$$

Donde $*$ es una conectiva binaria.

- Ejemplos:

	V.Ligadas	V.Libres
$\forall x (P(x) \rightarrow R(x, y)) \rightarrow (\exists y P(y) \rightarrow R(y, x))$	$\{x, y\}$	$\{x, y\}$
$\forall x (P(x) \rightarrow \exists y R(x, y))$	$\{x, y\}$	
$\forall z (P(x) \rightarrow R(x, y))$		$\{x, y\}$

Fórmulas cerradas y abiertas

- Una fórmula cerrada (o sentencia) es una fórmula sin variables libres.
- Una fórmula abierta es una fórmula con variables libres.
- Ejemplos
 - $\forall x (P(x) \rightarrow \exists y R(x, y))$ es una fórmula cerrada.
 - $\exists x R(x, y) \vee \forall y P(y)$ es una fórmula abierta.

- Una estructura del lenguaje de primer orden $\mathbf{L}$ es un par $\mathcal{I} = (\mathbf{U}, \mathbf{I})$ tal que:
 - $\mathbf{U}$ es un conjunto no vacío, denominado universo de la estructura.
 - $\mathbf{I}$ es una función cuyo dominio es el conjunto de los símbolos propios del lenguaje $\mathbf{L}$ tal que:
 - Si $\mathbf{c}$ es una constante en $\mathbf{L}$, entonces $\mathbf{I}(\mathbf{c}) \in \mathbf{U}$.
 - Si $\mathbf{f}$ es un símbolo de función n -ario en $\mathbf{L}$, entonces $\mathbf{I}(\mathbf{f})$ es una función de $\mathbf{U}^n$ en $\mathbf{U}$.
 - Si $\mathbf{P}$ es un símbolo de predicado 0 -ario en $\mathbf{L}$, entonces $\mathbf{I}(\mathbf{P}) \in \{0, 1\}$.
 - Si $\mathbf{P}$ es un símbolo de predicado n -ario en $\mathbf{L}$ con $n > 0$, entonces $\mathbf{I}(\mathbf{P})$ es un subconjunto de $\mathbf{U}^n$.
- Una estructura proporciona una interpretación $\mathbf{I}$ de los símbolos propios de un lenguaje $\mathbf{L}$ en un conjunto de individuos $\mathbf{U}$.

- Sea L el lenguaje con los siguientes símbolos propios:
 - Una constante: 0
 - Un símbolo de función monaria: s .
 - Un símbolo de función binaria: $\odot$.
 - Un símbolo de relación binaria: $\prec$.
- Primera estructura para L : $U_1 = \mathbb{N}$
 - $I_1(0) = 0$
 - $I_1(s) = \{n \implies n + 1 : n \in \mathbb{N}\}$
 - $I_1(\odot) = \{(n, m) \implies n + m : n, m \in \mathbb{N}\}$
 - $I_1(\prec) = \{(n, m) : n, m \in \mathbb{N}; n \leq m\}$
- Segunda estructura para L : $U_2 = [01]^*$ (cadenas de 0 y 1)
 - $I_2(0) = \epsilon$
 - $I_2(s) = \{w \implies w1 : w \in [01]^*\}$
 - $I_2(\odot) = \{(w_1, w_2) \implies w_1w_2 : w_1, w_2 \in [01]^*\}$
 - $I_2(\prec) = \{(w_1, w_2) : w_1, w_2 \in [01]^*; w_1 \text{ es prefijo de } w_2\}$

- Una asignación $\mathbf{A}$ en una estructura $\mathcal{I} = (\mathbf{U}, \mathbf{I})$ para un lenguaje $\mathbf{L}$ es función del conjunto de las variables $\mathbf{Var}$ en el universo de la estructura $\mathbf{U}$.
 - Una asignación hace corresponder a cada variable un individuo del universo de la estructura.
- Una interpretación de un lenguaje $\mathbf{L}$ es un par $(\mathcal{I}, \mathbf{A})$ formado por una estructura $\mathcal{I}$ de $\mathbf{L}$ y una asignación $\mathbf{A}$ en $\mathcal{I}$.

- Dada una estructura $\mathcal{I} = (\mathbf{U}, \mathbf{I})$ del lenguaje $\mathbf{L}$ y una asignación $\mathbf{A}$ en $\mathcal{I}$, la función de evaluación de términos $\mathcal{I}_{\mathbf{A}}$ es:

$$\mathcal{I}_{\mathbf{A}}(\mathbf{t}) = \begin{cases} \mathbf{I}(\mathbf{c}) & \text{si } \mathbf{t} \text{ es la constante } \mathbf{c} \\ \mathbf{A}(\mathbf{x}) & \text{si } \mathbf{t} \text{ es la variable } \mathbf{x} \\ \mathbf{I}(\mathbf{f})(\mathcal{I}_{\mathbf{A}}(\mathbf{t}_1), \dots, \mathcal{I}_{\mathbf{A}}(\mathbf{t}_n)) & \text{si } \mathbf{t} \text{ es } \mathbf{f}(\mathbf{t}_1, \dots, \mathbf{t}_n) \end{cases}$$

- $\mathcal{I}_{\mathbf{A}}(\mathbf{t})$ es el valor de $\mathbf{t}$ en $\mathcal{I}$ respecto de $\mathbf{A}$.

Evaluación de términos

- Consideramos el lenguaje $\mathbf{L} = \{\mathbf{0}, \mathbf{s}, \odot, \prec\}$ y el término $\mathbf{t} = \mathbf{s}(\mathbf{x} \odot \mathbf{s}(\mathbf{0}))$.
- En la estructura $\mathcal{I}^1 = (\mathbb{N}, \mathbf{l}_1)$ con $\mathbf{A}(\mathbf{x}) = 3$

$$\begin{aligned}\mathcal{I}^1_{\mathbf{A}}(\mathbf{t}) &= \mathcal{I}^1_{\mathbf{A}}(\mathbf{s}(\mathbf{x} \odot \mathbf{s}(\mathbf{0}))) \\ &= \mathbf{l}_1(\mathbf{s})(\mathbf{l}_1(\odot)(\mathbf{A}(\mathbf{x}), \mathbf{l}_1(\mathbf{s})(\mathbf{l}_1(\mathbf{0})))) \\ &= +^1(3 + +^1(0)) \\ &= 5\end{aligned}$$

- En la estructura $\mathcal{I}^2 = ([01]^*, \mathbf{l}_2)$ con $\mathbf{A}(\mathbf{x}) = 10$

$$\begin{aligned}\mathcal{I}^2_{\mathbf{A}}(\mathbf{t}) &= \mathcal{I}^2_{\mathbf{A}}(\mathbf{s}(\mathbf{x} \odot \mathbf{s}(\mathbf{0}))) \\ &= \mathbf{l}_2(\mathbf{s})(\mathbf{l}_2(\odot)(\mathbf{A}(\mathbf{x}), \mathbf{l}_2(\mathbf{s})(\mathbf{l}_2(\mathbf{0})))) \\ &= @^1(10 @ @^1(\epsilon)) \\ &= 1011\end{aligned}$$

Evaluación de fórmulas

- Dada una estructura $\mathcal{I} = (\mathbf{U}, \mathbf{I})$ del lenguaje $\mathbf{L}$ y una asignación $\mathbf{A}$ en $\mathcal{I}$, la función de evaluación de fórmulas $\mathcal{I}_{\mathbf{A}}$ es:

$$\mathcal{I}_{\mathbf{A}}(\mathbf{P}(t_1, \dots, t_n)) = \mathbf{H}_{\mathbf{I}(\mathbf{P})}(\mathcal{I}_{\mathbf{A}}(t_1), \dots, \mathcal{I}_{\mathbf{A}}(t_n))$$

$$\mathcal{I}_{\mathbf{A}}(\neg \mathbf{G}) = \mathbf{H}_{\neg}(\mathcal{I}_{\mathbf{A}}(\mathbf{G}))$$

$$\mathcal{I}_{\mathbf{A}}(\mathbf{G} * \mathbf{H}) = \mathbf{H}_*(\mathcal{I}_{\mathbf{A}}(\mathbf{G}), \mathcal{I}_{\mathbf{A}}(\mathbf{H}))$$

$$\mathcal{I}_{\mathbf{A}}(\forall x \mathbf{G}) = \begin{cases} 1 & \text{si para todo } \mathbf{u} \in \mathbf{U} \\ & \text{se tiene } \mathcal{I}_{\mathbf{A}[x/\mathbf{u}]}(\mathbf{G}) = 1 \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

$$\mathcal{I}_{\mathbf{A}}(\exists x \mathbf{G}) = \begin{cases} 1 & \text{si existe un } \mathbf{u} \in \mathbf{U} \\ & \text{tal que } \mathcal{I}_{\mathbf{A}[x/\mathbf{u}]}(\mathbf{G}) = 1 \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

Donde $*$ es una conectiva binaria.

- $\mathcal{I}_{\mathbf{A}}(\mathbf{F})$ es el valor de $\mathbf{F}$ en $\mathcal{I}$ respecto de $\mathbf{A}$.

- Si $\mathbf{R}$ es un subconjunto de $\mathbf{U}^n$, entonces la función de verdad de $\mathbf{R}$ es:

$$H_{\mathbf{R}}(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n) \in \mathbf{R} \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

- Si $\mathbf{A}$ es una asignación en la estructura $(\mathbf{U}, \mathbf{I})$, $\mathbf{x} \in \mathbf{Var}$ y $\mathbf{u} \in \mathbf{U}$, entonces la variante de la asignación $\mathbf{A}$ para $\mathbf{x}$ igual a $\mathbf{u}$ es:

$$\mathbf{A}[\mathbf{x}/\mathbf{u}](\mathbf{y}) = \begin{cases} \mathbf{u} & \text{si } \mathbf{y} \text{ es la variable } \mathbf{x} \\ \mathbf{A}(\mathbf{y}) & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

- Evaluación de $\forall x \exists y P(x, y)$ en la estructura $\mathcal{I} = (\mathbf{U}, \mathbf{I})$ tal que $\mathbf{U} = \{1, 2\}$ e $\mathbf{I}(P) = \{(1, 1), (2, 2)\}$:

$$\mathcal{I}_{\mathbf{A}}(\forall x \exists y P(x, y)) = \begin{cases} 1 & \text{si } \mathcal{I}_{\mathbf{A}[x/1]}(\exists y P(x, y)) = 1 \\ & \text{y } \mathcal{I}_{\mathbf{A}[x/2]}(\exists y P(x, y)) = 1 \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

$$\mathcal{I}_{\mathbf{A}[x/1]}(\exists y P(x, y)) = \begin{cases} 1 & \text{si } \mathcal{I}_{\mathbf{A}[y/1, x/1]}(P(x, y)) = 1 \vee \\ & \circ \mathcal{I}_{\mathbf{A}[y/2, x/1]}(P(x, y)) = 1 \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{\mathbf{A}[y/1, x/1]}(P(x, y)) &= \mathbf{H}_{\mathbf{I}(P)}(\mathcal{I}_{\mathbf{A}[y/1, x/1]}(x), \mathcal{I}_{\mathbf{A}[y/1, x/1]}(y)) \\ &= \mathbf{H}_{\mathbf{I}(P)}(\mathbf{A}[y/1, x/1](x), \mathbf{A}[y/1, x/1](y)) \\ &= \mathbf{H}_{\mathbf{I}(P)}(1, 1) \\ &= 1 \text{ pues } (1, 1) \in \mathbf{I}(P) \end{aligned}$$

Por tanto $\mathcal{I}_{\mathbf{A}[x/1]}(\exists y P(x, y)) = 1$.

- Evaluación de $\forall x \exists y P(x, y)$ en la estructura $\mathcal{I} = (\mathbf{U}, \mathbf{I})$ tal que $\mathbf{U} = \{1, 2\}$ e $\mathbf{I}(P) = \{(1, 1), (2, 2)\}$:

$$\mathcal{I}_{\mathbf{A}}(\forall x \exists y P(x, y)) = \begin{cases} 1 & \text{si } \mathcal{I}_{\mathbf{A}[x/1]}(\exists y P(x, y)) = 1 \checkmark \\ & \text{y } \mathcal{I}_{\mathbf{A}[x/2]}(\exists y P(x, y)) = 1 \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

$$\mathcal{I}_{\mathbf{A}[x/2]}(\exists y P(x, y)) = \begin{cases} 1 & \text{si } \mathcal{I}_{\mathbf{A}[y/1, x/2]}(P(x, y)) = 1 \times \\ & \text{o } \mathcal{I}_{\mathbf{A}[y/2, x/2]}(P(x, y)) = 1 \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{\mathbf{A}[y/1, x/2]}(P(x, y)) &= \mathbf{H}_{\mathbf{I}(P)}(\mathcal{I}_{\mathbf{A}[y/1, x/2]}(x), \mathcal{I}_{\mathbf{A}[y/1, x/2]}(y)) \\ &= \mathbf{H}_{\mathbf{I}(P)}(\mathbf{A}[y/1, x/2](x), \mathbf{A}[y/1, x/2](y)) \\ &= \mathbf{H}_{\mathbf{I}(P)}(2, 1) \\ &= 0 \text{ pues } (2, 1) \notin \mathbf{I}(P) \end{aligned}$$

- Evaluación de $\forall x \exists y P(x, y)$ en la estructura $\mathcal{I} = (\mathbf{U}, \mathbf{I})$ tal que $\mathbf{U} = \{1, 2\}$ e $\mathbf{I}(P) = \{(1, 1), (2, 2)\}$:

$$\mathcal{I}_{\mathbf{A}}(\forall x \exists y P(x, y)) = \begin{cases} 1 & \text{si } \mathcal{I}_{\mathbf{A}[x/1]}(\exists y P(x, y)) = 1 \checkmark \\ & \text{y } \mathcal{I}_{\mathbf{A}[x/2]}(\exists y P(x, y)) = 1 \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

$$\mathcal{I}_{\mathbf{A}[x/2]}(\exists y P(x, y)) = \begin{cases} 1 & \text{si } \mathcal{I}_{\mathbf{A}[y/1, x/2]}(P(x, y)) = 1 \times \\ & \text{o } \mathcal{I}_{\mathbf{A}[y/2, x/2]}(P(x, y)) = 1 \checkmark \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{\mathbf{A}[y/2, x/2]}(P(x, y)) &= \mathbf{H}_{\mathbf{I}(P)}(\mathcal{I}_{\mathbf{A}[y/2, x/2]}(x), \mathcal{I}_{\mathbf{A}[y/2, x/2]}(y)) \\ &= \mathbf{H}_{\mathbf{I}(P)}(\mathbf{A}[y/2, x/2](x), \mathbf{A}[y/2, x/2](y)) \\ &= \mathbf{H}_{\mathbf{I}(P)}(2, 2) \\ &= 1 \text{ pues } (2, 2) \in \mathbf{I}(P) \end{aligned}$$

Por tanto $\mathcal{I}_{\mathbf{A}[x/2]}(\exists y P(x, y)) = 1$.

- Evaluación de $\forall x \exists y P(x, y)$ en la estructura $\mathcal{I} = (\mathbf{U}, \mathbf{I})$ tal que $\mathbf{U} = \{1, 2\}$ e $\mathbf{I}(P) = \{(1, 1), (2, 2)\}$:

$$\mathcal{I}_A(\forall x \exists y P(x, y)) = \begin{cases} 1 & \text{si } \mathcal{I}_{A[x/1]}(\exists y P(x, y)) = 1 \checkmark \\ & \text{y } \mathcal{I}_{A[x/2]}(\exists y P(x, y)) = 1 \checkmark \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

Por tanto $\mathcal{I}(\forall x \exists y P(x, y)) = 1$.

- Evaluación de $\forall x (g(g(x)) = x)$ en la estructura $\mathcal{I} = (\mathbf{U}, \mathbf{I})$ tal que $\mathbf{U} = \{1, 2\}$ e $\mathbf{I}(g) = \{1 \implies 2, 2 \implies 1\}$:

$$\mathcal{I}_A(\forall x (g(g(x)) = x)) = \begin{cases} 1 & \text{si } \mathcal{I}_{A[x/1]}(g(g(x)) = x) = 1 \\ & \text{y } \mathcal{I}_{A[x/2]}(g(g(x)) = x) = 1 \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{A[x/1]}(g(g(x)) = x) &= H_=(\mathcal{I}_{A[x/1]}(g(g(x))), \mathcal{I}_{A[x/1]}(x)) \\ &= H_=(\mathbf{I}(g)(\mathcal{I}_{A[x/1]}(g(x))), 1) \\ &= H_=(\mathbf{I}(g)(\mathbf{I}(g)(\mathcal{I}_{A[x/1]}(x))), 1) \\ &= H_=(\mathbf{I}(g)(\mathbf{I}(g)(1)), 1) \\ &= H_=(\mathbf{I}(g)(2), 1) \\ &= H_=(1, 1) \\ &= 1 \end{aligned}$$

- Evaluación de $\forall x (g(g(x)) = x)$ en la estructura $\mathcal{I} = (\mathbf{U}, \mathbf{I})$ tal que $\mathbf{U} = \{1, 2\}$ e $\mathbf{I}(g) = \{1 \implies 2, 2 \implies 1\}$:

$$\mathcal{I}_A(\forall x (g(g(x)) = x)) = \begin{cases} 1 & \text{si } \mathcal{I}_{A[x/1]}(g(g(x)) = x) = 1 \checkmark \\ & \text{y } \mathcal{I}_{A[x/2]}(g(g(x)) = x) = 1 \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{A[x/2]}(g(g(x)) = x) &= H_=(\mathcal{I}_{A[x/2]}(g(g(x))), \mathcal{I}_{A[x/2]}(x)) \\ &= H_=(\mathbf{I}(g)(\mathcal{I}_{A[x/2]}(g(x))), 2) \\ &= H_=(\mathbf{I}(g)(\mathbf{I}(g)(\mathcal{I}_{A[x/2]}(x))), 2) \\ &= H_=(\mathbf{I}(g)(\mathbf{I}(g)(2)), 2) \\ &= H_=(\mathbf{I}(g)(1), 2) \\ &= H_=(2, 2) \\ &= 1 \end{aligned}$$

- Evaluación de $\forall x (g(g(x)) = x)$ en la estructura $\mathcal{I} = (\mathbf{U}, \mathbf{I})$ tal que $\mathbf{U} = \{1, 2\}$ e $\mathbf{I}(g) = \{1 \implies 2, 2 \implies 1\}$:

$$\mathcal{I}_A(\forall x (g(g(x)) = x)) = \begin{cases} 1 & \text{si } \mathcal{I}_{A[x/1]}(g(g(x)) = x) = 1 \checkmark \\ & \text{y } \mathcal{I}_{A[x/2]}(g(g(x)) = x) = 1 \checkmark \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

Por tanto $\mathcal{I}_A(\forall x (g(g(x)) = x)) = 1$.

- Dependencia del Universo.

Sea $\mathbf{F} = \forall x \exists y \mathbf{R}(x, y)$, entonces:

- $\mathcal{I}_A(\mathbf{F}) = 1$ con $\mathcal{I} = (\mathbb{Z}, I)$, $I(\mathbf{R}) = >$ y $\mathbf{A}$ una asignación.
- $\mathcal{I}_A(\mathbf{F}) = 0$ con $\mathcal{I} = (\mathbb{N}, I)$, $I(\mathbf{R}) = >$ y $\mathbf{A}$ una asignación.

- Dependencia de la Estructura.

Sea $\mathbf{F} = \exists x \forall y \mathbf{R}(x, y)$, entonces:

- $\mathcal{I}_A(\mathbf{F}) = 1$ con $\mathcal{I} = (\mathbb{N}, I)$, $I(\mathbf{R}) = \leq$ y $\mathbf{A}$ una asignación.
- $\mathcal{I}_A(\mathbf{F}) = 0$ con $\mathcal{I} = (\mathbb{N}, I)$, $I(\mathbf{R}) = \geq$ y $\mathbf{A}$ una asignación.

- Dependencia de la Asignación.

Sea $\mathbf{F} = \forall y \mathbf{R}(x, y)$, entonces:

- $\mathcal{I}_A(\mathbf{F}) = 1$ con $\mathcal{I} = (\mathbb{N}, I)$, $I(\mathbf{R}) = \leq$ y $\mathbf{A}$ una asignación en $\mathcal{I}$ tal que $\mathbf{A}(x) = 0$.
- $\mathcal{I}_A(\mathbf{F}) = 0$ con $\mathcal{I} = (\mathbb{N}, I)$, $I(\mathbf{R}) = \leq$ y $\mathbf{A}$ una asignación en $\mathcal{I}$ tal que $\mathbf{A}(x) = 1$.

Evaluación de fórmulas

- Sea $\mathbf{t}$ un término de $\mathbf{L}$ e $\mathcal{I}$ una estructura de $\mathbf{L}$:
 - Si $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ son dos asignaciones en $\mathcal{I}$ que coinciden sobre las variables de $\mathbf{t}$, entonces $\mathcal{I}_{\mathbf{A}}(\mathbf{t}) = \mathcal{I}_{\mathbf{B}}(\mathbf{t})$.
 - Si $\mathbf{t}$ no tiene variables, entonces $\mathcal{I}_{\mathbf{A}}(\mathbf{t}) = \mathcal{I}_{\mathbf{B}}(\mathbf{t})$ para cualesquiera asignaciones $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ en $\mathcal{I}$.
- Sea $\mathbf{F}$ una fórmula de $\mathbf{L}$ e $\mathcal{I}$ una estructura de $\mathbf{L}$:
 - Si $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ son dos asignaciones en $\mathcal{I}$ que coinciden sobre las variables libres de $\mathbf{F}$, entonces $\mathcal{I}_{\mathbf{A}}(\mathbf{F}) = \mathcal{I}_{\mathbf{B}}(\mathbf{F})$.
 - Si $\mathbf{F}$ es cerrada, entonces $\mathcal{I}_{\mathbf{A}}(\mathbf{F}) = \mathcal{I}_{\mathbf{B}}(\mathbf{F})$ para cualesquiera asignaciones $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ en $\mathcal{I}$.

Modelo de una fórmula

- Sea $\mathbf{F}$ una fórmula de $\mathbf{L}$ e $\mathcal{I}$ una estructura de $\mathbf{L}$:
 - $(\mathcal{I}, \mathbf{A})$ es una realización de $\mathbf{F}$ ($\mathcal{I}_{\mathbf{A}} \models \mathbf{F}$), si $\mathbf{A}$ es una asignación en $\mathcal{I}$ tal que $\mathcal{I}_{\mathbf{A}}(\mathbf{F}) = 1$.
 - $\mathcal{I}$ es un modelo de $\mathbf{F}$ ($\mathcal{I} \models \mathbf{F}$), si para toda asignación $\mathbf{A}$ en $\mathcal{I}$ se tiene $\mathcal{I}_{\mathbf{A}} \models \mathbf{F}$.
- Ejemplos:
 - Sea $\mathcal{I} = (\mathbb{N}, \mathbf{I})$ una estructura tal que $\mathbf{I}(f) = +$ e $\mathbf{I}(g) = *$.
 - Si $\mathbf{A}$ es una asignación en $\mathcal{I}$ tal que $\mathbf{A}(x) = \mathbf{A}(y) = 2$, entonces $\mathcal{I}_{\mathbf{A}} \models f(x, x) = g(x, x)$.
 - Si $\mathbf{B}$ es una asignación en $\mathcal{I}$ tal que $\mathbf{B}(x) = 1$ y $\mathbf{B}(y) = 2$, entonces $\mathcal{I}_{\mathbf{B}} \not\models f(x, x) = g(x, x)$.
 - $\mathcal{I} \models f(x, y) = f(y, x)$
 - $\mathcal{I} \not\models f(x, y) = g(x, y)$

- Sea F una fórmula de L :
 - F es válida ($\models F$) si toda estructura de L es un modelo de F .
 - F es satisfacible si tiene alguna realización.
 - F es insatisfacible si no tiene ninguna realización.
- Ejemplos:
 - $\exists x P(x) \vee \forall x \neg P(x)$ es válida.
 - $\exists x P(x) \wedge \exists x \neg P(x)$ es satisfacible, pero no válida.
 - $\forall x P(x) \wedge \exists x \neg P(x)$ es insatisfacible.

- Relaciones entre estos conceptos:
 - $\mathbf{F}$ es válida $\iff \neg\mathbf{F}$ es insatisfacible.
 - $\mathbf{F}$ es válida $\implies \mathbf{F}$ es satisfacible.
 - $\mathbf{F}$ es satisfacible $\not\implies \neg\mathbf{F}$ es insatisfacible.
- Sea $\mathbf{F}$ una fórmula en $\mathbf{L}$ y $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ las variables libres de $\mathbf{F}$:
 - $\mathbf{F}$ es válida $\iff \forall \mathbf{x}_1 \dots \forall \mathbf{x}_n \mathbf{F}$ es válida.
La fórmula $\forall \mathbf{x}_1 \dots \forall \mathbf{x}_n \mathbf{F}$ es el cierre universal de $\mathbf{F}$.
 - $\mathbf{F}$ es satisfacible $\iff \exists \mathbf{x}_1 \dots \exists \mathbf{x}_n \mathbf{F}$ es satisfacible.
La fórmula $\exists \mathbf{x}_1 \dots \exists \mathbf{x}_n \mathbf{F}$ es el cierre existencial de $\mathbf{F}$.

Fórmulas equivalentes

- Dos fórmulas $\mathbf{F}$ y $\mathbf{G}$ de un lenguaje $\mathbf{L}$ son equivalentes ($\mathbf{F} \equiv \mathbf{G}$) si para toda estructura $\mathcal{I}$ de $\mathbf{L}$ y toda asignación $\mathbf{A}$ en $\mathcal{I}$ se tiene $\mathcal{I}_{\mathbf{A}}(\mathbf{F}) = \mathcal{I}_{\mathbf{A}}(\mathbf{G})$.

- Equivalencias importantes:

- Las derivadas de las conectivas proposicionales.
- Conmutatividad de los cuantificadores:

$$\forall x \forall y \mathbf{F} \equiv \forall y \forall x \mathbf{F}$$

$$\exists x \exists y \mathbf{F} \equiv \exists y \exists x \mathbf{F}$$

- Cuantificadores con la negación:

$$\forall x (\neg \mathbf{F}) \equiv \neg (\exists x \mathbf{F})$$

$$\exists x (\neg \mathbf{F}) \equiv \neg (\forall x \mathbf{F})$$

- Cuantificador universal con la conjunción:

$$\forall x (\mathbf{F} \wedge \mathbf{G}) \equiv (\forall x \mathbf{F}) \wedge (\forall x \mathbf{G})$$

- Cuantificador existencial con la disyunción:

$$\exists x (\mathbf{F} \vee \mathbf{G}) \equiv (\exists x \mathbf{F}) \vee (\exists x \mathbf{G})$$

- Cuantificador existencial con la implicación:

$$\exists x (\mathbf{F} \rightarrow \mathbf{G}) \equiv (\forall x \mathbf{F}) \rightarrow (\exists x \mathbf{G})$$

- La equivalencia lógica es una relación de equivalencia
 - Reflexividad: $\mathbf{F} \equiv \mathbf{F}$
 - Simetría: Si $\mathbf{F} \equiv \mathbf{G}$, entonces $\mathbf{G} \equiv \mathbf{F}$.
 - Transitividad: Si $\mathbf{F} \equiv \mathbf{G}$ y $\mathbf{G} \equiv \mathbf{H}$, entonces $\mathbf{F} \equiv \mathbf{H}$.
- Principio de sustitución de fórmulas equivalentes: Si en una fórmula $\mathbf{F}$ se sustituye una subfórmula $\mathbf{G}$ por otra lógicamente equivalente $\mathbf{G}'$, entonces la fórmula obtenida $\mathbf{F}'$ es lógicamente equivalente a la original.
 - $\mathbf{F} = \neg(\forall x \mathbf{P}(x)) \rightarrow \exists x \mathbf{Q}(x)$
 - $\mathbf{G} = \neg(\forall x \mathbf{P}(x))$
 - $\mathbf{G}' = \exists y \neg \mathbf{P}(y)$
 - $\mathbf{F}' = \exists y \neg \mathbf{P}(y) \rightarrow \exists x \mathbf{Q}(x)$

Conjuntos de fórmulas

- Modelo de un conjunto de fórmulas. Sea $\mathbf{S}$ un conjunto de fórmulas de $\mathbf{L}$, $\mathcal{I}$ una estructura de $\mathbf{L}$ y $\mathbf{A}$ una asignación en $\mathcal{I}$:
 - $(\mathcal{I}, \mathbf{A})$ es una realización de $\mathbf{S}$ ($\mathcal{I}_{\mathbf{A}} \models \mathbf{S}$) si para toda $\mathbf{F} \in \mathbf{S}$, se tiene que $(\mathcal{I}, \mathbf{A})$ es una realización de $\mathbf{F}$.
 - $\mathcal{I}$ es un modelo de $\mathbf{S}$ ($\mathcal{I} \models \mathbf{S}$) si para toda $\mathbf{F} \in \mathbf{S}$, se tiene que $\mathcal{I} \models \mathbf{F}$.
- Ejemplos:
 - Sea $\mathbf{S} = \{\forall y \mathbf{R}(x, y), \forall y \mathbf{f}(x, y) = y\}$
 - $(\mathcal{I}, \mathbf{A})$ con $\mathcal{I} = (\mathbb{N}, \mathbf{I})$, $\mathbf{I}(\mathbf{R}) = \leq$, $\mathbf{I}(\mathbf{f}) = +$ y $\mathbf{A}(x) = 0$ es una realización de $\mathbf{S}$.
 - $(\mathcal{I}, \mathbf{A})$ con $\mathcal{I} = (\mathbb{N}, \mathbf{I})$, $\mathbf{I}(\mathbf{R}) = <$, $\mathbf{I}(\mathbf{f}) = +$ y $\mathbf{A}(x) = 0$ no es una realización de $\mathbf{S}$.
 - Sea $\mathbf{S} = \{\mathbf{R}(e, y), \mathbf{f}(e, y) = y\}$
 - $\mathcal{I} = (\mathbb{N}, \mathbf{I})$, $\mathbf{I}(\mathbf{R}) = \leq$, $\mathbf{I}(\mathbf{f}) = +$ e $\mathbf{I}(e) = 0$ es un modelo de $\mathbf{S}$.
 - $\mathcal{I} = (\mathbb{N}, \mathbf{I})$, $\mathbf{I}(\mathbf{R}) = <$, $\mathbf{I}(\mathbf{f}) = +$ e $\mathbf{I}(e) = 0$ no es un modelo de $\mathbf{S}$.

- Consistencia de un conjunto de fórmulas. Sea $\mathbf{S}$ un conjunto de fórmulas de $\mathbf{L}$:
 - $\mathbf{S}$ es consistente si tiene alguna realización.
 - $\mathbf{S}$ es inconsistente si no tiene ninguna realización.
- Ejemplos:
 - $\{\forall y R(x, y), \forall y f(x, y) = y\}$ es consistente
 - $\{P(x) \rightarrow Q(x), \forall y P(y), \neg Q(x)\}$ es inconsistente
- Si $\mathbf{S}$ es un conjunto de fórmulas cerradas de $\mathbf{L}$, entonces $\mathbf{S}$ es consistente si y solo si $\mathbf{S}$ tiene algún modelo.

Conjuntos de fórmulas

- Consecuencia lógica. Sea F una fórmula de L y S un conjunto de fórmulas de L :
 - F es consecuencia lógica de S ($S \models F$) si todas las realizaciones de S lo son también de F .
- Ejemplos:
 - $\{\forall x P(x)\} \models P(y)$
 - $\{P(y)\} \not\models \{\forall x P(x)\}$
 - $\{\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)), P(c)\} \models Q(c)$
 - $\{\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)), Q(c)\} \not\models P(c)$
- $S \models F \iff S \cup \{\neg F\}$ es inconsistente.
- Si $S \cup \{F\}$ es un conjunto de fórmulas cerradas de L , entonces son equivalentes:
 - F es consecuencia lógica de S .
 - Todos los modelos de S también lo son de F .

- Un cálculo lógico ($\vdash$) es un procedimiento que permite comprobar la validez de una fórmula.
- Existen cálculos lógicos correctos ($\vdash \implies \models$) y completos ($\models \implies \vdash$) para la lógica de primer orden.
 - Generalmente se trata de extensiones de los cálculos proposicionales incluyendo los cuantificadores: tableros semánticos, secuentes, deducción natural, resolución, ...
- La lógica de primer orden es semidecidible: no existen procedimientos capaces de decidir en un número finito de pasos si una fórmula es válida o no.
 - Existen procedimientos capaces de responder afirmativamente si una fórmula es válida, pero que no son capaces de dar respuesta cuando no lo es.

Otras lógicas

- Las lógicas de orden superior son extensiones de la lógica de primer orden que incluyen entre otras cosas:
 - Variables que representan propiedades, funciones y relaciones.
 - Cuantificadores que operan sobre estas variables.
 - Funciones que actúan sobre símbolos de función y predicado.
 - Propiedades de los símbolos de función y predicado.
- Se trata de lógicas para las que no existen cálculos lógicos completos.
- Se utilizan para formalizar matemáticas de orden superior.
- Sistemas de razonamiento: Isabelle/HOL, PVS, HOL-Light, ...

- Lenguajes de representación de conocimiento terminológico estructurado. Disponen de:
 - Un formalismo descriptivo: conceptos, roles, individuos y constructores.
 - Un formalismo terminológico: propiedades de la terminología descriptiva.
 - Un formalismo asertivo: propiedades de individuos.
- Se trata de lógicas decidibles que están situadas entre la lógica proposicional y la lógica de primer orden.
- Se utilizan para formalizar ontologías.
- Sistemas de razonamiento: FaCT, RACER, CEL, JCEL, ...

- Lógicas que permiten calificar la verdad de los juicios. Extienden la lógica de primer orden con operadores modales:
 - Operador de necesidad.
 - Operador de posibilidad.
- Su semántica se basa en la existencia de mundos posibles o maximales y las relaciones de accesibilidad entre ellos.
- Las lógicas temporales son un tipo de lógicas modales usadas para la formalización de sistemas software y hardware.
- Sistemas de razonamiento: SMV, SPIN, KRONOS, NuSMV, ...

- Las lógicas multivaluadas son extensiones de las lógicas clásicas admitiendo una variedad más amplia de valores de verdad.
 - Lógicas con un número finito de valores de verdad: Lógicas trivaluadas de Lukasiewicz o de Kleene.
 - Lógicas con un número infinito de valores de verdad: Lógica difusa, lógica probabilística.
- Se usan en entornos en los que la toma de decisiones depende del grado de certeza de las hipótesis.

- M. Ben-Ari. *Mathematical logic for computer science*
Capítulos 1 y 2.
- J.A. Díez. *Iniciación a la Lógica*
Capítulos 2 y 3.
- M. Huth y M. Ryan. *Logic in computer science: modelling and reasoning about systems*