

Tema 5: Resolución

Dpto. Ciencias de la Computación Inteligencia Artificial
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Lógica Informática
(Tecnologías Informáticas)

Resolución Proposicional

La regla de resolución
Saturación y resolución
regular
Estrategias de resolución

Resolución en LPO

Unificación
Ejemplos
Resolución
Estrategias de resolución
Razonamiento con igualdad

Contenido

Resolución Proposicional

- La regla de resolución
- Saturación y resolución regular
- Estrategias de resolución

Resolución en LPO

- Unificación
 - Ejemplos
- Resolución
- Estrategias de resolución
- Razonamiento con igualdad

Resolución Proposicional

- La regla de resolución
- Saturación y resolución regular
- Estrategias de resolución

Resolución en LPO

- Unificación
 - Ejemplos
- Resolución
- Estrategias de resolución
- Razonamiento con igualdad

La regla de resolución

Generaliza algunas de las reglas de inferencia clásicas:

$$\text{Modus Ponens : } \frac{p, \quad p \rightarrow q}{q} \qquad \frac{\{p\}, \quad \{\neg p, q\}}{\{q\}}$$

$$\text{Modus Tollens : } \frac{p \rightarrow q, \quad \neg q}{\neg p} \qquad \frac{\{\neg p, q\}, \quad \{\neg q\}}{\{\neg p\}}$$

$$\text{Encadenamiento : } \frac{p \rightarrow q, \quad q \rightarrow r}{p \rightarrow r} \qquad \frac{\{\neg p, q\}, \quad \{\neg q, r\}}{\{\neg p, r\}}$$

Regla de resolución:

$$\frac{\{L_1, \dots, L_i, \dots, L_m\}, \quad \{M_1, \dots, L^c, \dots, M_k\}}{\{L_1, \dots, L_m, M_1, \dots, M_k\}}$$

Resolución Proposicional

La regla de resolución

Saturación y resolución regular

Estrategias de resolución

Resolución en LPO

Unificación

Ejemplos

Resolución

Estrategias de resolución

Razonamiento con igualdad

Resolución entre cláusulas

Definición.

Si $L \in C_1$ y $L' \in C_2$ son literales complementarios, entonces la **resolvente** de C_1 y C_2 respecto a L es

$$res_L(C_1, C_2) = (C_1 \setminus \{L\}) \cup (C_2 \setminus \{L'\})$$

El conjunto de las resolventes de C_1 y C_2 es:

$$Res(C_1, C_2) = \{res_L(C_1, C_2) : L \in C_1 \text{ y } L^c \in C_2\}.$$

► Ejemplos:

Sea $C_1 = \{p, q, \neg r\}$ y $C_2 = \{\neg p, r, s\}$. Entonces

$$res_p(C_1, C_2) = \{q, \neg r, r, s\}$$

$$res_{\neg r}(C_1, C_2) = \{p, \neg p, q, s\}$$

Demostraciones por resolución

Dado un conjunto de cláusulas, S , podemos considerar el sistema deductivo que tiene a $Ax(\mathbf{T}) = S$ y usa resolución como única regla de inferencia.

Las definiciones anteriores se adaptan directamente:

- ▶ Una **demostración por resolución** a partir de S es una sucesión de cláusulas C_1, \dots, C_n tal que para cada $i = 1, \dots, n$ se verifica:
 - ▶ $C_i \in S$, o bien
 - ▶ Existen $j, k < i$ tales que $C_i \in Res(C_j, C_k)$.

Si $C_n = \square$ diremos que C_1, \dots, C_n es una **refutación** de S .

- ▶ Una cláusula C es **demostrable por resolución** a partir de S si existe una demostración a partir de S , C_1, \dots, C_n , tal que $C_n = C$.

Notación: $S \vdash_r C$.

- ▶ Decimos que S es **refutable** si $S \vdash_r \square$.

Ejemplos

Sea $S = \{\{p, q\}, \{\neg p, q\}, \{p, \neg q\}, \{\neg q, \neg p, s\}\}$.

Veamos que $S \vdash_r \{s\}$:

- | | | |
|----|-------------------------|---------------------|
| 1. | $\{p, q\}$ | Hipótesis |
| 2. | $\{\neg p, q\}$ | Hipótesis |
| 3. | $\{q\}$ | Resolvente de 1 y 2 |
| 4. | $\{\neg q, p\}$ | Hipótesis |
| 5. | $\{p\}$ | Resolvente de 3 y 4 |
| 6. | $\{\neg q, \neg p, s\}$ | Hipótesis |
| 7. | $\{\neg q, s\}$ | Resolvente de 5 y 6 |
| 8. | $\{s\}$ | Resolvente de 7 y 3 |

Resolución
Proposicional

La regla de resolución

Saturación y resolución
regular

Estrategias de resolución

Resolución en LPO

Unificación

Ejemplos

Resolución


Estrategias de resolución

Razonamiento con igualdad

Ejemplos (II)

Es habitual presentar las demostraciones por resolución utilizando un árbol.

$S_1 = \{\{p, q\}, \{p, \neg q\}, \{\neg p, q\}, \{\neg p, \neg q\}\}$ es refutable:



Luego $S \vdash_r \square$.

Resolución Proposicional

La regla de resolución

Saturación y resolución regular

Estrategias de resolución

Resolución en LPO

Unificación

Ejemplos

Resolución

Estrategias de resolución

Razonamiento con igualdad

Adecuación y Completitud

Lema. Sean C_1 , C_2 y C cláusulas. Si C es una resolvente de C_1 y C_2 , entonces $\{C_1, C_2\} \models C$.

Teorema de adecuación. Sean S un conjunto de cláusulas y C una cláusula. Entonces

$$S \vdash_r C \implies S \models C$$

► Incompletitud de resolución:

$$\{\{q\}\} \models \{q, r\} \quad \text{pero} \quad \{\{q\}\} \not\vdash_r \{q, r\}$$

Teorema de completitud de la refutación:

$$S \text{ es insatisfactible} \iff S \vdash_r \square$$

Resolución Proposicional

La regla de resolución

Saturación y resolución regular

Estrategias de resolución

Resolución en LPO

Unificación

Ejemplos

Resolución

Estrategias de resolución

Razonamiento con igualdad

Algoritmo de Resolución por Saturación

► Algoritmo de resolución por saturación.

Entrada: S , un conjunto finito de cláusulas.

Salida: **SI**, si S es insatisfactible
NO, en caso contrario.

Procedimiento:

- $S' \leftarrow S$
- $S'' \leftarrow S' \cup \bigcup_{C_1, C_2 \in S'} Res(C_1, C_2)$
- Mientras $\square \notin S''$ y $S' \neq S''$ hacer:
 - $S' \leftarrow S''$
 - $S'' \leftarrow S' \cup \bigcup_{C_1, C_2 \in S'} Res(C_1, C_2)$
- Si $\square \in S''$ devolver **SI** (i.e., insatisfactible)
- Si $\square \notin S''$ devolver **NO** (i.e., satisfactible)

Resolución
Proposicional

La regla de resolución

Saturación y resolución
regular

Estrategias de resolución

Resolución en LPO

Unificación

Ejemplos

Resolución

Estrategias de resolución

Razonamiento con igualdad

Resolución por saturación

- ▶ El algoritmo de resolución por saturación genera una sucesión de conjuntos de cláusulas:

$$S_0 = S, \quad S_{i+1} = S_i \cup \bigcup_{C_1, C_2 \in S_i} \text{Res}(C_1, C_2)$$

de tal modo que para toda cláusula, C , se tiene

$$S \vdash_r C \iff \text{Existe } j \text{ tal que } C \in S_j$$

- ▶ En consecuencia, por el teorema de completitud, el algoritmo de resolución por saturación es correcto (aunque muy ineficiente).

Ejemplos (I)

- Sea $S = \{\{p, q\}, \{\neg p, q\}, \{p, \neg q\}, \{\neg q\}\}$, aplicando el algoritmo:

$$S_1 = S \cup \{\{q\}, \{p\}, \{\neg p\}, \{\neg p, p\}, \{q, \neg q\}\}$$

$$S_2 = S_1 \cup \{\square, \dots\}$$

Por tanto, S es insatisfactible.

- Sea $S = \{\{p, q\}, \{p, \neg q\}, \{q, r, s\}, \{\neg s, \neg r\}\}$, aplicando el algoritmo:

$$S_1 = S \cup \{\{p\}, \{p, r, s\}, \{q, s, \neg s\}, \{q, r, \neg r\}\}$$

$$S_2 = S_1 \cup \{\{p, s, \neg s\}, \{p, r, \neg r\}, \{q, \neg r, \neg s\}, \{p, q, r, s\}\}$$

$$S_3 = S_2 \cup \{\{p, \neg r, \neg s\}, \{p, q, \neg s, s\}, \{p, q, \neg r, r\}, \{p, q, \neg r, \neg s\}\}$$

Y $S_4 = S_3$. Por tanto, S es satisfactible.

Resolución
Proposicional

La regla de resolución

Saturación y resolución
regular

Estrategias de resolución

Resolución en LPO

Unificación

Ejemplos

Resolución

Estrategias de resolución

Razonamiento con igualdad

Ejemplos (II)

- ▶ La aparición de tautologías suele provocar el cálculo de muchas resolventes repetidas y la aparición de nuevas tautologías.
- ▶ Sin embargo, las tautologías son cláusulas esencialmente *redundantes*, ya que tenemos el siguiente resultado:
 - ▶ Si $C \in TAUT$ y S un conjunto de fórmulas entonces

$$S \text{ es satisfactible} \iff S - \{C\} \text{ es satisfactible}$$

- ▶ Por tanto, en cada etapa del algoritmo de saturación podemos eliminar las tautologías obtenidas.
- ▶ Ejemplo: $S = \{\{p, q\}, \{p, \neg q\}, \{q, r, s\}, \{\neg s, \neg r\}\}$, y aplicando el algoritmo con eliminación de tautologías

$$S_1 = S \cup \{\{p\}, \{p, r, s\}\}, \quad S_2 = S_1$$

Por tanto, S es satisfactible.

Reducir la redundancia

Definición. Dado un conjunto de cláusulas S decimos que una cláusula C es redundante si S y $S - \{C\}$ son equiconsistentes.

- ▶ Por ejemplo: Las tautologías son siempre redundantes.
- ▶ La eliminación de cláusulas redundantes reduce el número total de cláusulas sin alterar la satisfactibilidad del conjunto.
- ▶ Una forma no trivial de eliminar cláusulas redundantes se basa en la relación de **subsunción**.

Definición. Decimos que una cláusula C **subsume** a C' si $C \subseteq C'$ (como conjuntos de literales).

- ▶ **Observación:** Si $C, C' \in S$ y C subsume a C' entonces C' es redundante.

Resolución regular

- ▶ Otra forma de mejorar la eficiencia del algoritmo de resolución es limitar el cálculo de resolventes respecto de un mismo literal.

Definición.

Un deducción por resolución C_1, \dots, C_n es **regular** si ninguna de sus resolventes C_j contiene un literal respecto del cual se resolvió para calcular alguna de las resolventes C_i previas ($i < j$).

- ▶ Esta restricción (o estrategia) se utiliza en el siguiente algoritmo para decidir la satisfactibilidad de un conjunto de cláusulas proposicionales.

Resolución Proposicional

La regla de resolución

Saturación y resolución regular

Estrategias de resolución

Resolución en LPO

Unificación

Ejemplos

Resolución

Estrategias de resolución

Razonamiento con igualdad

Procedimiento de resolución regular

1. Dado un conjunto de cláusulas S , fijemos una ordenación p_1, \dots, p_k de las variables proposicionales que aparecen en S .
2. Hagamos $S_0 = S$.
3. Para $j = 1, \dots, k$, calculamos
 - 3.1 El conjunto de cláusulas S'_j que se obtiene de S_{j-1} añadiéndole a S_{j-1} todas las resolventes que pueden calcularse respecto de p_j usando cláusulas de S_{j-1} .
 - 3.2 A continuación, S_j se obtiene de S'_j eliminando todas las cláusulas que contengan p_j o $\neg p_j$.
4. Si $\square \in S_k$, entonces S es insatisfactible. En caso contrario, S es satisfactible.

Se puede probar que el resultado del algoritmo no depende del orden seleccionado en las variables proposicionales.

Resolución Proposicional

La regla de resolución

Saturación y resolución regular

Estrategias de resolución

Resolución en LPO

Unificación

Ejemplos

Resolución

Estrategias de resolución

Razonamiento con igualdad

Ejemplos

- Sea $S = \{\{p, q\}, \{\neg p, q\}, \{p, \neg q\}, \{\neg q\}\}$.
Fijamos el orden p, q para aplicar resolución regular:

p : $S'_1 = S_0 \cup \{\{q\}, \{q, \neg q\}\}$, luego

$$S_1 = \{\{q\}, \{\neg q\}, \{q, \neg q\}\}$$

q : $S'_2 = S_1 \cup \{\square, \{q, \neg q\}\}$, luego $S_2 = \{\square\}$.

Por tanto, S es insatisfactible.

- Sea $S = \{\{p, q\}, \{p, \neg q\}, \{q, r, s\}, \{\neg s, \neg r\}\}$.
Aplicando el algoritmo para la ordenación p, q, r, s obtenemos

p : $S_1 = \{\{q, r, s\}, \{\neg s, \neg r\}\}$.

q : $S_2 = \{\{\neg s, \neg r\}\}$.

r : $S_3 = \emptyset$.

s : $S_4 = S_3$.

Por tanto, S es satisfactible.

Resolución
Proposicional

La regla de resolución

Saturación y resolución
regular

Estrategias de resolución

Resolución en LPO

Unificación

Ejemplos

Resolución

Estrategias de resolución

Razonamiento con igualdad

Completitud y eficiencia

- ▶ Hemos estudiado la deducción como un método mecánico para decidir la validez, consistencia, consecuencia lógica, etc.
- ▶ La completitud es una propiedad fundamental de los procedimientos de deducción estudiados.
- ▶ En el caso de resolución la existencia de una demostración es decidible, y el conjunto de teoremas es finito (si el conjunto de cláusulas inicial es finito):
Resolución por Saturación.
- ▶ Sin embargo, los métodos de decisión conocidos no son eficientes, en general.
- ▶ Una solución: Restringir el tipo de cláusulas consideradas.
 - ▶ Una **cláusula de Horn** es una cláusulas con a lo sumo un literal positivo.
 - ▶ El problema de decidir si un conjunto de cláusulas de Horn (proposicionales) es satisfactible es decidible de manera eficiente.

Resolución Proposicional

La regla de resolución

Saturación y resolución regular

Estrategias de resolución

Resolución en LPO

Unificación

Ejemplos

Resolución

Estrategias de resolución

Razonamiento con igualdad

Estrategias

Para reducir la explosión combinatoria de aplicación de la regla de resolución se pueden considerar algunas estrategias.

Las siguientes estrategias son refutacionalmente completas:

- ▶ **Resolución positiva:** Sólo se calculan resolventes si una de las dos cláusulas contiene únicamente literales positivos.
- ▶ **Resolución negativa:** Sólo se calculan resolventes si una de las dos cláusulas contiene únicamente literales negativos.
- ▶ **Resolución lineal:** Una deducción por resolución a partir de un conjunto S , C_1, \dots, C_n , es lineal si para cada $i < n$ la cláusula C_{i+1} es una resolvente de C_i y otra cláusula previamente obtenida por resolución o perteneciente a S .

Resolución Proposicional

La regla de resolución
Saturación y resolución regular

Estrategias de resolución

Resolución en LPO

Unificación

Ejemplos

Resolución

Estrategias de resolución

Razonamiento con igualdad

Estrategias (II)

Las siguientes estrategias **NO** son refutacionalmente completas.

Pero sí lo son restringidas a conjuntos de cláusulas de Horn.

- ▶ **Resolución unidad:** Sólo se permiten resolventes si una de las cláusulas es unitaria.
- ▶ **Resolución por entradas:** Sólo se permiten resolventes si una de las cláusulas pertenece al conjunto original.

Resolución Proposicional

La regla de resolución

Saturación y resolución regular

Estrategias de resolución

Resolución en LPO

Unificación

Ejemplos

Resolución

Estrategias de resolución

Razonamiento con igualdad

Resolución en LPO

- ▶ Por el Teorema de Herbrand, un conjunto de cláusulas, Σ , es inconsistente si y sólo si su extensión de Herbrand, $EH(\Sigma)$, es inconsistente (proposicionalmente).
- ▶ Esto proporciona una forma rudimentaria del método de resolución para probar que un conjunto, Σ , de cláusulas de un lenguaje de primer orden es inconsistente:
 1. Generar $EH(\Sigma)$ y,
 2. Probar que $EH(\Sigma) \vdash_r \square$.
- ▶ El método de resolución en lógica de primer orden incorpora varias mejoras en este procedimiento básico:
 1. Es posible generar $EH(\Sigma)$ poco a poco, calculando sólo las sustituciones necesarias para obtener cada una de las cláusulas con las que se calculan los resolventes.
 2. No es necesario restringir el cálculo de resolventes proposicionales a cláusulas sin variables, y
 3. Para calcular una resolvente proposicional entre dos cláusulas, podemos conseguir que ambas cláusulas se obtengan aplicando la misma sustitución a dos cláusulas de Σ (y dicha sustitución se obtiene algorítmicamente).

Resolución Proposicional

La regla de resolución
Saturación y resolución regular
Estrategias de resolución

Resolución en LPO

Unificación
Ejemplos
Resolución
Estrategias de resolución
Razonamiento con igualdad

Ejemplo

- ▶ Sea $\Sigma = \{C_1, C_2, C_3\}$ el conjunto de las cláusulas

$$C_1 : \neg P(a, y) \vee \neg P(y, z) \vee \neg P(z, y),$$

$$C_2 : P(x, f(x)) \vee P(a, x),$$

$$C_3 : P(f(x), x) \vee P(a, x)$$

siendo a una constante.

- ▶ Para probar que Σ es inconsistente basta probar que su extensión de Herbrand $EH(\Sigma)$ es inconsistente (proposicionalmente).
- ▶ Consideremos las siguientes sustituciones:

$$\theta_1 = \{y/a, z/a\}$$

$$\theta_2 = \{y/a, z/f(a)\}$$

$$\theta_3 = \{y/f(a), z/a\}$$

$$\theta_4 = \{x/a\}$$

- ▶ Entonces $C_1\theta_1, C_1\theta_2, C_1\theta_3, C_2\theta_4, C_3\theta_4 \in EH(\Sigma)$.

Resolución
Proposicional

La regla de resolución
Saturación y resolución
regular
Estrategias de resolución

Resolución en LPO

Unificación
Ejemplos
Resolución
Estrategias de resolución
Razonamiento con igualdad

Ejemplo (II)

► Las cláusulas

$$E_1 = C_1\theta_1 : \neg P(a, a)$$

$$E_2 = C_1\theta_2 : \neg P(a, a) \vee \neg P(a, f(a)) \vee \neg P(f(a), a)$$

$$E_3 = C_1\theta_3 : \neg P(a, f(a)) \vee \neg P(f(a), a)$$

$$E_4 = C_2\theta_4 : P(a, f(a)) \vee P(a, a),$$

$$E_5 = C_3\theta_4 : P(f(a), a) \vee P(a, a)$$

son fórmulas abiertas sin variables.

- Veamos que $EH(\Sigma)$ es inconsistente. Para ello probamos que $S = \{E_1, E_2, E_3, E_4, E_5\} \subseteq EH(\Sigma)$ es inconsistente utilizando resolución **proposicional**:

$$\begin{array}{ccccccc}
 E_1 & & E_3 & & E_5 & & E_1 \\
 \searrow & & \searrow & & \searrow & & \searrow \\
 E_4 & \rightarrow & P(a, f(a)) & \rightarrow & \neg P(f(a), a) & \rightarrow & P(a, a) & \rightarrow & \square
 \end{array}$$

Resolución Proposicional


La regla de resolución
 Saturación y resolución regular
 Estrategias de resolución

Resolución en LPO

Unificación
 Ejemplos
 Resolución
 Estrategias de resolución
 Razonamiento con igualdad

Ejemplo (III)

- ▶ Cada resolvente proposicional entre cláusulas de $EH(\Sigma)$ puede obtenerse directamente a partir de las cláusulas de Σ si se toma nota de las sustituciones utilizadas para generar las cláusulas de $EH(\Sigma)$.
- ▶ **Ejemplo:** La resolvente $P(a, f(a))$ obtenida a partir de E_1 y E_4 , puede considerarse obtenida a partir de C_1 y C_2 utilizando las sustituciones θ_1 y θ_4 .
- ▶ Gráficamente,



- ▶ Esta idea es la base de la resolución en LPO junto con un ingrediente más: Podemos imponer que $\theta_1 = \theta_4 = \theta$ y existe un algoritmo para calcular la sustitución θ efectivamente.

Resolución Proposicional

La regla de resolución
 Saturación y resolución regular
 Estrategias de resolución

Resolución en LPO

Unificación
 Ejemplos
 Resolución
 Estrategias de resolución
 Razonamiento con igualdad

Unificadores

- ▶ Sea C una cláusula de primer orden y D una subcláusula de C tal que existe una sustitución θ para la que $D\theta$ se reduce a un único literal L . Entonces decimos que
 - ▶ La sustitución θ **unifica** el conjunto de expresiones D .
 - ▶ D es **unificable** y θ es un **unificador** de D .
 - ▶ Para adaptar el cálculo de resolventes a la LPO, dadas dos cláusulas C_1 y C_2 necesitamos encontrar las subcláusulas $D_1 \subseteq C_1$ y $D_2 \subseteq C_2$ unificables y los unificadores θ_1 y θ_2 que hacen que $D_1\theta_1$ y $D_2\theta_2$ se reduzcan a literales complementarios.
- ▶ El problema puede reducirse a la búsqueda de una sola sustitución. Para ello:
 1. Podemos suponer que C_1 y C_2 no tienen variables comunes (**condición de variables separadas**).
 2. Buscamos $D_1 \subseteq C_1$ y $D_2 \subseteq C_2$ tales que $D_1 \cup D_2^c$ (o bien $D_1^c \cup D_2$) satisface que:
 - ▶ Es unificable, y
 - ▶ sus literales son positivos y tienen el mismo predicado. (D_i^c está formada por los literales complementarios de los literales de D_i).

Resolución Proposicional

La regla de resolución
Saturación y resolución regular
Estrategias de resolución

Resolución en LPO

Unificación

Ejemplos
Resolución
Estrategias de resolución
Razonamiento con igualdad

Unificadores

- ▶ Si D es un conjunto de literales, una sustitución θ es un unificador de D si $D\theta$ es unitaria.
- ▶ Un unificador θ de D es un **unificador de máxima generalidad** (u.m.g.) si
 - ▶ Para todo unificador σ de D , existe una sustitución α tal que $\sigma = \theta\alpha$.
(siendo $\theta\alpha$ la composición de θ y α , es decir, la sustitución obtenida al aplicar primero la sustitución θ y luego α).
- ▶ Ejemplo de u.m.g. de literales: $\theta_1 = \{y/x, u/a, z/a\}$ es un u.m.g. de

$$P(x, z), P(y, a), P(x, u)$$

y $\theta_2 = \{x/a, y/a, u/a, z/a\}$ es unificador, pero no es un u.m.g.:

$$\theta_2 = \{y/x, u/a, z/a\}\{x/a\}$$

Resolución Proposicional

La regla de resolución
Saturación y resolución regular
Estrategias de resolución

Resolución en LPO

Unificación
Ejemplos
Resolución
Estrategias de resolución
Razonamiento con igualdad

Algoritmo para obtener un u.m.g.

- ▶ Para unificar pt_1, \dots, t_n y pt'_1, \dots, t'_n , debemos obtener una sustitución θ que sea solución de las ecuaciones:

$$t_1\theta = t'_1\theta, \dots, t_n\theta = t'_n\theta.$$

- ▶ Para ello aplicamos al conjunto $\{t_1 = t'_1, \dots, t_n = t'_n\}$ las siguientes reglas, mientras sea posible:

$$R_1: \{x = x\} \cup E \implies E$$

$$R_2: \{x = t\} \cup E \implies \{x = t\} \cup E\{x/t\}$$

cuando x ocurre en E y no en t

$$R_3: \{t = x\} \cup E \implies \{x = t\} \cup E \quad \text{si } t \text{ no es variable.}$$

$$R_4: \{f(t_1, \dots, t_n) = f(t'_1, \dots, t'_n)\} \cup E \implies \\ \{t_1 = t'_1, \dots, t_n = t'_n\} \cup E$$

$$R_5: \{f(t_1, \dots, t_n) = g(t'_1, \dots, t'_n)\} \cup E \implies \text{FALLO} \quad (\text{si } f \neq g).$$

$$R_6: \{x = t\} \cup E \implies \text{FALLO} \quad \text{si } x \text{ ocurre en } t.$$

- ▶ Si en algún paso obtenemos un conjunto de ecuaciones $\{x_1 = s_1, x_2 = s_2, \dots, x_r = s_r\}$ al que no es posible aplicar ninguna regla, devolvemos UNIFICABLE, y $\theta = \{x_1/s_1, x_2/s_2, \dots, x_r/s_r\}$ es un u.m.g.

Resolución Proposicional

La regla de resolución

Saturación y resolución regular

Estrategias de resolución

Resolución en LPO

Unificación

Ejemplos

Resolución

Estrategias de resolución

Razonamiento con igualdad

Ejemplos

► Unificar

Divide($x + (a \cdot y), x \cdot S(y)$), Divide($S(y) + (y \cdot a), z \cdot z$)

1. $\{x + (a \cdot y) = (S(y) + (y \cdot a)), x \cdot S(y) = z \cdot z\}$ $[R_4]$
2. $\{x = S(y), a \cdot y = y \cdot a, x = z, S(y) = z\}$ $[R_4]$
3. $\{x = S(y), a = y, y = a, x = z, S(y) = z\}$ $[R_4]$
4. $\{x = S(y), y = a, x = z, z = S(y)\}$ $[R_3]$
5. $\{x = S(y), y = a, S(y) = z, z = S(y)\}$ $[R_2]$
6. $\{\overline{x = S(a)}, \underline{y = a}, S(a) = z, z = S(a)\}$ $[R_2]$
7. $\{x = S(a), \overline{y = a}, z = S(a)\}$ $[R_3]$

► No es posible unificar

Divide($x + (a \cdot y), x \cdot S(y)$), Divide($S(x) + (y \cdot a), z \cdot z$)

pues

1. $\{x + (a \cdot y) = (S(x) + (y \cdot a)), x \cdot S(y) = z \cdot z\}$
2. $\{x = S(x), a \cdot y = y \cdot a, x = z, S(y) = z\}$
3. FALLO, x ocurre en $S(x)$.

Resolución
Proposicional

La regla de resolución
Saturación y resolución
regular

Estrategias de resolución

Resolución en LPO

Unificación

Ejemplos

Resolución

Estrategias de resolución

Razonamiento con igualdad

Ejemplos

- $P(x + (a \cdot y), x \cdot f(y)), P(f(y) + (y \cdot a), z \cdot z)$

Unificables:

1. $\{x + (a \cdot y) = (f(y) + (y \cdot a)), x \cdot f(y) = z \cdot z\}$
2. $\{x = f(y), a \cdot y = y \cdot a, x = z, f(y) = z\}$
3. $\{x = f(y), a = y, y = a, x = z, f(y) = z\}$
4. $\{x = f(y), y = a, x = z, z = f(y)\}$
5. $[x/f(y)]\{y = a, f(y) = z, z = f(y)\}$
6. $[x/f(a), y/a]\{f(a) = z, z = f(a)\}$
7. $[x/f(a), y/a, z/f(a)]\{\}$

- $P(x + (a \cdot y), x \cdot f(y)), P(f(x) + (y \cdot a), z \cdot z)$

No unificables:

1. $\{x + (a \cdot y) = f(x) + (y \cdot a), x \cdot f(y) = z \cdot z\}$
2. $\{x = f(x), a \cdot y = y \cdot a, x = z, f(y) = z\}$
3. $[x/f(x)]\{\dots\}$
4. FALLO, x ocurre en $f(x)$.

Resolución
Proposicional

La regla de resolución
Saturación y resolución
regular

Estrategias de resolución

Resolución en LPO

Unificación

Ejemplos

Resolución

Estrategias de resolución

Razonamiento con igualdad

Resolución

- ▶ Un cambio de variables (o renombramiento) es una sustitución α tal que para toda variable v , $\alpha(v)$ es una variable.
- ▶ Decimos que C es una **resolvente** de las cláusulas C_1 y C_2 si existen dos cambios de variables α_1 y α_2 tales que

$$C_1\alpha_1 = \{A_1, \dots, A_n, L_1, \dots, L_k\}$$

$$C_2\alpha_2 = \{B_1, \dots, B_m, M_1, \dots, M_r\}$$

no tienen variables comunes y

- ▶ Si $D_1 = \{L_1, \dots, L_k\}$ y $D_2 = \{M_1, \dots, M_r\}$, entonces $D_1 \cup D_2^c$ es unificable con u.m.g. σ .
- ▶ $C = \{A_1\sigma, \dots, A_n\sigma, B_1\sigma, \dots, B_m\sigma\}$
- ▶ Es decir,

$$C = (C_1\alpha_1\sigma \setminus D_1\sigma) \cup (C_2\alpha_2\sigma \setminus D_2\sigma)$$

Resolución Proposicional

La regla de resolución
 Saturación y resolución regular
 Estrategias de resolución

Resolución en LPO

Unificación
 Ejemplos

Resolución

Estrategias de resolución
 Razonamiento con igualdad

Ejemplos

- ▶ Si las cláusulas son cerradas, una resolvente es una resolvente proposicional.
- ▶ Si las cláusulas no tienen variables comunes no es necesario renombrar:

$$\frac{\{P(z, a), H(a, z)\}, \quad \{\neg P(y, x), \neg M(y, x)\}}{\downarrow \sigma = \{z/y, x/a\} \quad \text{u.m.g.}} \quad \{H(a, y), \neg M(y, a)\}$$

Resolución Proposicional

La regla de resolución

Saturación y resolución regular

Estrategias de resolución

Resolución en LPO

Unificación

Ejemplos

Resolución

Estrategias de resolución

Razonamiento con igualdad

Demostraciones por resolución

Dado un conjunto de cláusulas, Σ , podemos considerar el sistema deductivo que tiene a Σ como conjunto de axiomas y resolución como única regla de inferencia.

- ▶ Una **demostración por resolución** a partir de Σ es una sucesión de cláusulas C_1, \dots, C_n tal que para cada $i = 1, \dots, n$ se verifica:
 - ▶ $C_i \in \Sigma$, o bien
 - ▶ Existen $j, k < i$ tales que C_i es un resolvente de C_j y C_k .

Si $C_n = \square$ diremos que C_1, \dots, C_n es una **refutación** de Σ .

- ▶ Una cláusula C es **demostrable por resolución** a partir de Σ si existe una demostración a partir de Σ , C_1, \dots, C_n , tal que $C_n = C$.
Notación: $\Sigma \vdash_r C$.
- ▶ Decimos que Σ es **refutable** si $\Sigma \vdash_r \square$.

Resolución Proposicional

La regla de resolución
 Saturación y resolución regular
 Estrategias de resolución

Resolución en LPO

Unificación
 Ejemplos
Resolución
 Estrategias de resolución
 Razonamiento con igualdad

Ejemplo

$$\Sigma = \{ \neg P(a, y) \vee \neg P(y, z) \vee \neg P(z, y), \\ P(x, f(x)) \vee P(a, x), \\ P(f(x), x) \vee P(a, x) \}$$

Veamos que $\Sigma \vdash_r \square$:

1. $\neg P(a, y) \vee \neg P(y, z) \vee \neg P(z, y)$ [[Hip.]]
2. $P(x, f(x)) \vee P(a, x)$ [[Hip.]]
3. $P(a, f(a))$ [[Res(1, 2), $\theta = \{y/a, z/a, x/a\}$]]
4. $\neg P(f(a), a)$ [[Res(1, 3), $\theta = \{y/f(a), z/a\}$]]
5. $P(f(x), x) \vee P(a, x)$ [[Hip.]]
6. $P(a, a)$ [[Res(5,4), $\theta = \{x/a\}$]]
7. \square [[Res(1, 6), $\theta = \{y/a, z/a\}$]]

Resolución
Proposicional

La regla de resolución
Saturación y resolución
regular
Estrategias de resolución

Resolución en LPO

Unificación
Ejemplos
Resolución
Estrategias de resolución
Razonamiento con igualdad

Otro ejemplo

$$\Sigma = \{R(x, y) \vee R(y, z), \neg R(x, f(x))\}$$

Veamos que $\Sigma \vdash_r \square$.

1. $R(x, y) \vee R(y, z)$ [[Hip.]]
2. $\neg R(u, f(u))$ [[Hip. (renombramos)]]
3. $R(f(u), z)$ [[Res(1, 2), $\theta = \{x/u, y/f(u)\}$]]
4. \square [[ren. u/v en 2, Res(2, 3), $\theta = \{v/f(u), z/f(f(v))\}$]]

Resolución Proposicional

La regla de resolución
 Saturación y resolución regular
 Estrategias de resolución

Resolución en LPO

Unificación
 Ejemplos
Resolución
 Estrategias de resolución
 Razonamiento con igualdad

Adecuación y Completitud

- ▶ **Teorema de adecuación.** Sean Σ un conjunto de cláusulas y C una cláusula. Entonces

$$\Sigma \vdash_r C \implies \Sigma \models C$$

- ▶ Resolución es un caso particular de resolución no restringida, luego si $\Sigma \vdash_r C$ entonces $\Sigma \models C$.
- ▶ Tanto resolución como resolución no restringida son incompletas. Pero la completitud de la resolución no restringida **para la refutación** se sigue del teorema de Herbrand y del correspondiente resultado de completitud para la resolución proposicional. Además se tiene,
- ▶ **Lema.** Si una cláusula C es una resolvente no restringida de C_1 y C_2 , respecto de las subcláusulas D_1 y D_2 , entonces C también es una resolvente de C_1 y C_2 con respecto a D_1 y D_2 .
- ▶ **Teorema de completitud de la refutación:**

$$\Sigma \text{ es inconsistente} \iff \Sigma \vdash_r \square$$

Resolución Proposicional

La regla de resolución
Saturación y resolución regular
Estrategias de resolución

Resolución en LPO

Unificación
Ejemplos
Resolución
Estrategias de resolución
Razonamiento con igualdad

Ejemplo de refutación

- Ejemplo: En el lenguaje $LC = \{\in\}$, definimos la relación de inclusión como sigue:

$$H := \forall x \forall y (x \subseteq y \leftrightarrow \forall w (w \in x \leftrightarrow w \in y))$$

Veamos cómo se prueba que la relación \subseteq es transitiva;

$$C := \forall x \forall y \forall z (x \subseteq y \wedge y \subseteq z \rightarrow x \subseteq z)$$

- Paso 1: Paso a forma clausal de H y $\neg C$:

$$H_1 : \{\neg(x \subseteq y), \neg(w \in x), w \in y\} \quad [' \rightarrow ' \text{ de } H]$$

$$H_2 : \{x \subseteq y, f(x, y) \in x\} \quad [' \rightarrow ' \text{ de } H]$$

$$H_3 : \{x \subseteq y, \neg(f(x, y) \in y)\} \quad [' \rightarrow ' \text{ de } H]$$

$$C_1 : a \subseteq b \quad [a, b, c \text{ nuevas constantes, } \neg C]$$

$$C_2 : b \subseteq c \quad [\neg C]$$

$$C_3 : \neg(a \subseteq c) \quad [\neg C]$$

Resolución Proposicional

La regla de resolución
Saturación y resolución regular
Estrategias de resolución

Resolución en LPO

Unificación
Ejemplos

Resolución

Estrategias de resolución
Razonamiento con igualdad

Ejemplo de refutación (II)

- Una refutación es (sin llaves):

$$R_1: \neg(w \in a), w \in b$$

$$R_2: \neg(w \in b), w \in c$$

$$R_3: a \subseteq y, f(a, y) \in b$$

$$R_4: x \subseteq c, \neg(f(x, c) \in b)$$

$$R_5: a \subseteq c$$

$$R_6: \square$$

$$[H_1, 1 \text{ con } C_1, 1]$$

$$[\{x/a, y/b\}]$$

$$[H_1, 1 \text{ con } C_2, 1]$$

$$[\{x/b, y/c\}]$$

$$[H_2, 2 \text{ con } R_1, 1]$$

$$[\{x/a, w/f(a, y)\}]$$

$$[H_3, 2 \text{ con } R_2, 2]$$

$$[\{y/c, w/f(x, c)\}]$$

$$[R_3, 2 \text{ con } R_4, 2]$$

$$[\{x/a, y/c\}]$$

$$[R_5, 1 \text{ con } C_3, 1]$$

Resolución
Proposicional

La regla de resolución
Saturación y resolución
regular
Estrategias de resolución

Resolución en LPO

Unificación
Ejemplos

Resolución

Estrategias de resolución
Razonamiento con igualdad

Estrategias

Al igual que en el caso proposicional, para reducir la explosión combinatoria se pueden considerar estrategias similares:

- ▶ **Resolución positiva:** Sólo se calculan resolventes si una de las dos cláusulas contiene únicamente literales positivos.
- ▶ **Resolución negativa:** idem con cláusulas negativas.
- ▶ **Resolución lineal:** Para cada $i < n$ la cláusula C_{i+1} es una resolvente de C_i y otra cláusula previamente obtenida por resolución o perteneciente a S .
- ▶ **Resolución unidad:** Sólo se permiten resolventes si una de las cláusulas es unitaria.
- ▶ **Resolución por entradas:** Sólo se permiten resolventes si una de las cláusulas pertenece al conjunto original.

Resolución Proposicional

La regla de resolución
Saturación y resolución regular
Estrategias de resolución

Resolución en LPO

Unificación
Ejemplos
Resolución
Estrategias de resolución
Razonamiento con igualdad

Razonamiento con igualdad

- ▶ Podemos utilizar el método de resolución para razonar con un LPO **con igualdad**. Para ello basta añadir axiomas que expresen las propiedades esenciales del predicado de igualdad.
- ▶ Fijado un LPO con igualdad, L , denotaremos por $EQ(L)$ al conjunto formado por las siguientes cláusulas:
 - ▶ $x = x$.
 - ▶ $x \neq y \vee y = x$.
 - ▶ $x \neq y \vee y \neq z \vee x = z$.
 - ▶ Para cada símbolo de predicado P de L (de aridad n)

$$x_j \neq x_0 \vee \neg P(x_1, \dots, x_j, \dots, x_n) \vee P(x_1, \dots, x_0, \dots, x_n)$$
 - ▶ Para cada símbolo de función f de L (de aridad n)

$$x_j \neq x_0 \vee f(x_1, \dots, x_j, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_0, \dots, x_n)$$
- ▶ Si S es un conjunto de cláusulas entonces

$$S \text{ es insatisfactible} \iff S \cup EQ(L) \text{ es refutable}$$

Resolución Proposicional

La regla de resolución
 Saturación y resolución regular
 Estrategias de resolución

Resolución en LPO

Unificación
 Ejemplos
 Resolución
 Estrategias de resolución
 Razonamiento con igualdad

Paramodulación

- ▶ Otra posibilidad es integrar el razonamiento con igualdad en el cálculo de resolventes añadiendo una nueva regla específica para el tratamiento de las ecuaciones.
- ▶ La regla de **paramodulación** permite obtener una nueva cláusula C (una paramodulante) a partir de dos cláusulas C_1 y C_2 de un modo parecido a cálculo de resolventes.

Resolución Proposicional

La regla de resolución
Saturación y resolución
regular
Estrategias de resolución

Resolución en LPO

Unificación
Ejemplos
Resolución
Estrategias de resolución
Razonamiento con igualdad